№. 50.

1880—1881.

# HAUPT-PREIS-VERZEICHNISS

der

# BAUMSCHULEN

von

# L. SPÄTH

## BERLIN S. O.

**Köpnickerstrasse Nro. 154.**

Gegründet i. J. 1758 durch C. F. SPÄTH.

Druck von Gerhardt & Schreiber in Erfurt.

# Verkaufs-Bedingungen.

Die **Preise** sind in Reichs-Währung gestellt, 1 Mark (ℳ) = 100 Pfennige (₰). 1 Mark ist = ½ Gulden Oestr. W. in Silber = 1 Fr. 25 cent. = 1 Shilling engl. Ausländisches Gold und Werthpapiere werden zum Tageskurse in Zahlung genommen.

**Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit.**

Mir noch **unbekannte Besteller** ersuche ich, **ihren werthen Aufträgen den Betrag** einschliesslich der Emballagekosten, **beizufügen**, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung, und bei kleineren bis zum Werthe von 20 Mark wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

**Briefe** und **Geldsendungen** bitte ich zu **frankiren.**

**Sollten einzelne Sorten** bei der Ausführung eines Auftrages **bereits vergriffen sein**, so werde ich stets annehmen, möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben zu dürfen, sofern dies nicht besonders verbeten wird.

Bei Auswahl von **ausnahmsweise starken Exemplaren** tritt eine entsprechende **Preiserhöhung** ein.

**Bei persönlichem Aussuchen** der Pflanzen **in der Baumschule** durch den Besteller haben die **Preise dieses Kataloges keine Gültigkeit.**

**Die Hundertpreise des Kataloges werden von 25 Stück, die Tausendpreise von 500 Stück** ab berechnet.

Für **Emballage**, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die **Versendung geschieht auf Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend, die Art des Transportes (**ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.**) anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn-** oder **Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben.**

Etwaige **Reklamationen**, welche nicht **sofort nach Empfang** der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

# Bemerkungen.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem gut geeigneten Sandboden sehr leicht in jeder anderen Bodenart fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner zu Britz bei Berlin belegenen Baumschule, die über 100 Hektar oder 400 preuss. Morgen umfasst, machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen.

Die **Versendung beginnt** nach den ersten stärkeren Nachtfrösten gewöhnlich **Anfangs October** und dauert **bis gegen Ende April.** Bei Eintritt der stärkeren Fröste unterbreche ich die Expedition bis zum März, wenn sie nicht etwa speziell gewünscht wird.

Da im Frühjahre die Versandzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen, **möglichst im Herbst** zu machen. Uebrigens ist die **Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten, trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen** und wird noch lange nicht genug angewandt. Eine Ausnahme machen nur die immergrünen Gehölze, deren beste Verpflanzzeit der Spätsommer ist und der Zeitpunkt, in dem sie im Frühjahr zu treiben beginnen, also Mitte April bis Mitte Mai in unserem Klima.

Sollten Bäume oder Sträucher **in gefrorenem Zustande ankommen**, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder welk geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

# Medaillen internationaler Ausstellungen

**für richtig benannte Obstsorten, besonders schön gezogene Obstbäume und Gehölz Sortimente**

**...75.**

*Handelsgärtner und Wiederverkäufer erhalten auf Blumenzwiebeln und Baumschulartikel*

**10% Rabatt.**




6 erste Preise für Obstbäume.

**Berlin 1872 & 1880.**




Silberne Staats-Medaille.

**Petersburg 1869.**




Grosse silberne Medaille.

**Paris 1867.**




Für Hyacinthen.

**Hamburg 1869.**




3 silberne, 1 bronz. Medaille, 2 Extrapreise

**Erfurt 1876.**








Erster Preis für Gehölz-Sortimente.

## A. Neuheiten des Etablissements!

zum ersten Mal in den Handel gegeben.



Ulmus campestris umbraculifera.

**Ulmus campestris umbraculifera, Kugel Rüster**. Von den Persern **Nalband** d. h. **Baum der** Schmiede, genannt, weil sich unter ihm, als dem besten Schattenbaum, der zugleich den sichersten Schutz gegen Regen giebt, mit Vorliebe die Schmiedewerkstätten etabliren. **Diese Rüster wird** in Persien und dem südlichen Kaukasus ein mächtiger Baum mit grosser sehr dichter und kugelförmiger Krone. Sie ist eine Abart von »U. campestris« und hält unsere Winter unzweifelhaft aus. Ihre Krone baut sich in der Jugend etwas nach oben zugespitzt, wird aber in späterem Alter vollständig kugelförmig wie die einer Kugelakazie, ohne dass sie geschnitten zu werden braucht, und hat sicher in unserem nordischen Klima, wo die Akazie oft leidet, eine grosse Zukunft. Das Laub hat ein lebhaft grünes Kolorit und hält sich im Herbste ebenso lange am Baum wie bei U. campestris.

Die nebenstehende Abbildung ist nach einer Photographie angefertigt, welche von einem Baum, der auf dem Kirchhofe zu Eriwan steht, genommen wurde.

Schöne Hochstämme mit 2—3jähr. Krone ... p. 1 St. 7 M., pr. 10 St. 60 M. p. 100 St. 500 M.
Niedrige 1—2jährige Veredlungen ...... „ 1 „ 5 „ „ 10 „ 40 „

**Populus alba Bolleana** (Lauche), **Pyramiden-Silber-Pappel**, so genannt zu Ehren unseres berühmten hiesigen Botanikers Herrn Dr. Bolle. Diese Pappel stammt ebenfalls aus dem westlichen Asien, wo auch unsere gewöhnliche Pyramidenpappel ihre Heimath hat, und ist jedenfalls eine grosse Bereicherung für unsere Gärten, da wir an pyramidal wachsenden Bäumen in dieser Färbung bis jetzt nichts aufzuweisen haben. Die Unterseite der Blätter ist ebenso intensiv weiss wie bei der »Pop. nivea«, der Wuchs kräftig und elegant pyramidal.

Wir verdanken diese herrliche neue Einführung wie auch die vorher beschriebene Ulmus camp. umbraculifera dem um die Verbreitung westasiatischer Gehölze hochverdienten Kaiserl. Gartendirector Scharrer in Tiflis. Derselbe schreibt uns darüber: »Die Pyramiden-Silber-Pappel findet sich in wenigen alten schön entwickelten Exemplaren im Volksgarten von Tiflis, welcher seinen Ursprung einem persischen flüchtigen Prinzen verdankt und noch heute seinen Namen trägt. Deshalb ist es uns wahrscheinlich, dass sie aus Persien stammt. Sie ist vollkommen winterhart bei — 16° Reaum., nimmt in jedem feuchten Boden ein gutes Wachsthum an und zeichnet sich durch ihre gigantischen Formen besonders aus, so dass die neben ihr stehenden italienischen Pappeln (Pop. fastigiata oder dilatata), ein kümmerliches Aussehen haben. Der Stamm ist bis ins höhere Alter glatt wie polirt, hellblaugrün, ohne alle Flecken und Risse, das Gerüste der Aeste kräftig und versplittert sich nicht in so kleine unansehnliche Nebentriebe. Das grosse, oben schwarzgrüne Blatt sitzt fest am Zweige und ist deshalb weniger beweglich. Die glänzend weisse Unterseite entfärbt sich auch im Laufe des Sommers nicht, sondern markirt den Baum von weitem mit immer gleichem Farbeneffekte. Es ist ein Zierbaum erster Ordnung. Das Holz besitzt feinere Textur als das ordinäre Pappel-Holz und ist auch als Nutzholz jedenfalls bei weitem vorzuziehen. Wir empfehlen den Baum jedem Natur- und Gartenliebhaber aufs Wärmste.« 1—2jährige Veredlungen p. 1 St. 5 M., p. 10 St. 40 M.

**Salix vitellina Britzensis, Blutrothe Goldweide.** Das 1jährige Holz dieser Weide hat eine leuchtend rothe Färbung, wie bei Cornus sibirica und bildet dieser Baum im Winter eine grosse Zierde sowohl im Park wie als Alleebaum an der Strasse angepflanzt.

Sein Wuchs ist im Ganzen etwas gedrungener als bei der Stammart, die Zweige besitzen aber den gleichen Werth als Bindematerial. Es ist diese Weide in der Nähe der Baumschule zu Britz bei Berlin aus Samen entstanden. 2—3jährige Pflanzen ............ p. 1 St. 1 M. p. 10 St. 8 M.
1jährige Stecklinge ........................................ » 10 » 1,50 » » 100 » 10 »

**Acer Pseudoplatanus euchlorum, Freudig grüner Platanen-Ahorn.** Die herrliche dunkelgrüne Farbe der älteren sowie die leuchtend hellgrüne der jungen Blätter zeichnen diesen Ahorn vor der Stammart aus, die er überdies noch an Grösse der wenig eingeschnittenen Blätter und an Starkwüchsigkeit übertrifft. Obige Form nimmt unter den Ahornsorten den Platz ein, welchen die Krim-Linde (Tilia euchlora oder dasystyla) unter den Linden inne hat. Man kann sich keinen schöneren Kontrast vorstellen in der Färbung des Laubes, als wenn man diesen Acer Ps. euchlorum mit der Varietät A. Ps. foliis purpureis zusammen pflanzt. 2—3jährige Veredlungen p. 1 St. 3 M. » 10 » 25 »

**Lonicera tatarica albo-rosea.** Vor der Stammart zeichnet sich diese Varietät aus durch ihren ungemeinen Blüthenreichthum, durch die hellatlasrosa Färbung und durch die regelrechte Stellung der Petalen rund um die Blume herum, wodurch die einzelnen Blüthen weit grösser erscheinen wie bei der gewöhnlichen Species.
Mehrjährige Sträucher ........................................ p. 1 St. 3 M.

## B. Neue, noch sehr wenig verbreitete Zierbäume.

**Acer dasycarpum Wieri laciniatum** Geschlitztblättriger Silber-Ahorn. Eine äusserst zierliche Form des amerikanischen Silber-Ahorns, wie die hier beifolgende Abbildung eines Blattes zeigt.
1—2jährige Veredlungen ........................ p. 1 St. 2 M., p. 10 St. 15 M.
Junge Hochstämme ........................ » » 4 »



¹/₃ der natürlichen Grösse.
**Acer dasycarpum Wieri laciniatum.**

**Ulmus Dampieri Wredei, Pyramiden Gold-Rüster.** Sind auch in den letzten Jahren unsere Gärten durch viele sehr werthvolle buntblättrige Bäume und Sträucher bereichert worden, die dazu beitragen werden die Reize unserer Parkanlagen wesentlich zu erhöhen und uns gestatten uns an den malerischen Laub-Nüancirungen, die wir bisher nur im Herbste bewundern konnten, den ganzen Sommer über zu erfreuen, so kann doch diese neue Pyramiden-Gold-Rüster unzweifelhaft den besten unter ihnen an die Seite gestellt werden. Die Farbe der Blätter ist intensiv goldgelb, wie bei Sambucus nigra fol. luteis, die Form des Baumes die bekannte schöne Pyramidenform der Ulmus Dampieri an der die Sorte als ein einzelner gelber Zweig vor vier Jahren in den Königl. Gärten zu Potsdam von dem Herrn Garteninspector Wrede aufgefunden ist. 1–2jähr. Veredel. 1 St. 2,50 *M.* 10 „ 20,– „

**Ulmus myrthifolia purpurea. Myrthenblättrige Purpur-Rüster.** Die Blätter dieses zierlichen Baumes sind sehr klein und viel dunkler rothbraun als bei der gewöhnlichen Purpur-Rüster. Sie behalten auch ihre rothe Färbung den ganzen Sommer über. 2jähr. Veredel. pr. 1 Stück 2,50 *M.* pr. 10 „ 20 „

**Ulmus betulaefolia nigrescens**
**Ulmus corylifolia foliis purpureis**
**Ulmus latifolia nigricans**
Diese 3 Sorten bezog ich voriges Winter als neu aus Belgien und ist von ihnen die erstere ähnlich der myrthifolia aber mit grösseren Blättern. Die zweite besitzt noch grössere Blätter und hat beim Austreiben eine purpurrothe Farbe, während die dritte, zur Abart der U. scabra (montana) gehörend, ganz grosse Blätter mit schwarzgrüner Färbung zeigt.
1jähr. Veredlungen p. 1 St. 2,50 *M.*; p. 10 St. 20 *M.* Alle 3 Sorten zusammen à 1 St. 6 *M.*

# Edelreiser,

**für Frühjahrs- und Sommerveredlung.**

Für die Frühjahrsveredlung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen:
Aepfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück 15 ₰; 100 Augen derselben Sorte 1 *M.*
Pfirsiche und Aprikosen à Stück und Sorte 30 ₰
Rosen à Stück 20 ₰
Gehölze à Stück 15–60 ₰

Neue Sorten von Obst und Gehölzen ungefähr ¼ des Preises einer niedrigen Pflanze.
Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.
Ein Reis hat mindestens 6–8 gute Augen.

# Veredelte Obstbäume.

**In grösseren Mengen** veredele ich **nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen** nach wiederholter sorgfältigster Prüfung **als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind.** Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen.

Die **fett gedruckten Sorten sind** entweder von den deutschen Pomologenversammlungen **empfohlen** oder haben sich hier irgendwie ausgezeichnet.

## Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* *bedeutet Tafelfrucht,* † *Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.*
S. *bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;*
H. *bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang October bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;*
W. *bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.*
*Ferner bedeutet:*
Fl. — *Fleisch;*
Fr. — *Frucht;*
gr. — *gross;*
kl. — *klein;*
mgr. — *mittelgross;*
schm. — *Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).*

# Aepfel.

Die **Formbäume** sind auf Doucin und Paradies (Johannisapfel) veredelt.
**Die Buchstaben vor der Nummer** geben an, ob die betreffende Sorte als Hochstamm — *H*, Pyramide — *P*, Spalier — *S*, Cordon — *C*, vorräthig ist.

## Preise.

| | pr. Stück ℳ ₰ | pr. 100 S. ℳ |
|---|---|---|
| **Hochstämme**, sehr schöne mit starken Kronen für dies Jahr erhöhet auf: I. Qualität ℳ 2 bis | 3,— | 175 |
| " in gewöhnlicher Stärke mit Kronen ........ II. " | 1,50 | 130 |
| " schwache nach meiner Wahl ........ III. " | 0,60 | 50 |
| **Schnurbäumchen**, (Cordons), einfache, zu Einfassungen v. Wegen besonders geeignet | 0,75 | 65 |
| do. doppelte und kräftige einfache $1\frac{1}{2}$ bis über 2 Meter lang ℳ 1,25 bis | 1,75 | 110—150 |
| **Spalierbäume**, Palmetten mit einer Etage ........ | 1,25 | 110 |
| do. do. mit 2 Etagen ........ | 2,— | 175 |
| do. do. mit 3—4 Etagen (nur in wenigen Sorten) ........ ℳ 3,50 bis | 5,50 | — |
| **Pyramiden** ........ ℳ 0,75 bis | 2,50 | 65—150 |
| **1jährige Veredlungen**, nur in den mit *P*, *S* und *C* bezeichneten Sorten ........ | 0,50 | 45 |

H. 76. **Alantapfel,** (Grosser edler Prinzessinapfel) **†† W., sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.

P. S. C. 131. **Ananasapfel, Rother** **†† Sept.—Oct. Fr. mgr. zart und saftig.

H. 298. **Antonowka**; Beliebter russischer Winterapfel.

H. 301. **Aport**; Russischer Herbst- und Winterapfel.

H. 475. **Assessorapfel.**

H. P. S. C. 86. **Astrakan, Rother** *††. Ende Juli—Mitte Aug. Gute Marktfrucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung selbst in rauhen Gegenden zu empfehlen. Wegen der Schönheit der Früchte nicht für Pflanzungen an Landstrassen geeignet.

H. 83. **Astrakan, Weisser.** Russischer Eis-A., (Pomme de glace transparente) *† August, Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfrucht sehr schätzbar.

P. S. C. 112. **August van Mons** **†† Oct.—Nov. I., Fr. gr., flachrund, Fl. fein u. saftig, trägt früh u. reich.

H. 291. **Barlowskoje** *†† Ende Sept.—Oct.; Guter Süssapfel.

P. S. C. 127. **Belle de Boskoop** (Reinette de Montfort) *†† Nov.—Dec. I., Fr. mgr. auch gr. Fl. fein und zart, sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.

H. 308. **Bergamottnoje** *†† M. Sept.; zieml. gr., bergamottartig rund.

H. 477. **Birnförmiger** *† Dec.—März.

H. 75. **Blutapfel** †† Nov.—Sommer. Baum sehr fruchtbar; Früchte faulen selten und sind bis Sommer haltbar.

H. 3. **Bohnapfel, Grosser** ††!. W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltungsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhangen und der Baum alle Jahre reich trägt.

H. 296. **Borkowskoje** *†† Aug.—Sept.; Süsser Sommerapfel.

H. 299. **Borowinka** *† Sept.; etwas säuerlich, mit tiefer Blume.

H. P. 10 **Borsdorfer, Edel-** **!†† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.

H. 478. **Borsdorfer, Zwiebel-** *†† Nov.—März.

H. P. S. C. 183. **Borsdorfer, Rudolph's Zwiebel-**; **†† Dec.—März; Frucht sehr fein, mürbe, von fein gewürztem dem Edelborsdorfer oder auch der Orleansreinette ähnlichem Geschmack. Baum trägt früh und jährlich reich.

H. 543. **Bredeke, Winter-** (Breike um Hannover genannt) †† W.

P. S. C. 66. **Cadeau du général** (Vaugoyeau) **†† Dec.—März I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig, vorzügliche Frucht.

P. S. C. 162. **Calvill von Boskoop** **†† Jan.—April. Fr. gr. und fein.

H. P. C. 179. " des femmes **† Febr.—Mai I. Fr. mgr., Fl. locker und saftig; besond. schätzb. Tafelfr.

H. 420. " **Fraas' Sommer-** **† Sept.

H. P. S. C. 70. " **Garibaldi's** **! Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht;

H. P. S. C. 99. " **Rother Herbst-** (Edelkönig) *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für rauhe oder feuchte Lagen, wächst langsam.

H. 302. " **Rother Sommer-** *† Ende Aug.

P. S. 91. " **Rother Winter-** **!† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschützte Lage.

P. S. C. 69. " **von St. Sauveur** **† Nov.—Dec., gr. mit weinbeerartigem Zuckergeschmack, fruchtbar, wächst lebhaft.

| | |
|---|---|
| H. P. S. C. | 78. **Calvill, Weisser Winter-** (Calville blanc) **!† W. Fr. gr., gehört zu den besten Tafeläpfeln. Wuchs als Hochstamm mittelmässig. |
| H. P. | 59. **Cardinal, Geflammter weisser** *† W. Fr. gr., zu ökonomischen Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich. |
| H. P. S. C. | 163. **Cellini** **†† Oct.—Novbr. L, Fr gr. und von sehr schönem Aussehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich reich und sehr früh tragbar; auf Paradies oder Doucin veredelt oft schon im 2. Jahre mit Früchten besetzt. |
| H. P. S. C. | 74. **Charlamowsky** (Nalivia) *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für rauhe Lagen passend. |
| H. P. | 28. **Citronenapfel, Winter-** *††W., der Baum zeichnet sich durch Gesundheit und Tragbarkeit aus; verdient häufige Anpflanzung |
| H. P. | 390. **Cousinot, Geflammter** *†† Sept.—Oct., mgr. u. gr., Fl. locker v. weinartigem Zuckergeschmack, sehr fruchtbar. |
| H. P. S. C. | 79. **Edelapfel, Gelber (Golden noble)** *†† H.—W. Fr. gr. Schätzbare Marktfrucht. |
| H. P. S. | 211. **Edelböhmer** **† Nov.—Febr.; einer der schönsten und zartesten Rosenäpfel aus Tyrol; bald und reich tragend. |
| H. P. S. | 100. **Edelrother** **!†W., mgr., hübsch roth marmorirt, saftreich, sehr gewürzhaft u. delicat, Baum früh und reichtragend, besonders für warme Lagen geeignet. |
| H. | 15. **Eiserapfel, Rother** (Rother, drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée. †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet) Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre. |
| P. S. | 115. **Emilie Müller** **††W. mgr., gelblich grün, sehr saftreich, v. köstlichem Reinettengeschmack, trägt reich. |
| H. | 339. **Esopus Spitzenburgh** **†† Ende Nov.—Febr. |
| H. P. S. C. | 263. **Findling von Bedfordshire** †† Nov.—März. Ein vorzüglicher englischer Küchenapfel gross und schön, gleicht im Geschmack den Reinetten. Baum starkwüchsig und fruchtbar. |
| H. | 483. **Freiherr von Trauttenberg** **†† Nov.—Jan. Sehr schätzbar. |
| H. | 90. **Fürstenapfel, Grüner** †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar. |
| H. | 24. **Gewürzapfel, Sommer-** *†† Anf. Aug. Einer der frühesten Aepfel. |
| P. S. | 46. **Gloria mundi** *†† Oct.—Dec., sehr gr. und schön, fruchtbar. |
| H. P. S. | 12. **Goldzeugapfel** (Drap d'or) **†† Novb.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Aepfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden. |
| H. P. S. C. | 1. **Gravensteiner** **!† Spt.—Dcbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süss gewürzhaften, ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauhem Klima. |
| P. C. | 208. **Gravensteiner, Rother** **†† H., ähnlich dem gewöhnlichen Gravensteiner, aber viel mehr geröthet. |
| H. P. S. | 284. **Hausmütterchen** †† Oct.—Dec., sehr gr., flachrund, saftreich, v. süssweinartigem Geschmack. Baum starkwüchsig. |
| H. P. S. C. | 248. **Hawthornden-Apfel** †† Oct.—Nov. Hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum Seinesgleichen. |
| H. | 369. **Holländer, Doppelter** *†† Nov.—Jan. Schöne Marktfrucht. |
| P. C. | 177. **Jacob Lebel** (Jaques Lebel) **†† Oct.—Nov. saftreicher Apfel von edlem Zuckergeschmack. |
| H. P. S. C. | 95. **Jansen von Welten** **†† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum bleibt in allerlei Boden gesund und trägt bald; verdient die häufigste Anpflanzung. |
| P. S. C. | 132. **Jaquins-Apfel** **†† Nov.—Frühj. L, Fr. gr., Fl. locker und saftig. Werthvolle Tafelfrucht. |
| H. P. S. C. | 39. **Kaiser Alexander** *†† E. Oct.—Jan. Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen. |
| H. P. S. C. | 2. **Kantapfel, Danziger** **†† Oct.—Dec., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürbem, saftreichem, fast schmelzendem Fleische u. von gewürzigem süssem Weingeschmacke, verlangt guten Boden. |
| H. | 303. **Karitschnewoje** **† Anf. Sept.; mgr, fein süsssäuerlicher Tafelapfel. |
| H. | 484. **Königsapfel, Kunze's** **†† Nov.—Apr. Ein recht guter Taubenapfel. |
| P. | 102. **Köstlichste, Der** (Lazzarola, Cossensa in Süd-Tyrol) **†W., mgr., rundlich ausserordentlich saftreich u. gewürzt. für wärmere Lagen und für Formbäume geeignet. |
| H. | 72. **Krummstiel, Rheinischer** †† Nov.—März. Frucht saftreich von süss weinsäuerlichem Geschmack. Baum kräftig. |
| H. | 167. **Küchenapfel, Mank's** (Mank's Codlin) *†† Ende Aug., mgr. u. gr., wachsgelb, sehr saftreich, v. süssweinigem Geschmack, reichtragend. |
| H. P. S. C. | 18. **Kurzstiel, Königlicher** (K. rother K., Courtpendu rouge royal) **††W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauhen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hangen müssen. |
| H. | 485. **Liebling, William's** (William's Favorite) **†† Anf. Aug. Früher Sommerapfel I Qualität. |
| H. | 486. **Limburgerin** (Limbourgeoise) **†† Oct.—Dec. |
| H. | 4. **Luiken-Apfel** *††! Oct.—Jan. Vorzüglicher, besonders in Würtemberg hochgeschätzter Apfel, sehr spät blühend. |
| P. S. C. | 118. **Morgenduft-Apfel** *†† Dec.—Mai. Fr. mgr.; trägt bald und sehr reich. |

H. 487. **Mutterapfel, 3 Jahre dauernder** †† März—mehrere Jahre.
H. P. 450. **Nonpareil, Alter** (Grüne Reinette) **† Jan.—Mai, mgr., gelbgrün, saftreich, gewürzhaft; muss spät gebrochen werden, trägt früh u. reich.
H. 488. **Papierapfel, Polnischer** (Papierki) †† W. Ein Süssapfel von grosser Fruchtbarkeit.
P. S. 35. **Parmäne, Herefordshire** **†† Dec.—März. Fr. mgr., delikat; ausserordentlich fruchtbar.
H. P. S. C. 73 „ **Scharlachrothe** (Engl. sch. P., Oxford peach apple) **†† H. Der Baum wächst in schwerem und leichtem Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.
H. P. S. 135. „ **Schwarzenbach's** **†† Nov.—Febr. I., Fr. gr., Fleisch fein und locker, gewürzt.
H. P. S. 38. „ **Sommer-** (Gestreifte S.-P.) **† Sept.—Oct. Der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.
H. P. S. 8. „ **Winter-Gold-** (Englische W.-Goldp.) **!†† Dec.—März. Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht und springt nie im Regen auf, eignet sich aber nicht zur Weinbereitung, weil sie zu süss ist. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.
H. P. S. C. 140. **Pepping broad Eyed** **! Sept.—Oct. Fr. sehr gr. und schön.
H. P. C. 80. **Pepping, deutscher Gold-** (Herrenhäuser deutsch. Gldp.) **††W. Fr. muss bis Ende Oct. am Baume hangen. Baum gesund und fruchtbar.
H. 490. **Pepping, Gelber von Ingestrie** *† Ende Sept.—Oct.; Sehr tragbar.
C. 124. „ **London-** **†† Ausserordentlich reichtragend.
H. P. S. C. 31. „ **Parker's** (Parker's grauer Pepping) **†† Dec.—März. Sehr zu empfehlen. Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.
H. 89. **Pepping, Punktirter Knack-** **††W. Verdient besonders in nördlichen Gegenden angepflanzt zu werden, gedeiht in leichtem u. schwerem Boden. Fr. verträgt ziemlich frühes Brechen. Reife tritt im Januar ein.
H. P. S. C. 32. **Pepping, Ribston-** (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.) **†† W. Sehr empfehlenswerth, besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh u. reich.
H. 494. **Pepping, Spencer's** *†† Jan.—S. Gewürzhaft und reichtragend.
H. 495. „ **Weisser kentischer** *†† Oct.—Dec.
H. 300. **Plodowitka** *†† Mitte Sept.—Oct.; sehr schön u. von gutem Geschmack, dem Charlamowsky ähnlich, reichtragend.
H. P. S. C. 138. **Pojnik** **†† Dcbr.—Mai. Fr. gr., vorzüglich für Tafel und Wirthschaft.
H. P. S. C. 164. **Pomona, Cox's** *†† Oct.—Nov. II. Fr. s. gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelzierde und für Haushalt sehr brauchbar.
P. S. C. 14. **Prinzenapfel** (Nonnen-, Melonenapf., Hasenkopf v. Lübben) II., mgr., walzenförmig saftreich u. locker, wird im Oct. am Baum reif, hält sich bis Weihnachten, wächs in allerlei Boden und ist sehr tragbar.
P. S. 133. **Prinz Nicolaus von Nassau.**
H. 496. **Rambour, grosser** (Pfundapfel) †† Nov.—Jan. Baum von prachtvoller Krone und sehr fruchtbar.
H. 77. **Rambour, Lütticher** †† W. Fr. gr., für den Landmann recht passend.
H. 493. „ **Rother Sommer** †† Sept.—Oct. Grosse hübsche Frucht.
H. P. S. C. 11. **Reinette, Ananas-** **!†† Nvbr.—Frühjahr, ein sehr saftvoller mgr. Apfel von angenehm gewürzhaftem, weinigem Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen u. gedeiht auch in magerem Sandboden.
H. P. 37. **Reinette, Baumann's** (Baumann's rothe Winter-R.) **†† Dec.—März. Ziemlich grosse, werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.
H. 499. **Reinette, Brüsseler gefleckte.**
H. C. 9. **Reinette, Carmeliter** (Lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truitée, Französ. Gold-R., Limonen-R.) **†† Januar—Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süssem Geschmack und ausgezeichneter Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehmboden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich, und zeichnet sich durch eine fast kugelrunde Krone aus, weshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.
H. 500. **Reinette, Casseler gelbe** **†† Nov.—März. sehr schöne und schätzbare Frucht.
H. P. S. C. 16. **Reinette, Champagner-** (Herrnapfel, Loskrieger, Fürstl. Tafel-A., Glas-Rein. etc.) *††W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hangen auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hangen bleiben können. Fr. dauert ein Jahr.
H. 501. **Reinette, Cox' Orangen-** **†† Nov.—März. Tragbare sehr delikate Frucht.

H. P. 92. **Reinette, Crede's Quitten-** **††W. Der Baum liebt trocknen Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.

H. 502. Reinette de Fauquemont. Aus Falkenberg in Limburg.

P. 117. Reinette, Dietzer Gold- **†† W., mgr., Fl. fein, saftreich, v. zimmtartigem, süssweinigem Geschmack, muss spät gebrochen werden. Baum raschwüchsig, tragbar.

H. 365. Reinette, Dietzer Mandel- **†† Dec.—S. Delikat und sehr fruchtbar.

H. P. S. C. 17. **Reinette, Englische Spital-** **†† Nov.—Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.

H. 84. Reinette, Fromm's Gold- **†† Nov.—Jan. Fr. gr. u. schön goldgelb; Baum gross u. sehr fruchtbar.

P. S. 33. **Reinette, Gäsdonker** **†† Dcbr.—Mai; Fr. mgr., delikat; gedeiht auch in rauheren Lagen.

H. 516. Reinette, Gestreifte Sommer-, fast **†† Sept.—Oct. Sehr süss, gewürzhaft und tragbar.

H. P. S. C. 41. **Reinette, Gold-, von Blenheim** (Blenheim Pepping) **!†† Winter. Fr. hält sich bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.

H. P. S. C. 6. **Reinette, Grosse Casseler** (Deutsche Goldrein., Dutch Mignonne, Holländ. Gold-Rein.) **†† März—Juli einer der vorzüglichsten Aepfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzüglich zur Mostbereitung.

H. P. S. C. 20. **Reinette, Harbert's** (Harb. Rambourrein) **†† Dec.—Apr., gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.

H. 507. Reinette, Köstliche von Newtown (Newtow-Pippin) **†† Jan.—Apr.

H. 508. „ Lehnhoff's *†† Nov.—März.

H. 320. „ Limonen- **†† Dec.—S.

H. 509. „ Mauss' **†† Nov.—Febr.

H. 510. „ Molly *†† W. Sehr tragbar.

P. C. 103. „ Muskat- **†† W., mgr. zart, äusserst gewürzhaft, als Handelsobst sehr beliebt. Baum trägt gewöhnlich reich, liebt aber keine warme Lage.

H. 511. Reinette, Neue Borsdorfer fast **†† Dec.—Apr. Grösser als der Edel-Borsdorfer.

H. P. S. C. 285. „ Oberdieck's **†† Jan.—März mgr. sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.

H. P. S. C. 19. **Reinette, Orleans-** (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Goldrein. **!†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8—10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.

H. P. S. C. 7. **Reinette, Pariser Rambour- (Rein. von Kanada)** *†† Dec.—Frühj. Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniessbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.

H. 512. Reinette, Pomphelias *†† Nov.—Dec. Grossfrüchtig und reichtragend.

H. 513. „ Portugiesische graue *†† W.

H. 514. „ „ weisse *†† W.

H. 515. „ Quarrendon. ? = Scharlach-Pepping.

H. 318. „ **Schmidtberger's rothe** **†† Dec.—Apr. Vortreffliche Frucht, volltragend.

H. 517. „ Schwarzen's Blut-.

H. 519. „ Szecheny *†† Oct.—Jan. Schöne Frucht, sehr tragbar.

H. 520. „ Van der Laan's Gold- *†† Nov.—Dec.

H. 505. „ von Bordeaux **†† W. Schöne Goldreinette.

H. P. S. C. 81. „ von Breda **†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.

H. 522. Reinette von Duven's Zucker- *†† Ende Nov.—Ostern Fr. stark gezuckert.

H. 523. „ von Madeira **†† Dec.—März.

H. 526. „ von Schwöbber.

H. P. S. C. 88. „ von Sorgvliet **†† Dec.—Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum.

P. S. 129. „ Weidner's Gold- **†† Nov.—März, mgr., flachrund, saftreich, etwas citronenartig gewürzt, Baum wächst rasch und ist tragbar.

H. 527. Reinette, Weisse englische fast **†† Dec.—Apr.

H. 528. „ Wilkenburger, Herbst- **†† Sept.—Oct.

H. 295. Repka, Rosenrother; Russischer Wintertafelapfel.

P. S. 110. **Richard, Gelber** **†† Nov.—Dec.; ziemlich gr., eine werthvolle Frucht aus Meklenburg.

H. 529. Roi d' Angleterre.

H. 130. Rosenapfel, Müschen's **†† Anf. Sept.—6 Wochen.

P. 137. Rosenapfel, Schiller's **†† Oct., Fr. gr.

H. 531. **Rosenapfel, Schwedischer.**

H. P. 13. **Rosenapfel, Virginischer** (Virg. Sommer-Rosenapf.) (*) *†† Anfang Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.

P. S. 61. **Rosmarinapfel, Weisser** (Italienischer Rosm.-A.) **† Nov.—Febr. Fr. mgr. sehr fein.

H. 532. **Russet, Dietzer Winter-,**

H. 533. **Russet, Pile's** *†† Nov.—Febr. Schätzbare Frucht.

H. 534. **Sämling, Lucombe's** †† Oct.—Jan. Früh und reich tragbar.

H. 427. **Schmantapfel, Grosser,** †† W., gr., mürbe, saftig, weinsäuerlich, guter Wirthschaftsapf. Baum kräftig.

P. S. 60. **Schöner aus Kent** (Beauty of Kent) *†† Oct.—Dcbr. Fr. gr., schön gefärbt, angenehm schmeckend.

H. 304. **Serjanka** (Lehmapfel); Guter Herbstapfel aus den Russischen Ostseeprovinzen.

H. 306. **Skrischapfel; Russischer Winter-Tafelapfel.**

H. P. S. C. 262. **Sondergleichen, Langton's** *†† Oct.—Jan. Vorzügliche Weinfrucht welche wegen der Härte des Baumes u. Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.

H. 536. **Sperberapfel, Früher** (L'épervier) *†† Aug.—Sept. 4 Wochen. Reichtragend.

H. P. C. 250. **Stettiner, Gelber Herbst-** *†† H.—W.; mgr., sehr saftig.

H. 537. **Stettiner, Grüner** *† Dec.—W. Sehr lange haltbar; ausserordentlich starkwüchsig.

H. 71. **Stettiner, Rother** (Rother Herrenapfel, Rostocker) *†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich in manchen Gegenden nicht gesund.

H. 417. **Streifling, Aechter Winter-** *†† W. gr., Fl. locker, weinsäuerlich. Für Strassenanpflanzung zu empfehlen.

H. 305. **Swinzowka** *† Oct.; zieml. gr., schwach gerippt.

H. P. S. 47. **Taffetapfel, Weisser** (Taffetas blanc d'hiver) *†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.

P. S. 126. **Taubenapfel, Neuer englischer** *†† Nov.—Febr. (Neuer engl. Pigeon); gr., glänzend roth v. sehr schönem Ansehen. Fl. ziemlich fein, etwas zimmtartig u. süssweinig schmeckend. Baum wächst gut.

P. S. C. 5. **Taubenapfel, Rother Winter-** (Pigeon rouge, Mandel-A.) **† Novbr.—Frühj., nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in sandig m oder zu feuchtem, trägt so reich, dass er ausgepflückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hangen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktfrucht I. Ranges. Wuchs mässig.

P. S. C. 128. **Taubenapfel, Schiebler's** **† Nov.—Febr. gr., mattgelb, von zart gewürztem, kalmusartigem Geschmack, mit feiner Säure. Baum wächst nicht stark.

P. S. C. 108. **Taubenapfel von St. Louis** **† H.; mgr. weinsäuerlich, sehr saftreich, eine wahre Zierde für die Tafel, hält sich jedoch nur etwa 3 Wochen. Baum kräftig, fruchtbar.

H. 297. **Titowka, Gelbe** **† Sept.—Oct.; Sehr gute dem Gravensteiner ähnliche Tafelfrucht.

H. 307. **Tschernoje Derewo**; mgr. Winterapfel aus Russland.

H. 538. **Türkenapfel** *† W.; hoch gebaut, carmoisin gestreift.

H. 412. **Uelzener Apfel** (Apf. v. Uelzen) *†† Dec.—Mai; gr., etwas quittenartig schmeckend, gute Haushaltsfrucht.

H. 400. **Währapfel Wilkenburger** **†† April—Pfingsten.

P. S. 139. **Wagener-Apfel** **†† Nov.—Febr.; Amerikan Sorte, gr., flach, ziemlich saftreich, stark gewürzt, fein säuerlich, fault nicht leicht. Baum fruchtbar.

H. 539. **Wahnschaftsapfel.**

P. S. 125. **Warner's King** †† Novbr., sehr gross und gut.

H. 160. **Warraschke, Gubener** †† Dcbr.—Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbar.

H. 540. **Weinapfel, Lahnischer** †† W. Guter runder Mostapfel, lange haltbar.

H. 541. **Wildling, Leipaër** *†† Oct.—Dec.

H. 542. **Wilhelmsapfel, Credes** †† Nov.—Winter. Grosse gute Fr. auch noch zum Rohgenuss.

H. 98. **Zimmetapfel, Sommer-** (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automne, Couleur de chair) **†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen u. gehört zu den schätzbarsten Sommer-Aepfeln.

---

## „Nachstehende Sorten sind nur als 3jährige Veredlungen auf Wildling zu haben.

p. Stück ........................................ 1 *M.*

(119). 322. **Agatapfel, Doppelter** *† W.

284. „ **Purpurrother** **†† W.

476. **Amerikaner, Neuer** **†† W.

455. **Ananasapfel, Weisser** **†† Oct.—Dec.

228. **Api, Kleiner** *† W.—S.

222. **Baldwin** *†† W.

401. **Bellefleur, Holländischer** *†† Nov.—Frühj.

260. **Birnapfel, Revalscher** *†† Ende Juli—Aug.

270. Böhmer **† W.
462. Böhmer von Kaltern.
463. Böhmer, Wilder.
151. Boikenapfel **†† Jan.—S.
271. Borsdorfer, Cludius **†† Jan.—S.
381. Bough, Süsser *† Aug.
479. Calvill, Fickert's gelber.
456. „ Weisser Sommer- ††M. Aug. 4 Wochen.
258. Cardinal, Blutrother †† Nov.—Febr.
216. Caroline Auguste **† Oct.
241. Carpentin, *†† Dec.—März.
46'. Costardapfel, Englischer.
148. Cousinot, Purpurrother †† Nov.—Juni.
198. Cusset.
441. Erzherzogapfel.
142. Flämisches Mädchen.
268 Frühapfel von Rouen.
392. Fürstenapfel, Gestreifter.
321. Glasapfel, Fachinger †† Jan.—S.
376. Grüner von Sedan.
360. Grünling, Sulinger (Grünecke) †† W.
261. Gulderling, Gelber *†† Dec.—Mai.
460. „ Langer grüner †† fast * Jan.—S.
401. Hasenkopf, Grünhofer *†† W.
382. Hawley **†† Sept.—Oct.
181. Herbstapfel, Cludius' **† Ende Sept.—Oct.
317. Herbstapfel, Hartwig's **†† Oct.—Dec.
391. Herrenapfel, Kleiner *†† Oct.—Dec.
318. Holaart, Süsser *† W.
87. Jungfernapfel, Rother (Rothes Hähnchen) *† H.—W.
109. Jungfernschönchen **†† Ende Oct.—W.
231. Kaiserin Eugenie.
293. Kantapfel, Englischer; ? = Sommer-Gewürzapfel.
272. Kienlesapfel †† Sept.—Oct.
213. Königsapfel von Jersey *†† W.
238. Köstlicher von Kew. (Kew's Admirable) *† bis **†† Dec.—April.
364. Kronenapfel, Mückenheimer Winter-
377. „ Rother **†† W.
338. „ Zimmetartiger **†† Dec.—Frühj.
386. Küchenapfel, Holländischer (Dutch Codlin) †† Sept.—Oct.
439. Küchenapfel, Kentischer (Kentish Codlin) *† Aug.
436. Küchenapfel, Keswicker †† Aug.—Sept. 6 Wochen.
257. Langstiel, Kleiner (Blauschwanz) *†† Nov.—Mai.
445. Mac Lellan **†† W.
482. Margarethenapfel, Rother (Eve-apple) *† Ende Jul. Aug.
343. Mönchsapfel, Grosser *†† Nov.—Mai.
336. Nalivia, Possart's *†† Nov.—W.
150. Nonpareil, Braddick's **†† Dec.—Apr.
333. „ Neuer englischer (Flachrunder N.) **† Jan.—Mai.
471. Nonpareil von Martin **† W.
220. Parisapfel.
(274) 472. Parmäne, Adam's **†† Dec.—März.
432. „ Grange's,
342. „ Rothe Winter- **†† W.
36. Parmäne, Staaten- **†† W.
259. Pepping, Downton- **†† W.
93. „ Duquesne's **†† Dec.—März.
337. Pepping, Englischer Gold- **†† Nov.—März.
230. „ Englischer Scharlach- *†† Aug.—Sept.
319. „ Gold-Pepp. von Grange **† Ende Oct.—Jan.
199. „ Hörlin's **† W.
374. „ Hughe's Gold- **† W.
122. „ Kleiner Stein- **†† W.
278. „ Marmorirter Sommer-**†† H.
350. „ Neuer Stein- **†† Jan.—S.
345. „ Neustadt's gelber *†† Jan.—S.
209. „ Oelkofer *†† W.
492. „ Sommer- Gold- **† Aug., einige Wochen.
58. „ Sturmer's *†† Dec.—März.
253. „ Sulinger.
423. Präsident **†† Oct.—Ende Jan.
457. Prinzessinapfel, Französischer; fast **††, Dec.—S.
82. Quittenapfel, Winter- (Quince-apple Rein. coin.) *†† W.
231. Rambour, Rother Winter- †† Dec.—Frühjahr.
355. „ von Beek.
421. Reinette, Bödiker's Gold- **†† Nov.—W.
334. „ Culon's **†† Dec.—März.
359. „ Elsasser rothe *†† ! Jan.—S.
229. „ Etlin's **†† Jan. S.
397. „ Fette Gold- *†† Nov.—Febr.
347. „ Gay's fast **†† H.—W.
157. „ Gestreifte Canada-; **††Dec.—Frühj.
269. „ Glanz-(Borsdorfer Rein.) *††W.
254. „ Goldgelbe Sommer- *†† E. Sept.—Oct.
233. „ Graue Herbst- **†† Oct.
291. „ Grüne (? = Alter Nonpareil).
433. „ Hildesheimer Saft- *†† Sept.—Oct.
506. „ Honig- (Honigzoete Appel) *†† W.—Frühjahr.
152. „ Hoya'sche Gold- **†† Dec.—Apr.
441. „ Jäger's **†† Nov.—W.
398. „ Kleine zartschalige **† Dec.—W.
236. „ Kräuter-; fast **†† W.
443. „ Kröten- **†† Nov.—März.
376. „ Landsberger *†† Nov.—Jan.
454. „ Lothringer *†† Dec.—Frühj.
239. „ Luxemburger- *†† Febr.
366. „ Multhaupt's *†† Nov.—Febr.
524. „ Normännische **††Oct.—Dec.
130. „ Norwegische Wachs- *†. W.
245. „ Ontz-.
40. „ Osnabrücker *†† W.
466. „ Perl-.
310. „ Rothe Herbst-; fast **††Oct.—Jan.
252. „ Siegende; ? = Orleans-Rein.
446. „ Spanische Herbst- **†† Oct.—Dec.
518. „ Späte Gelbe **†† W.

292. **Reinette, Sürpasse-**
105. „ **Süsse Herbst**; *†† Oct.—Nov.
237. „ **Thouin's** **†† Nov.—W.
267. „ **Van Mons-** **††† W.
521. „ **von Beek** **†† Dec.—Febr.
275. „ **von Damason** (graue Rein.)
249. „ **von Lestre.**
225. „ **von Middelburg** **†† Anf. Dec.—Frühj.
525. „ **von Ohio** **†† Dec.-Febr.
424. „ **Voss'** *†† Dec.—März.
281. „ Weisse Wachs- *†† Sept.—Nov.
280. „ **Willy's** **†† Nov.—Frühj.
205. „ **Woltmann's** **†† Ende Oct. —W.
279. **Rosenapfel, De Jonghe's**
373. „ **Florianer** **†† Oct.—Dec.
459. „ **Französischer.**
438. „ **Mallardi's** (Mela rosa gentile) *†† W.
399. „ **Moringer.**
170. **Russet, Königlicher** †† Dec.—S.
279. **Sämling von Beachamwell** **† Dec. —März.
247. **Saint Germain** (Apfel von) *†† M. Aug.
218. **Schickenapfel.**
346. **Schlotterapfel, Woltmann's** †† Nov. —Febr.
425. **Schmelzling, Tyroler** *†† W.
383. **Schmiedeapfel (Forge)** **†† Oct.—Jan
330. **Schöner aus Westland** (Beauty of the West) *†† Nov.—Dec.
197. **Schöner von Norfolk.** (Norfolk-Beaufin †† Jan.—Mai.
380. **Seidenhemdchen, Weisses** *†† Jan. —S.
313. **Skiliankowoi** *†† Aug. 3 Wochen.
363. **Sondergleichen von Hubardston** **†† Nov.—Jan.
273. **Spitzapfel Müllers** *†† W.
193. **Sternapfel,** (Stern-Api) * W.
367. **Stettiner, Gelber Winter-**
341. **Streifling, Königlicher** †† Dec.—S.
283. **Superintendentenapfel.**
212. **Taffetapfel,** Spätblühender.
437. **Taubenapfel, Crede's** *†† Dec.—Mai.
402. „ **Mayer's** *†† Dec.—Frühj.
256. **Tiefbutzer, Rother** *†† W.—S.
403. **Titowka, Weisse** *†† Aug. einige Wochen.
332. **Vaterapfel ohne Kern** *†† Nov. — Februar.
311. **Vortrefflicher, Fair's** (F's Nonpareil) *† W.
396. **Weinling, Braunauer Winter-** †† Dec.—S.
312. **Wildling, Bödiker's**; fast *†† Oct. bis Dec.

---

# Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Einjährige Veredlungen .................................................... pr. St. 1 ℳ

568. **Beauty of Hants**; Sämling der Goldreinette v. Blenheim, herrliche Frucht. I. Qualität. Farbe dunkelroth, Gestalt kegelförmig.
560. **D. T. Fish**; Nov.—Jan. Enorm gross bis zu 40 Centim. Umfang.
552. **Fürst Bismarck**; nach Lucas eine edlere neuere Sorte; vorzügliche Winter-Goldreinette.
579. **Hampers**; Aug.—Oct.; mgr., kugelförmig, hellgelb mit braunroth verwaschen; saftreich, fein säuerlich, Wuchs gemässigt, sehr fruchtbar.
561. **Hawthornden, Rother**; Sept., gross, abgeplattet, hellgelb, Sonnenseite roth, saftig, leicht säuerlich; sehr starkwüchsig.
587. **Kaiser Wilhelm**; W.; sehr gr., sehr gut, hält sich bis zum Frühjahr, ähnlich einer Goldparmäne. Baum tragbar und wuchshaft. **p. St. 2,50 ℳ**
565. **Kernloser** (Menocher's Noscore); Winter; mittelgross, ausgezeichneter Qualität. Aus Amerika, sehr schön, ohne alle Kerne.
555 **Kurzstiel, Schwarzer**; Winter—Mai; tief blutroth, platt. Tafel- und Zierfrucht.
562. **Lady Henniker**; Oct—Jan.; sehr gross, rund, oben spitz, kantig, gelb mit roth gestreift, zart und gewürzreich.
570. **Monsieur Gladstone**; sehr früh, Sonnenseite scharlach, Fleisch fest und saftig, reichtragend.
553. **Olga Nicolajewna**; W. — Mai; prachtvolle Borsdorfer Reinette aus der Ukräne, sehr starkwüchsig und tragbar. Vollkommen pyramidal.
554. **Parmäne, Henzens**; W., sehr schöner und guter Apfel für Tafel und Most. Baum mittelstark, gesund, sehr reichtragend.
573. **Parmäne, Worcester-**; Aug.—Dec., ausgezeichnet durch ein glänzendes Roth und durch die Vollendung seiner regelmässigen länglichen Form; abknackend, saftreich, Geschmack mild u. angenehm.
558. **Pepping, Geneva-**; Jan.—Mai; grosse, sehr schöne und ausgezeichnet gute einfarbige Reinette aus Nordamerika.
577. **Pepping, Galloway-**; sehr gr., von schönem Ansehen und langer Dauer. **p. St. 2 ℳ**
569 **Pepping, Missouri-**; W.; gross, roth, schön. Gute Marktfrucht. Aus einer grösseren Collection der beste!
563. **Peter Smith**; W.; ausserordentlich fruchtbar, sehr haltbar, von ausgezeichneter Qualität.
556. **Reinette, Henzen's gestrickte**;
564. **Reinette, Hochfeine** (R. superfine); Nov.—Mai; mgr., von sehr guter Qualität, als Hochstamm sehr fruchtbar.

557. **Reinette, Neue Ananas.**;
559. **Rosenapfel, Hohenstaufener**; H, überaus schön bandirt, Ausstellungsfrucht.
578. **Softahalm**; Sept.—Oct, gr., länglich kegelförmig, stark carminroth gestreift, leicht abknackend, süss-säuerlich gewürzt. Baum fruchtbar und wuchshaft.
571. **Sondergleichen, Peasgood** (P.- Nonsuch); Oct.—Dec., sehr gr. und sehr schön wie eine schöne „Goldreinette von Blenheim!“
572. **Sondergleichen, Welford-Park-**; Nov., I. Qualität. Erhielt ein Certificat I. Klasse durch die Londoner Gartenbaugesellschaft.
580. **Yorkshire-Beauty**; Aug.—Sept., 3 Zoll hoher und 3½ Zoll breiter Apfel für Küche und Markt. Gerippt, abgeplattet, gelb, Sonnenseite geröthet. Fleisch zart, saftig, angenehm säuerlich.

---

# Birnen.

Von Formbäumen sind alle Sorten, welche auf Quitte gedeihen, auf diese Unterlage veredelt, die übrigen auf schwachtreibende Wildlinge.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hochstamm, P. = Pyramide, S. = Spalier, 1j. = 1jährige Veredlung auf Quitte abgebbar ist.

## Preise.

| | | pr. Stück ℳ | pr. Stück ₰ | p. 100 St. ℳ |
|---|---|---|---|---|
| **Hochstämme**, sehr schöne, | I. Qualität | 2 | — | 175 |
| do. gewöhnliche mit Kronen | II. „ | 1 | 50 | 110 |
| do. schwächere in Sorten nach meiner Wahl | III. „ | 1 | — | 80 |
| **Schnurbäumchen** (Cordons) nur in einigen Sorten | ℳ 1,— bis | 1 | 75 | 90—140 |
| **Pyramiden** (stärkere nur in einigen Sorten) | 75 ₰ bis | 6 | — | 65—300 |
| **Spalier**, Palmetten mit 1 Etage | | 1 | 25 | 110 |
| do. mit 2 Etagen | | 2 | — | 175 |
| do. mit 3 Etagen, nur in einigen Sorten | | 3 | 50 | — |
| do. mit 4 Etagen „ „ „ „ | | 5 | 50 | — |
| do. mit 5 Etagen „ „ „ „ | | 7 | 50 | — |
| **Einjährige Veredlungen** auf Quitte zu jeder Form passend | | — | 50 | 45 |
| do. do. auf Wildling | | — | 70 | — |

| | | |
|---|---|---|
| P. 1j | 184. | **Alexandrine Douillard** * Oct.—Nov. |
| S. | 677. | **Amerika.** |
| P. S. 1j. | 266. | **Andenken an Bouvier** **! Ende Oct.—Nov. |
| H. P. S. 1j. | 708. | **Andenken an den Congress** (Souvenir du Congrès) ** Aug.—Sept. Fr. s. gr. auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe, Fl. weiss, saftreich, hlbschm. fein parfümirt, Dauer der Frucht 5—6 Wochen. |
| S. 1j. | 712. | **Angelique Leclerc.** |
| P. S. 1j. | 235. | **Angevine, Schöne** (Belle Angevine) † Dec.—Jan Fr. gr., Fl. abknackend, Baum kräftig u. fruchtbar, verlangt nahrhaften Boden. |
| S. 1j. | 701. | **Anna Audusson** * bis ** Oct.—Nov.; zieml. gr. |
| H. | 23. | **Annabirne** **† Aug., Fr. mgr., schm.; Baum kräftig und reichtragend. |
| P. | 296. | **Apothekerbirne, Sommer-** (Bonchrétien d'été) *†† Sept. Frucht unregelmässig, Fl. halbschmelzend, Baum gross und sparrig, verlangt geschützten Stand. |
| H. | 10. | „ **Winter-** (Winter-Gutechristbirne) † Decbr.—März. Gute grosse Haushaltsfrucht; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar, will aber nahrhaften, leichten Boden und warmen Stand. |
| P. S. | 46. | **Baronsbirne** †† Jan.—April. Frucht gr., abknackend, saftreich, von zimmetartigem Zuckergeschmack, wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft u. trägt sehr reich. |
| H. P. S. 1j. | 81. | **Bergamotte, Deutsche National-** (Belle et Bonne) **† Octbr. Frucht gr., von erhabenem Geschmack; wird schnell mehlig und teig, muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut. |
| S. | 407. | „ **Donauer's** *† M.—Ende Oct.; mgr., bergamottrund. |
| H. P. S. 1j | 122. | „ **Esperen's** (Bergamotte d'Esperen) ** März—Mai. Fl. schmelzend, stark gewürzt; Baum pyramidal. |
| P. S. | 308. | „ **Frühe Schweizer-** *† E. Aug.—M. Sept.; mgr., rund. |
| S. | 307. | „ **Hildesheimer** **† Sept.; mgr., sehr tragbar. |
| P. S. | 408. | „ **Löwener** *† Oct.—Nov.; kl. bis mgr. |
| H. P. S. 1j. | 68. | „ **Rothe** *††! A. Oct.—3 Wochen. Für alle Lagen empfehlenswerth. |
| P. | 410. | „ **Strycker's** ** E. Oct.—Nov.; kl. bis mgr. |
| H. P. S. 1j. | 158. | **Butterbirne, Amanlis-** (Beurré d'Amanlis) **† Sept. Fr. gr., fein schmeckend; Baum treibt kräftig und trägt reichlich. |
| H. P. S. 1j. | 59. | „ **Blumenbach's** (Soldat Laboureur) **†! Novbr. Frucht gr. u. schmelzend; Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H. P. S. | 1j. | 47. | **Butterbirne, Clairgeau's** (Beurré Clairgeau) **! Nvbr., zuweilen bis Jan. Fr. gr. von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage. |
| H. P. S. | 1j. | 4. | " **Coloma's Herbst-** (Beurré Coloma, Coloma d'automne Poire Urbaniste) **† Octbr. Fr. mgr. saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist besonders für Pyramiden zu empfehlen. |
| H. P. S. | 1j. | 25 | " **Diel's** (Beurré Diel) **! † Ende Novbr.—Decbr. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagte von ihr: »Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen«. |
| | 1j. | 77. | " **Gellert's** (Beurré Hardy) ** Oct.; mgr., schm. |
| H. P. S. | 1j. | 118. | " Ghélin's (Beurré Ghélin) **! Nov; Fr. mgr. von delikatem Geschmack. |
| S. | | 100. | " Giffard's ** Juli–Aug. Fr. mgr., Fl. sehr fein, saftreich, schm. u. angenehm süss; Baum schwachwüchsig, gedeiht nur in leichtem, nahrhaftem Boden. |
| H. P. S. | 1j. | 692. | " **Graue Herbst-** (Beurré gris) **!† Oct. Eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überfliessend butterhaft mit feiner Muscatellersäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden. |
| H. S. | | 2 | " **Grumkower** (Grumkower Winterbirne) **† Nov. Fr. gr., saftig u. angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeinen Anpflanzung sehr zu empfehlen, auch für Alleen geeignet. |
| H. P. S. | 1j. | 8 | " **Hardenpont's Winter-** (Hardenpont d'hiver, Beurré d' Hardenpont) **!† Novbr.—Jan. Fr. gr., eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten nahrhaften Boden. |
| H. P. | 1j. | 220. | " Hochfeine (Beurré superfin)* ††Oct.–Nov: mgr., butterhaft, fein gewürzt. |
| H. P. S. | 1j. | 76. | " **Holzfarbige** (Fondante des bois) **!†† Octbr. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross. |
| H. P. S. | 1j. | 7. | " **Liegel's Winter-** (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne) **!† Decbr.—Jan. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut und ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen. |
| H. P. S. | 1j. | 49. | " **Knight's Herbst-** |
| H. P. S. | 1j. | 5. | " **Napoleon's** (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon) **†† Ende Oct.—Nov. Fr. mgr., sehr saftig und von erhabenem Geschmacke. Baum ist ausserordentlich fruchtbar und zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen. |
| H. P. S. | 1j. | 149. | " **Sterkmans'** (Beurré Sterkmans) ** Nov. — Jan.; mgr., saftreich, v. gewürztem, weinigem Zuckergeschmack; Wuchs kräftig. |
| S. | 1j. | 121. | " **Van Mons** (Poire Van Mons) **! H.; gr., stark rothbraun berostet, schmelzend, angenehm gewürzt. Für Formbäume und warme Lagen geeignet. |
| H. P. S. | 1j. | 1. | " **Weisse Herbst-** (Beurré blanc) **!† Oct. Fr. gr., saftreich u. butterhaft. Baum wird mittelgross und wächst auch auf feuchtem, sandigem Boden. |
| P. S. | 1j. | 3. | **Capiaumont** (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont. Carthäuserin) ** †† Octbr. Fr. mgr. und sehr wohlschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet. |
| H. P. S. | 1j. | 41. | **Christbirne, Williams'** (Bonchrétien Williams) **† Septbr. Fr. gr, sehr feinschmeckend; Baum bleibt in jedem Boden gesund und liefert reiche Ernten. |
| H. P. S. | 1j. | 181. | **Colmar, Arenberg's** **† Nov.; gr. citronengelb, schmelzend, delikat; besonders für leichten nahrhaften Boden und als Formbaum passend. |
| H. P. S. | 1j. | 74. | **Crasanne,** (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne) * † Oct.–Nov. Fr. platt, Fl. butterhaft von delikatem fein säuerlichem Geschmack; Wuchs kräftig. |
| H. P. | | 167. | **Crasanne, Neue** (Surpasse Cras.) * E. Oct. 3 Wochen |
| P. S. | 1j. | 150. | **Dechantsbirne, Goubault's** * Novbr.–März. Fl. fest. doch schm., von gewürzreichem, weinigem Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar. |
| P. S. | | 70. | **Dechantsbirne, Jamin's.** |
| P. S. | | 829. | " **Juli-** (Doyenné de juillet) ** Ende Juli. |
| H. P. | 1j. | 12. | " **Schmidt's Sommer-** |
| H. P. S. | 1j. | 206. | " **Vereins-** (Doyenné du Comice) **, Oct.–Nov. |
| H. P. S. | 1j. | 19. | " **Winter-** (Pastorale, Doyenné d'hiver, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne) **!† Dec.—März. Fr. gr., saftig, von Muskatellergeschmack. Anfang October zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich. |
| P. | | 573. | **Doctor Bouvier** ** Febr.—März. |
| P. | | 331. | **Eierbirne, Woltmann's** *†† S. |
| H. | | 766. | **Feigenbirne, Holländische** **† Ende Sept. |

H. P. S. lj. 20. **Flaschenbirne, Bosc's** (Beurré d' Apremont, Calebasse Bosc) **!† Octbr.—Novbr. Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark und ist fruchtbar, verlangt leichten, warmen Boden.

H. P. S. lj. 6. **Forellenbirne** (Poire Truite) **!† Novbr.—Jan. Fr. mgr. und sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.

P. S. 147. **Fulvie, Neue**, ** Novbr.—Jan. Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.

H. P. 64. **Gaishirtenbirne, Stuttgarter** (Langgestielte Stuttgarter Russalet) **!† Aug. Fl. butterhaft, vollsaftig mit zimmtartigem Geschmack, eine der feinsten Sommerbirnen. Baum pyramidal, reich tragend.

P. S. lj. 73. **General Totleben** ** Decbr.—Febr. Fr. sehr gr. und saftreich.

H. P. S. lj. 14. **Gute Graue** (Sommer-Beurré gris, Schöne Gabriele) **††! Sept. Fr. kl., von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.

H. P. S. lj. 139. **Gute Luise von Avranches** (Louise bonne d'Avranches) ** Sept.—Octbr. Fr. gr. sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar verdient im Grossen angepflanzt zu werden.

H. P. S. lj. 43. **Herrenbirne, Esperen's** (Seigneur d'Esperen-, Oberdieck's Butterb.) **† Sept. bis Octbr. Fr. mgr., delikat schmeckend, Baum wächst schön pyramidal, rasch und gesund, wird früh tragbar.

H. P. S. lj. 128. **Herzogin von Angoulême** (Duchesse d'Angoulême) ** Nov. — Dec. **sehr gr.** butterhaft, v. süssem zimmtartig gewürztem Geschmack. Eine wegen ihrer Grösse sehr geschätzte Birne; doch wird sie in schlechten Jahren und an jungen Bäumen oft grobkörnig.

P. S. 450. **Herzog von Nemours** ** Oct.—Nov.

S. 344. **Honigbirne, Liegel's** *†† S.

H. 868. **Honigbirne, Ostpreussische** *†† Aug.—Sept.; eine mgr. in Ostpreussen sehr verbreitete Birne. Baum sehr starkwüchsig u. winterhart.

P. S. 257. **Howell** * M. Oct.

H. 38. **Hoyerswerdaer, Grüne** *††! Aug.—Sept. Fr. mgr. Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.

H. P. 346. **Jacobsbirne, Hannoversche** ††

P. S. lj. 253. **J. J. Gilain** ** Sept.—Dec.; sehr gross.

P. S. lj. 112. **Jules de Liron d'Airoles** (Leon Leclerc) **! Fr. mgr. von ausgesucht feinem Geschmack.

P. S. 590. **Kaiserbirne mit Eichenblatt** *† April—Mai.

H. 22. **Kampervenus** (Kamper Peer) †† Nov.—Febr. mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich u. kommt in jedem Boden fort.

H. 9. **Katzenkopf, Grosser** (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac) †† Novbr.—Mai. Frucht sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.

H. 82. **Klevenower** *† M. Aug., 3 Wochen.; mgr., muskatellerartig, in Pommern vielfach zum Einmachen benutzt. Baum sehr starkwüchsig und hart.

P. 566. **Knackbirne, Kardenpont's** (Cassante d'Hardenpont) † Jan.—Febr.

P. S. lj. 104. **Königin der Birnen** (Reine des poires) ** Oct.—Dec.; mgr. saftreich, etwas körnig halbschmelzend, von angenehm gewürztem Zuckergeschmack.

H. P. S. lj. 16. **Köstliche von Charneu** (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delices de Charneu **† Octbr.—Novbr. Frucht gross u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen nahrhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet.

H. P. S. 21. **Kuhfuss** ††! Septbr. Frucht gross, für den Haushalt schätzbar u. die beste Birne zum Backen. Baum wächst sehr stark, wird gross u. alt, gedeiht in schwerem u. leichtem Boden.

H. P. S. lj. 61. **Leckerbissen, Hardenpont's** (Delices d'Hardenpont) **! Oct. Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.

P. S. lj. 127. **Leckerbissen, von Jodoigne** (Delices de Jodoigne) ** E. Sept.—Octbr. Fr. mgr., schmelzend und gezuckert.

H. P. lj. 831. **Louis Dupont**; hier nicht-Coloma's Butterb.

H. P. S. lj. 106. **Madame Elisa** ** Octbr. — Novbr. Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.

H. P. S. lj. 29. **Magdalene, Grüne** (Grüne Margarethenbirne) **† Juli. Wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.

P. S. lj. 109. **Maibirne, de Jonghe's** **† Eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbare Frucht.

H. (801) 921. **Marie Louise** (Duquesne) **!† Octbr.—Novbr. Fr. gr. und delikat. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas zärtlich.

H. P. S. C. 44. **Marie Luise** (nicht Duquerne) *†† Sept.—Oct.; gr., hübsche Fr.; starkwüchsig, auch auf Quitte, sehr reichtragend.

P. lj. 102. **Mundretzbirne, Runde** **!† Ende Aug.

H. 26. **Muskateller** *† Vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.

S. 357. **Muskateller, Französische** *† S.

H. P. S. lj. 18. **Nelis, Winter-** (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines) ** Decbr.—Jan. Fr. mgr., schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh und reichlich.

H. P. S. 1j. 130. **Pastorenbirne** (Schöne Andrine) *† Novbr.—Febr. Sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.

S. 767. **Pennsylvania.**

H. 1j. 870. **Pfalzgräfin, Kleine** *†† M. Sept. Sehr gute Marktfrucht, in der Gegend von Meiningen ausserordentlich beliebt; starkwüchsig.

H. P. S. 1j. 69 **Philipp Goes (Baronne de Mello)** ** Oct.—Dec. Fr mgr.. von gewürzreichem Geschmack; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort.

H. P. S. 1j. 177. **Philippsbirne, Doppelte** (Beurré de Mérode Double Philippe, Doyenne Boussoch) ** Octbr. Fr. gr., vortrefflich im Geschmack.

H. P. S. 1j. 57. **Poiteau, Neue** ** Octbr.—Novbr. Fr. gr., delikat; auch für nördlichere Gegenden.

P. S. 245. **Präsident Müller.**

P. S. 246. „ **Royer.**

S. 244. **Président d'Osmonville** ** Novbr.—Decbr. Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.

P. S. 1j. 111. **Prince imperial de France** ** Octbr. Fr. gr., sehr werthvoll

P. 247. **Professor Henau.**

H. P. 1j. 17. **Regentin** (Passe Colmar, Colmar souverain) **!† Decbr.—Febr. Fr. gr., schätzenswerthe Winterbirne, Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.

H. P. S. 75. **Rettigbirne, Leipziger** *††! E. Aug.—M. Sept.

P. S. 279. **Rostietzer** **† Aug.—Sept.

H. P. S. 1j. 156. **St Germain** (St Germain d'hiver) **! Novbr.—Jan. Fr. gr., von angenehm erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden.

H. P. S. 1j. 24. **Schmalzbirne, Römische** (Tafelbirne, Beurré romain) **††! Aug.—Sept. Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross u. trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.

P. 1j. 522. **Schwesterbirne** (deux soeurs) ** Oct.—Nov.

S. 698. **Siebenbürgerin** (Transsylvanienne) * Sept.

H. P. 1j. 13. **Sommerdorn, Punktirter** (Epine d'été) **††! Septbr. Fr. mgr. u. delikat; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.

H. P. S. 1j. 239. **Späte von Toulouse** (Tardive de Toulouse, Duchesse d'hiver) **! März — April. Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüthen sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte.

S. 40. **Sylvester, Herbst-** (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Württemberg, König von Würtemberg) **!† Octbr. Frucht gr., eine feine Tafelbirne, Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.

H. 11. **Tafelbirne, Grüne** (Fürstliche Tafelbirne) **†† S.

P. S. 1j. 255. **Thompson** **! Oct.—Nov. Fl. delicat süssweinig; Baum von mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.

P. S. 1j. 87. **Tongres, Birne von** (Poire de Tongres) **! Oct.—Nov. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süssem Geschmack und schmelzendem Fl.; Fr. gr.

H. P. S. 1j. 137. **Triumph von Jodoigne** ** Novbr.—Decbr. Fr. gr., vortrefflich.

H. P. S. 1j. 84. **Wildling von Montigny** (Besi de Montigny) ** Octbr. Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.

H. P. S. 1j. 15. „ **von Motte** (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte) **† Octbr.—Novbr. Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.

P. S. 390. **Zuckerbirne, Heyer's** *†† Sept.

---

**Nachstehende Sorten sind nur auf Quitte veredelt als Pyramide oder Cordon zu haben:**

Mehrjährige Pyramiden . . . . . . . . . . . . . . . p. Stück *M.* 1—1,50
„ Cordons . . . . . . . . . . . . . . . „ „ „ 1—1,50

C. 822. **Amand Bivort** **† Oct.

P. 710. **Amandine de Rouen.**

P. 293. **Ambrette, Sommer-** **† Sept.—Oct.

C. 777. **Ananasbirne von Courtray** **†! Septbr.

C. 773. **Augustbirne, Diel's** ** M.—E. Aug.

P. 548. **Bergamotte, Dussart's** ** Novbr.—Jan.

C. 824. „ **Lübecker Sommer-** **† Sept.—Octbr.

P. 250. „ **Poiteau** ** Sept.

C. 794. „ **Volltragende** *†† Sept.—Oct.

P. 48. **Beurré de Jelles** (? = Nina)

P. 733. „ **Oudinot.**

P. 735. **Bonchrétien de Bruxelles.**

P. 650. **Butterbirne, Bennert's** * oder ** Decbr.—Febr.

P. 556. „ **Berkmann's** **† Nov.—Dec.

C. 825. „ **Boisbünel's.**

P. 775. „ **Bremer** **† Nov.

P. 317. „ **Conitzer** **† M. Aug.—M. Sept.

C. 826. „ **De Jonghe's** ** März.

P. C. 779. „ **Februar-** ** Frühj.

P. 321. „ **Goubault's** *† Sept.

P. 704. „ **Konning's** (Beurré de Konning) ** A.—E. Oct.

P. 428. Butterbirne, Lederbogen's * bis **† Sept.—Octbr.
C. 827. " Lenzener **† Oct.
P. 560. " Millet's; (nicht = Millot de Nancy)
P. 649. " Paridans ** Nov.
P. 673. " Robert's **† E. Oct.
C. 828. " Scheidtweiler's
P. 431. " von Montgeron * E. Sept. —Oct.
P. 91. " Weisse Sommer- (Beurré blanc d'été) **† E Sept.—Oct.
P. 790. " Worontzow's **† E. Sept. —A. Oct.
P. 230. Charles de Basiner.
S. 686. Colmar, Delahaut's * Dec.—März.
P. 254. " de Mars
P. 807. " Hardenpont's frühe *†† Sept.
P. 738. Comtesse de Chambord.
P. 198. Cumberland (? = Hochfeine Butterb.)
P. 448. Dechantsbirne, Defay's ** Oct.
P. 740. Délices de Huy.
P. 739. " Dumortier.
C. 830. Delpierre's Birne *†† M. Sept.
P. 572. Delvigne (? = Kampervenus)
P. 222. Dix (Madame Dix) ** Oct.
P. 774. Doctorbirne
P. 195. Doctor Lentier ** Sept.—Oct.
P. 37. Dorotheenbirne
P. 744. Doyenné crotté (= Graue oder Beschmutzte Dechantsb.)
P. 251. Duc Alfred de Croy
P. 694. Duverny (Beurré Duverny) Oct.
C. 796. Eierbirne, Sommer- (Beste Birne) *†† S.
C. 806. Enghien *† S.
P. 223. Emil d' Heyst (Esperen's Butterb.) **† A. Nov.
P. 248. Erzbischof von Hons ** M.—E. Aug.
P. 335. Erzherzogsbirne **† S.
P. 211. Eugéne Gèrard.
P. 168. Feigenbirne von Alençon * — ** Nov.—Dec.
P. 433. Flaschenbirne, Van Marum's * Oct
P. 72. Fleur de neige (Schneeblüthe)
C. 792. Franc Réal †† Dec.—März.
P. 838. Frankenbirne †† Sept. 2—3 Wochen.
P. 340. Gönnersche Birne †† M. Sept.
P. 681. Graziöse † Nov.—Dec.
P. 584. Hasenkopf, Rother †† W.—F.
P. 213. Helene Grégoire ** Oct.
P. 586. Henriette Bouvier ** Nov.—Jan.
P. 471. Herbstbirne, Dillen's ** Oct.
P. 165. Herzog von Orleans (? = Hofrathsbirne.)
P. 108. Houx de Fortune.
P. 174. Jägerbirne (Poire des chasseurs) ** Nov.—Dec.
P. 45. Jaminette † W.
P. 253. J. J. Gilain ** Sept.—Dec; sehr gr.
P. 643. Johann de Witte (Passe Colmar français) * Jan.—Febr.
P. 347. Jolivet.
P. 706. Junker Hans (Messire Jean) † Nov.
P. 604. " Martin (Martin Sire) † Jan. — Febr.
P. 727. Kaiser Alexander, Diel's *† H.
P. 481. König von Rom *† A. Sept.
P. 196. Kopertsche (Kopercher) * W.
P. 750. Laherand.
P. 594. Leon Leclerc de Laval *† Apr. — Juni.
C. 780. Marianne von Nancy *† Nov.
P. 832. Marotte (? = Regentin).
P. 658. Mary von Borchers.
C. 833. Melonenbirne, Hildesheimer.
C. 834. Meuris, Winter- (Nec plus Meuris) ** W.
P. 491. Millot von Nancy *† H.
P. 752. Minot Jean Marie.
P. 500. Onondaga, (Swan's Orange) *† M. — E. Oct.
P. 363. Petersbirne, Kleine *†† M.—E. Aug.
P. 134. Pfirsichbirne ** E. Aug. 14 Tage.
P. 503. Pfundbirne, Grüne †† A. Oct. 14 Tage.
P. 696. Philadelphia.
P. 505. Pius IX *—** Sept.—Oct.
P. 755. Poire frontin.
C. 781. Pomeranzenbirne, Brielsche *†† S.
P. 141. Prinzessin Marianne **† H.
C. 835. Rosenbirne, Gelbgraue *† S.
P. 772. Rosenbirne, Grosse.
P. 614. Russelet, Winter (? = Veldenzerbirne) †† W.
P. 719. " Van der Wecken **Oct.—Nov.
P. 511. Sabine d'hiver, ? Nov.—Dec.
P. 86. Sämling, Dearborn's * M.—E. Aug.
P. 512. Saint André.
C. 836. Saint Germain Püvis ** E. Sept. — A. Oct.
P. 784. Schmalzbirne, Omsewitzer.
P. 518. " Zimmetfarbige ††Oct.
P. 477. Schöne Julie **† H.
P. 520. Schulbirne †† M.—E. Sept.
C. 837. Schwarzburgerin.
P. 35. Seckels Birne **† M. od. E. Oct.
P. 618. Senator Mosselmann * Apr. — Mai.
C. 839. Septemberbirne, Grosse †† M. Sept.
P. 620. Soeur Grégoire.
P. 377. Sommerbirne, Crosse brittische *† Sept.—Oct.
C. 789. " Schönste *† S.
P. 379. " Türkische müskirte ** E. Aug.—A. Sept.
P. 795. Sommerdorn Rother **† Sept.
P. 56. Suzette von Bavay * Febr.—Apr.
P. 524. Theodor Van Mons *† Oct.—Nov.
P. 717. Thoris.
P. 762. Tygrée Janvier.
P. 626. Veteranenwildling *† März — Apr.
P. 718. Victoria.
P. 94. Virgouleuse ** oder *† W.
P. 389. Windsorbirne *†† Aug.—Sept.
P. 758. Winterbirne, Königliche (Royale d'hiver) †—* Nov.—Dec.
P. 631. " Lange grüne **† H.—W.
P. 632. " Schnackenburger †† Nov. —Apr.
P. 633. " Schönste † Dec.—März.
P. 771. Zapfenbirne, Grüne.
P. 778. Zuckerbirne, Rothbackige Sommer- *†† A. Sept.

# Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten:

**Einjährige Veredlungen (in allen Sorten)** .......... p. Stück *M.* 1,—
**Pyramiden (in den mit P. bezeichneten Sorten)** .......... " 1,50
**Spaliere ( " " " S. " " )** .......... *M.* 1,75—2,50

P. 888. **Belle de Beaufort**:
893. **Belle d' Ecully**; Sept., sehr gross bis 13 centim. hoch. Fleisch fein, sehr schmelzend, von süsser Weinsäure.
P. 850. **Bergamotte Sannier**; mgr., Fl. fein und köstlich, hält sich bis zum Mai.
P. S. 851. **Beurré amandé**; mgr., zartschalig; Fl. ausserordentlich fein, nach Mandeln schmeckend; reift im November.
P. S. 852. **Beurré Henri Courcelle**; mgr., graugrün, Fl. sehr fein, von ganz eigenthümlichem und ausgezeichnetem Geschmack.
899. **Beurré Hugé**; Frucht mittelgross, schmelzend, saftreich, allerersten Ranges.
894. **Bijou**; Sept., mittelgr., strohgelb mit rothen Backen, lang. Schmelzend, köstlich, gewürzhaft. Wunderschöne Färbung.
S. 853. **Bon Chrétien Antoine Lormier**; sehr gross, hellgelb, roth gestreift, Fl. fein und halbschmelzend; Jan.—Febr.
P. 879. **Brockworth-Park**; Nov.—Dec.; schöne und gute Birne aus England.
903. **Charles Delatin**; Nov., kegelförmig, dunkelgelbgrün, heller marmorirt und punktirt; schmelzend, saftreich, gezuckert, delikat. Allerersten Ranges!
906. **Chevalier Evrard**; Nov., grün, in völliger Reife goldgelb, rostfarbig punktirt und marmorirt; saftreich, butterhaft, von ausgezeichnetem Gewürz.
P. 873. **Comtesse Clara Frijs**; Sept., neue und vorzügliche Tafelbirne aus Dänemark; Baum sehr kräftig, dauerhaft und tragbar.
P. S. 854. **Fondante des emmurées M.** Sept.; mgr., hellgelb, schmelzend, parfümirt.
P. 877. **Graf Moltke**; Dec.—Jan.; sehr grosse edle Birne, zimmetgelb mit feinem Rost überdeckt; Baum sehr tragbar.
P. 875. **Gute Luise, Späte**; Jan.—Apr.; Fr. ziemlich gr., von guter Qualität, Baum sehr fruchtbar, verlangt warmen Boden.
P. 876. **Herzogin von Angoulême, Williams'**: Oct. gr. bis s. gr.; neue schöne u. gute Fr.
P. 874. **Himmelfahrtsbirne** (de l'Assomption); Aug. gr.; neu u. vortrefflich; Baum trägt bald u. reich.
P. 896. **Jonas d'hiver**; Winter. Aus Ost-Tenessee. Gross, braun, länglich; ausgezeichneter Qualität.
P. 907. **Köstliche von Svijan**; diese neue Birne erhielt ich vom Baumschulbesitzer Rosenthal in Wien, der sie kürzlich mit ganz besonderer Empfehlung in den Handel gab. Frucht mgr., December.
P. 881. **Liebling, Morel's**; Nov.; gr.; I. Qual., Baum sehr kräftig und fruchtbar.
P. S. 855. **Louise-bonne Sannier**; Jan.—Febr. Später als die Gute Luise von Avranches, sonst eben so schön und gut.
866. **Lucy Grieve**; Oct.; gr., citronengelb, Sonnenseite geröthet, überall rostfleckig, sehr saftreich und schmelzend.
P. 897. **Mademoiselle Solange**; mgr., guter Qualität, nach Van Houtte die früheste aller Birnen, schon E. Juni reifend.
P. 878. **Marschall Vaillant**; Jan.—März, gr. und der Diel's Butterbirne ähnlich, fein schmelzend; B. sehr kräftig und fruchtbar. Vortrefflich!
P. 902. **Monseigneur Gravez**; Nov.—Febr., mgr. oder gr., sehr schmelzend und saftig, von herrlichem Gewürz.
901. **Philipp Couvreur**; Winter, mgr., saftig, schmelzend, I. Qualität.
P. 887. **Président Drouard**; März — Mai, gr. bis sehr gr., allerbester Qualität und sehr fruchtbar; Baum starkwüchsig auf Wildling wie auf Quitte.
P. 904. **Souvenir de l' évêque**; E. Dec., gelblich, fein punktirt und marmorirt, Fleisch fest, fein, butterhaft mit reichlichem süss gewürzigem Saft. I. Qualität. Wuchs mittelstark, sehr fruchtbar.
P. S. 856. **Souvenir de Sannier père**; Oct., mgr., dunkelgelb mit rosa geflammt; herrliche u. feine Fr.
872. **Triomphe de Vienne**; Mitte August, eine der grössten bekannten Birnen von guter Qualität.

# Japanesische Sorten.

Dieselben trugen hier noch nicht, halten aber unsere Winter aus und zeichnen sich durch ihre Blattform vor allen übrigen Sorten aus. **Einjährige Veredlungen** pr. St. *M.* 1. 50.
883. **Daimyo**; 884. **Madame v. Siebold**; 885. **Mikado**; 886. **Sieboldi.**

# Kirschen.

Nachstehende Sorten sind sämmtlich in Hochstämmen abgebbar; im Uebrigen in den bezeichneten Formen. P. = Pyramiden-, S. = Spalier-, 1j. = 1jähr. Veredlung. Die Zahl hinter dem Namen bedeutet die Reifzeit in der 1sten 2ten etc. Woche der Kirschenzeit.

## Preise.

| | pr. Stück ℳ ₰ | p. 100 St. ℳ |
|---|---|---|
| **Hochstämme** veredelte Süsse und Saure, stark I. Qual. ... 1,75 bis | 2 50 | 150 |
| do. do. II. Qual. ... | 1 25 | 110 |
| do. Gewöhnliche Sauerkirschen ... | — 90 | 75 |
| **Palmetten** von Schattenmorellen und anderen mit einer Etage ... | 1 25 | 110 |
| do. do. mit 2 Etagen ... | 1 75 | 150 |
| do. do. mit 3 Etagen ... | 3 — | 250 |
| do. do. mit 4—5 Etagen ... 4 bis | 6 — | — |
| **Pyramiden** ... ℳ 0,75 bis | 2 — | 60—150 |
| **Einjährige Veredlungen** auf Weichsel (Mahaleb) ... | — 60 | 50 |

## Süsskirschen.

### Schwarze Herzkirschen.

S. 9. **Adler, Schwarzer** **† 1. m.
1j. 76. **Herzkirsche, Rettenburger****†† 3. gr.
1j. 4. „ **Büttner's schwarze****† 3. gr.
78. „ Englische schwarze Kron- 5 oder 6 kl.
6. „ **Fromm's** **†† 3. gr.
S. 1j. 1. „ **Frühe Mai-** **† 1. m.
79. „ „ **süsse Mai-** **† 3. gr.
80. „ Grosse glänzende*†2—3mgr.
3. „ **Knight's** **† 2. gr.
206. „ **Königliche** **† Anf. d. 3. gr.
7. „ **Krüger's** **†† 3 gr.
S. 81. „ **Neue Ochsen-** **† 4. gr.
S. 1j. 10. „ Ochsen- **††! 3. gr.
S. 83. „ **Paretzer.**
84. „ **South's breite** * 3 m.
8. „ **Spitzen's** **†† 3. m.
S. 85. „ Trauben- od. Bouquet- *4. kl.
P. 1j. 192. „ **Werder'sche beste** **
1j. 2. „ **Werder'sche frühe** **† 2. m.
45. **Schöne von Marienhöhe** **† Anf. Juli mgr.
75. **Tarasconkirsche** (Guigne Tarascon) **† 3. m.
5. **Tartarische, Schwarze** **†† 3. gr.

### Bunte Herzkirschen.

100. **Dankelmann's Kirsche** ** 3 kl.
101. **Downtonkirsche** **† Ende d. 3.
P. 1j. 47. **Eltonkirsche** **† 3. gr.
123. **Gouverneur Wood** **† 2. gr.
203. **Herzkirsche, Bordan's** **† 2. gr.
200. **Herzkirsche, Coës bunte** **† 2. gr.
P. 11. **Herzkirsche, Früheste bunte** ** 1. m.
S. 107. „ **Glas-** ** 4. mgr.
110. „ **Tilgener's** **†† 2. gr.
216. „ **Werdersche bunte** **† 2. m.
12. „ **Winklers weisse** **†† 2. gr.
197. **Kronprinz von Hannover** ** 2. gr.
S. 13. **Lucienkirsche** **† 3. gr.
113. **Schöne von Ohio** (Ohio Beauty) **† 2. gr.
S. 1j. 99. „ **von Orleans** (Belle d'Orléans) **† 2. m.
109. **Spanische süsse** ** 3. mgr.

### Gelbe Herzkirschen.

139. **Durchsichtige, Jahn's** *† 3 kl.
P. 138. **Herzkirsche, Gelbe** ** 3 mgr.

### Schwarze Knorpelkirschen.

199. **Germersdorfer, Grosse** **†† 5. sehr gr.
88. **Knorpelkirsche, Frühe schwarze** † 2. 3. kl.
S. 16. „ **Grosse schwarze,** **†† 5. gr.
H. 213. „ **Heintze's schwarze** ** 5. gr.
214. „ **Leschke's schwarze** **†† 5. sehr gr.
91. „ **Neapolitanische** **† 5. gr
92. „ **Purpurrothe** **†† 5. gr.
94. „ **Tabor's schwarze** **2. m.
1j. 215. „ **Schneider's späte** **†† 5. sehr gr.
1j. 121. **Schwarze von Mezel** **† 3. gr.
S. 1j. 95. „ **Winkler's schwarze** **† 4. gr.
H. 217. „ **Muckeburger, Grosse;** aus Guben, gr., spät.
S. 59. **Muskateller Thränen-** **† 4. gr.
1j. 55. **Schleihahnskirsche** **† 4. gr.
218. **Schrecken's, Kirsche** **† 2. gr.
15. **Spanische, Schwarze** **! † 5. gr.
201. **Walpurgiskirsche** **† Ende der 5. gr. auch sehr gr.
1j. 82. **Wildling von Kronberg** **†† 1. 2. mgr.
207. **Zeisbergische Kirsche****††4 sehr gr.

### Bunte Knorpelkirschen.

98. **Agathe, Schöne** (Belle Agathe de Novembre) * Sept., kl.—m.
120. **Bigarreau marbré** (? Büttner's späte rothe Knorpelkirsche.) ** 4. gr.
124. **Kirtland's Mammouth** ** M. Juli gr.
126. **Knorpelk. Büttner's späte rothe** **† Ende d. 5. gr.
19. **Knorpelkirsche Drogans weisse** ** †† 8. gr.
69. „ **Dunkelrothe** **†! 4. gr.

129. **Knorpelkirsche Hildesheimer späte** ** E. Aug.—A. Sept.
lj. 220. „ **Lieke's bunte** **† 6. 7. m.
130. „ **Meininger späte** *††! 6. gr.
135. „ **Punktirte** (Punkt. Süsskirsche mit festem Fleische) **† 5. m.
S. lj. 17. **Lauermannskirsche** (Grosse Prinzessink.) **†† 4. gr.
138. **Marmorkirsche, Gemeine** **†† 3 gr.
134. **Schöne von Rockmont** ** 3 gr.
132. **Spanische, Weisse** **† 4. gr.
58. **Speckkirsche** **† 3. m.
136. **Süsskirsche, Bunte marmorirte** (Bigarreau marbré) **†† 4. gr.

### Gelbe Knorpelkirschen.

lj. 20. **Knorpelkirsche, Doenissens gelbe** **† 5. mgr.
142. „ **Drogan's gelbe** **† 5. gr.—sehr gr.
133. „ **Meissener weisse** ** 5. m.

# Sauerkirschen.

## Süssweichseln.

P. S 144. **Folgerkirsche** **†† 3. gr.
P. S. 22. **Frühkirsche, Spanische** **†† 2. mgr.
P. 21. **Maikirsche, rothe** **† 2. gr.

## Weichseln.

P. S. 70. **Braune, Brüsseler** (Brune de Bruxelles) †† 6. od. 7. m.
P. S. 34. **Grafenkirsche, Henneberger** **† 4. m.
162. **Jerusalemskirsche** **† 5—6 gr.
P. S. lj. 74. **Kirsche von der Natt** (**Doppelte Natte**) **†! 3 m.
P. S. lj. 37. **Lothkirsche, Grosse lange** (**Schattenmorelle**) **† 5. od. 6. gr.
193. **Weichsel, Herzförmige** **† 4. mgr.
P. lj. 187. „ **Ostheimer** *†† 4. m
168. „ **Schwarze Mai-** *†† 1. kl.
P. S 33. „ **Spanische Früh-** *†† 2. kl.
P. S. 32. „ **Süsse Früh-** *†† 2. kl.
195. **Weinkirsche, Grosse** *†† 4. mgr.—gr.

## Glaskirschen und Amarellen.

P. lj. 170. **Allerheiligenkirsche**, Oct.—Nov. kl.
P. S. 26. **Amarelle, Königliche** **††! 2. m.
P. S. 29. „ **Späte** **†† 3. mgr.
174. „ **Süsse** **† 3 gr.
P. S. lj. 28. **Glaskirsche, Doppelte** **† 3 gr.
S. 156. „ **Grosse** **† 5. gr.
P. lj. 30. **Gobet, Grosser** (Kurzstielige Glask., Kurzstielige Montmorency) **†† 4. gr.
P. S. 27. **Herzogin von Angoulême** **† 3. gr
lj. 175. **Herzogin von Paluau** ** 4 mgr.
P. lj. 153. **Schöne, Chatenay's** ** 6 od. 7 gr.
S. lj. 44. „ **von Choisy** ** 2. m.
212. **Kirsche von Planchoury** **† 7. gr.
164. **Morelle, Frühe** **† 4. sehr gr.
P. S. 63. „ **Späteste doppelte.**
165. **Nonnenkirsche, Grosse** **†† 5 mgr.
196. **Schöne von Brügge** **† 3 — 4 mg

## Glaskirsch-Hybriden.

P. S. lj. 40. **Königin Hortensia** (Hybride de Laeken) ** 4. s. gr.

---

# Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Kirschen.

Hochstämme ........................................ M. 2,—
1jähr. Veredlungen ................................ M. 1,—

H.. lj. 224. **Süssweichsel von Olivet**, grosse frühe schwarze Weichsel, grösser u. früher als die „Doppelte Natte“, I. Qual.

H. 225. **Riesenkirsche, Badacsoner**; reift Mitte Juli, vortreffliche Sorte von seltener Schönheit und Grösse.

H. 227. **Riesenkirsche, Hedelfinger** **††, sehr grosse vorzügliche frühe schwarze Knorpelkirsche, die in Würtemberg Anfang und hier Mitte Juli reift. Baum starkwüchsig.

# Pflaumen.

Die Buchstaben **H. P. S. 1j.** geben an, ob die Sorte als Hochstamm, Spalier oder 1jährig abgebbar ist.

| | | per Stück ℳ | per Stück ₰ | pr. 100St. ℳ |
|---|---|---|---|---|
| Hochstämme, sehr starke | I. Qual. ℳ 1. 75 bis | 2 | 50 | 150 |
| do. starke mit Kronen | II. " | 1 | 25 | 110 |
| do. schwächere mit Kronen | III. " | 1 | — | 90 |
| Halbstämme mit Kronen in einigen Sorten | | 1 | — | 90 |
| Pyramiden | 75 ₰ bis | 4 | 50 | 65—300 |
| Spalierbäume, Palmetten mit 1—4 Etagen | ℳ 1. 25 " " | 5 | 50 | — |
| Einjährige Veredlungen | | — | 60 | 50 |

H. P. S. 1j. 257. **Anna Späth.** **†† E. Sept. Diese neue Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit.

H. 1j. 56. **Admiral Rigny** *† E. Aug. Fr. gr., grün.

1j. 157. **Aprikosenpflaume, Gelbe** ** E. Aug. mgr., gelb.

H. P. S. 1j. 34. " **Rothe** ** A.—M. Sept. mgr., rothbunt, rund.

H. 1j. 245. **Blaue von Belgien** ** E. Aug.; gr., schwarzblau, sehr angenehm schmeckend.

H. 1j. 255. **Cochet père** **† M. Aug. Fr. sehr gr., oval, goldgelb mit carmin; sehr feine u. zugleich sehr schöne Frucht.

H. S. 193. **Columbia** ** A. Sept.; gr.; braunroth, etwas härtlich, sehr edel-süss.

H. 26. **Damascene Kochs späte** ** Oct. Fr. mgr., grünlichgelb mit rothen Punkten.

H. S. 138. **Damascene, Lange violette** ** E. Aug., dunkel violett.

H. P. 241. " **Zahlbruckner's** **† E. Aug; mgr., rothblau.

1j. 93. **Dattelzwetsche, Grosse gelbe** * E. Sept.- Oct., gr.; für warme Lagen.

H. 60. **Decaisne's Pflaume** (Prune Decaisne) **† gr., gelblich, M. Sept.

H. P. S. 1j. 109. **Diamantpflaume**; *†† A. Sept.; schwarzblau, sehr reichtragend.

H. P. S. 23. **Eierpflaume, Grosse Britzer** **† M. — E. Aug.; gr. gelb, stark roth marmorirt u. punktirt, sehr reichtragend, vortrefflich.

H. P. S. 1j. 84. **Eierpflaume, Blaue** ** E. Sept., gr., blau, Geschmack vorzüglich.

H. 1j. 95. " **Gelbe** *† Sept. Fr. sehr gr., gelb.

P. P. S. 8. " **Nienburger** ** M. Sept. Fr. gr. roth.

H. P. S. 1j. 7. " **Rothe** ** E. Aug. Fr. sehr gr., roth.

H. P. S. 227. **Emperor of Japan**; (Kaiser v. Japan); *† A. Sept; mgr. blutroth, rund.

H. P. S. 244. **Fruchtbare, Frühe** (Early Prolific) **† A. Aug. mgr., rundlich, schwarzblau.

H. 238. **Frühpflaume, Edle** ** Aug. Fr. kl., braunroth mit goldfarbenen Punkten.

H. P. 2. **Frühzwetsche, Fürst's** mgr.; M. Sept., sehr süss u. gewürzt.

H. P. S. 1. " **Wangenheims**; *†† Sept. mgr., dunkelviolett.

H. 260. **Gartenzwetsche** (Prune Maraichère) **† E. Aug, mgr., rothbraun, süss gewürzhaft.

H. 1j. 163. **Goldpflaume, Esperen's** * A.—M. Sept.; gr., gelb, reichtragend.

H. P. S. 1j. 10. **Goldtropfen, Coë's** (-Coë's rothgefleckte Pfl.) ** E. Sept., gr. gelb.

H. P. S. 185. **Herrenpflaume** **† M. Aug. Fr. schwarzblau, gr.

H. P. 1j. 243. " **Gelbe** **†! E. Aug., delikat.

H. P. H. 1j. 20. **Jefferson** ** Fr. gelb mit braunroth, roth gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süss. Baum reichtragend.

P. S. 6. **Jerusalemspflaume, Violette** *† M. Sept. Fr. zwetschenförmig; Baum reichtragend.

H. 119 **Isabella** ** E. Aug.—Sept., gr., rothblau, gut.

H. 16. **Jungfernpflaume, Weisse** ** A. Sept. Fr. m., gelb.

H. 1j. 88. **Kaiserin, Violette** ** M.—E. Sept., gr., sehr saftreich, süss, dunkelviolettroth.

H. P. S. 1j. 41. **Katharinenpflaume, Blaue** **† E. Sept. Fr. gr, blau.

H. 295. " **Gelbe** **† E. Sept. mgr. Wird um Paris vielfach zur Bereitung der Prünellen angebaut.

H. P. S. 1j. 123. **Königin Victoria** (Queen Victoria) **† E. Aug. Fr. sehr gr., roth.

H. S. 197. **Königspflaume** (Royale) ** E. Aug.; mgr., blauroth, sehr angenehm schmeckend.

H. 198. **Königspflaume, Buchner's** **† E. Aug., mgr., dunkelbraun.

H. P. S. 1j. 254. " **Koch's** *† gr. E. Aug., blauroth.

H. P. S. 202. " **Mayer's** ** E. Aug.; mgr., roth, sehr gute Tafelfrucht.

H. P. (256) 296 **Mirabelle, Gelbe** *†† E. Aug., kl.; besonders zum Trocknen beliebt.

H. P. 1j. 240. " **Herrenhäuser, doppelte** **† M. Aug., mgr. goldgelb.

H. 1j. 15. " **Rangheri's** **†† M. Aug. Fr. mgr., hellgelb, roth angelaufen od. punctirt; höchst schätzbar.

H. 1j. 177. **Perdrigon, Bunter** ** E. Aug., gr. violettroth.

H. 191. " **Normännischer.** ** M. Sept.; gr. schwarzblau, aromatisch süss.

H. S. 44. **Pflaume, Cooper's grosse** (Coopers large red) ** M. Sept. Fr. gr., blau.

H. P. S. 14. " **Kirke's** (Kirke's plum) ** A. Sept. Fr. gr. dunkelviolett.

H. 1j. 282. **Reineclaude, Althann's** **† A. Sept. mgr. braunroth, heller marmorirt.

H P. S. 1j. 64. " **Bavay's** ** M. Sept.; gr., grün mit etwas Röthe.

H. P. S. 1j. 233. " **Boddaert** **!†† E. Aug. Fr. sehr gr., gelb, zuckersüss und äusserst saftig.



**Anna Späth.**

H. 248. **Reineclaude**, Bollweiler **† M. Aug.; gr. grün, oft gestreift.
H. P. S. 1j. 59. „ Durchscheinende (Reineclaude Diaphane) **† Mitte Sept. Fr. gr.
H. P. S. 1j. 63. „ **Grosse** **† A. Sept. Fr. gr., grün.
H. 1j. 219. „ Lawrence's **† M. Aug.; gr., gelbgrün.
S. 18. „ Meroldt's **†† M. Sept.; gr. gelb.
H. 154. „ Prince's rothe (Prince's red gage) **† Aug.; rothbr.
H. P. 1j. 247. „ von Jodoigne ** M. Sept. gr., hellrothbraun.
H. 1j. 235. Schöne von Löwen **† E. Aug. gr., violett, angenehm süss.
H. 218. Superbe, Denniston's; neuere amerikanische Fr.
H. P. 236. Thomaspflaume **† E. Aug.; gr., bräunlich gelb. punktirt, saftvoll.
H. P. S. 1j. 24 **Washington** ** A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.
P. S. 103. Waterloozwetsche ** M. Sept.; mgr. gelb, gut; Stein fast lose.
H. P. S. 1j. 12. **Zuckerzwetsche, Grosse** (Jacobi-Zw.) ** E. Aug. Fr. gr., blau.
H. 114. Zwetsche Bazalicza's ** E. Aug.; mgr., schwarzblau, früh und reich tragend.
H. P. S. 4. Zwetsche, Grosse englische **†† M. Sept. Fr. gr., blau.
H. P. S. 5. **Zwetsche, grosse blaue Haus-** (Bauerpflaume) **†† Sept.
H. 9. „ **v. Hartwiss' gelbe** **† A. Sept. mgr.—gr., gut.
H. P. S. 1j. 3. „ **Italienische** **†† E. Sept. Fr. gr., blau.
H. 13. „ **Reizensteiner gelbe** ** Mitte September.

## Neue oder dem Sortimente neu hinzugefügte Sorten.

Hochstämme in den mit H. bezeichneten Sorten ........ p. St. ℳ 2,—
Pyramiden „ „ „ P. „ „ ........ „ „ „ 1,50
1jährige Veredlungen ........ „ „ „ 1,—

P. 1j. 279. **Aprikosenzwetsche, Rothe**; schöne u. gute lösige Frucht m. aprikosenähnlichem Fleisch.
1j. 285. **Dumiron**; ausgezeichnete Frucht für Muss, bedarf keines Zuckers beim Kochen.
P. 1j. 278. **Frühzwetsche, Reutlinger**; **† M. Aug., gr., sehr tragbar und gut.
1j. 287. **Hasard**; Sept.; länglich, violett, saftig; Stein lose, besser als die Violette Reineclaude.
H. P. 1j. 288. **Hyacinthpflaume, Berliner.**
P. 1j. 283. **Mac Laughlin**; A. Sept, sehr gross, rund, grünlich-gelb. Neue amerikanische Sorte.
P. 1j. 284. **Nectarine, Rothe**; ** A. Aug., rothbraun; nur für Formbäume. Haut abzuziehen.
H. P. 1j. 286. **Pfirsichpflaume** (Pêche); bemerkenswerth wegen Grösse und Fruchtbarkeit.
P. 1j. 281. **Pfirsichzwetsche Frankfurter**; **† M. Sept., gr., schwarzblau.
H. 1j. 290. **Pflaume, Douane's dunkelrothe**; gross, sehr tragbar und starkwüchsig. Ausgezeichnet; Von einem Pflaumenliebhaber als eine seiner besten Pflaumen bezeichnet.
H. 1j. 277. **Schüttelpflaume, Lindow's**; eine der frühesten Pflaumen, löst gut vom Stein und trägt sehr dankbar. Wird in Werder bei Potsdam viel angebaut.
P. 1j. 276. **Stengelpflaume, Werdersche**; eine frühe Mitte August reifende, wohlschmeckende und saftige rothe Zwetsche. In Werder viel angebaut.
1j. 262. **Washington, Rothe**; Anf. Sept., gross, dunkelbraunrothe sehr tragbare Zwetsche. Geschmack vorzüglich, Stein lose.
H. 1j. 289. **Zuckerzwetsche, Ungarische**; Vorzügliche Zwetsche, die ich unter diesem Namen mit grosser Empfehlung erhielt.
P. 1j. 500. **Prunus Simoni**; Sept. Eine ganz neue Gattung von Pflaumen aus China mit glänzendem Laub. Sie trug hier mehrere grosse blutrothe Früchte, an Form den Reineclauden ähnlich. Zierpflaume!

## Pfirsiche.

**Einjährige Veredlungen** ........ 1 St. ℳ 1,50, 100 St. ℳ 125
**Spaliere** in Fächer- und Palmettenform 1jährige ........ „ „ „ 3,— „ „ „ 250
do. stärkere (nur in einigen Sorten) ........ 1 St. ℳ 4—8,—
**Hochstämme** (in wenigen Sorten) ........ „ „ „ 4,—

86. **Andenken an Java** ** E. Aug.—A. Sept; mgr.
60. **Aprikosenpfirsich, Prachtvolle** (Admirable jaune) ** E. Sept.—A. Oct.; gr., gelb.
102. **Beatrix, Frühe** (Précoce Béatrice), mgr. August; reift hier M. September an völlig frei stehenden Pyramiden; von robustem Wuchs und winterhart. Sehr werthvoll!
52. **Bourdine** ** E. Sept.—A. Oct.; mgr., sehr fruchtbar.
104. **Doppelte Orange.**
105. **Doppelte Zwollsche.**
46. **Galand** (Belle Garde, Galande) ** A. u. M. Sept.; gr., Sonnenseite dklpurpur, sehr saftig u. gut, I.
57. **König Georg** (Royal George) ** E. Aug.—Anf. Sept.
73. **Lord Palmerston** E. Sept.; sehr gross, sehr fruchtbar.

7. **Magdalene Rothe** (Madeleine rouge) **! Aug. Fr. gr., sehr schätzbar.
19. " **Weisse** ** M. u. E. Aug.; mgr., Sonnenseite dklcarminroth, verlangt eine warme Wand.
17. **Mignonne la grosse** ** E. Aug. Fr. gr., sehr werthvoll, reichtragend.
5. **Montagne, Doppelte** ** M.—E. Sept., gr.
81. **Muy de Swantzel.**
35. **Nectarine, Frühe violette** (Brugnon violette hâtive) ** E. Aug.
55. **Prince of Wales**, Mitte Sept.
14. **Purpurpfirsich, Frühe** (Pourpré hâtive) ** E. Aug.—Anf. Sept., gr.
26. **Schöne von Bausse** (Belle Bausse) **! M. Sept., gr.
84. " " **Croux.**
85. " " **Vitry**; M. Sept., gr., sehr gut, fruchtbar.
9. **Venusbrust** ** gr. Anfang—Mitte Sept.
30. **Vineusse de Fromentin** **! M. Sept. Fr. gr., sehr tragbar.
34. **Willermoz** ** A.—M. Sept., sehr gr., sehr saftreich und gezuckert.

## Neuere Sorten.

**Einjährige Veredlung** à St. 2 *M.*; **Spaliere** *M.* 3½ bis 4,—

113. **Amsden** oder **Junipfirsisch**; aus dem Staate Missouri N. Amerika. Empfohlen als die allerfrüheste, die grösste und beste unter den frühen; reift etwa 8 Tage vor „Précoce Béatrice" in Missouri E. Juni—A. Juli.

114. **Frühe Alexander**, ebenfalls aus N.-Amerika, soll an früher Reifzeit u. Güte mit Amsden wetteifern.

101. **Précoce de Halle** (Frühe Marktfrucht); mgr., rosa, sehr gut. Eine der allerfrühesten, u. fest haftend am Stiel, daher besonders geeignet für Hochstämme. Alle diese Frühpfirsische sind besonders vortheilhaft beim Marktverkauf.

506. **Purpurblättrige**; mgr., A. Oct. reifend. Die Blätter sind dunkelpurpur wie bei der Blutbuche. Die Frucht ist roth mit rothem Fleische, von guter Qualität.

## Aprikosen.

| | p. St. |
|---|---|
| Hochstämme (nur in einigen Sorten) | 3—4 *M.* |
| Spalierbäume, schön gezogen, (nur in einigen Sorten) | 3—8 *M.* |
| 1- oder 2jährige Veredlungen, zu jeder Form passend | *M.* 1,50 |

32. **Alberge à gros fruit**; **† Aug., gr., grünlich gelb, roth punktirt.
52. **Alberge de Montgamet.**
7. **Ambrosia**, Juli, sehr gross, prachtvoll.
20. **Angoumois** ** Juli; mgr. und gut.
34. **A trochets**, mgr. I. Aug.
14. **Breda** **) Juli; mgr., fein, gut zum Einmachen.
58. **Canino grosso.**
50. **Elsässer.**
59. **Gloire de Pourtalès.**
10. **Grosse Frühe** (Gros précoce); gr. I, A.—M. Juli.
53. **Grosse rothe Frühe.**
60. **Jamucet.**
41. **La Reine.**
38. **Lübecks Aprikose.**
37. **Moorpark, Frühe.**
(40) 29. **Orange, doppelte.**
49. **Orange, Frühe**; Sehr gut zum Einmachen.
11. **Pfirsichaprikose** von Nancy **! Juli, gr.
51. " **Frühe von Oullins**; 8 Tage früher als obige, ausgezeichnet.
61. **Red muscadine**; frühe.
12. **Späteste Deegen** **! Octbr., mgr., fein.
30. **Türkische Rothgetupfte** Mitte Aug., im Süden sehr beliebt.
13. **Ungarische Beste** **! E. Juni s. gr. s. süss.
63. **Viard.**

## Mandeln (Amygdalus communis).

| | p. Stück |
|---|---|
| 1. Gemeine bittere | *M.* — 75. |
| 2. Krach-Mandel (fragilis) | " 1 50. |
| 4. " " Zartschalige (à coque tendre) | " 1 50. |
| 5. Süsse | " 1 50. |

## Wallnüsse (Juglans regia).

| | pr. St. *M.* | *Pf.* |
|---|---|---|
| 10. Gewöhnliche, Hochstämme | 2 bis 6 | — |
| 9. Fertilis (praeparturiens), frühtragende Zwergwallnuss | *M.* 1. 50. " 2 | 50 |

## Haselnüsse (Corylus Avellana).

Lamberts- und Zellernüsse im Rummel .......... p. 100 St. 50 ℳ à Stück 60 ₰
1 Sortiment von 10 Sorten .......... 6 ℳ
1 „ „ 20 „ .......... 12 „
Gewöhnliche Wald- .......... p. 100 St. 35 ℳ à St. 50 ₰

## Mispeln (Mespilus germanica).

2. **Grossfrüchtige**, sehr gut.
1. Kernlose (abortiva, sans pepins).
5. Königliche (Royal)
4. Nottingham.
6. Riesen-Misp. (gigantea)

à Stück ℳ — 75 ₰; 10 „ „ 6 — „

## Quitten (Pirus Cydonia).

3. **Constantinopeler.**
7. Metzer (aus Metz) Apfel-Quitte.
2. Muskat-Quitte.
4. **Portugiesische** Birn-Quitte
5. Von Angers ..........

à St. ℳ —, 75 ₰; 10 „ „ 6,— „

## Hagebutten (Rosa villosa, R. pomifera).

Grossfrüchtige .......... à Stück 60 ₰, 10 St. 5 ℳ

# Weinreben.

### *Attest.*

*Im Auftrage des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg, Herrn Dr. Achenbach, Excellenz, habe ich im August d. J. die Rebschulen des Herrn L. Späth, Baumschulbesitzer in Britz bei Berlin, gründlich und eingehend nach der Reblaus, Phylloxera vastatrix, untersucht und bescheinige hierdurch, dass dieselben vollständig frei von der Reblaus sind.*

*Potsdam, am 1. September 1880.* (*gez.*) **W. Lauche,**
*Königl. Garten-Inspector.*

**Tafeltrauben,** 3—5jährige Pflanzen.
**Nach meiner Wahl: 50 Sorten à 1 St. 35 ℳ; 25 Sorten à 1 St. 17 ℳ; 10 Sorten à 1 St. 7 ℳ; 100 St. im Rummel 40 ℳ**

| | pr. St. ℳ ₰ | 10 St. ℳ |
|---|---|---|
| (335.) 285. **Augustwein, Blauer** (Jacobstraube Früh-Clävner, Früher Burgunder); blau, sehr süss, kleinbeerig; M. August .......... | 1 — | — |
| 133. **Bidwill's seedling,** Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, I. Ranges lässt sich gut treiben. Octbr. .......... | 1 — | 8 |
| 141. **Blanc d'ambre,** Trb. von mittlerer Grösse, etwas zusammengedrückt; Beeren mittelmässig, oval, weiss mit braun, sehr saftig, von ausgezeichneter Qualität; 2. Hälfte d. Sept. Rebe stark und fruchtbar .......... | 1 — | 8 |
| 56. **Buckland's sweet water**; grosse weisse Traube, schön .......... | 1 — | — |
| 179. **Carniola di Roma,** Traube mgr. rosa, dicht, früh .......... | — 75 | 6 |
| 4. **Champagner, Früher blauer** .......... | — — | — |
| 134. **Champion,** Traube gr.; Beeren blauroth, sehr gross, vorzüglich. Ende Sept. neu .......... | 1 25 | 11 |
| 130. **Chasselas conrable de Hongrie** .......... | — 75 | 6 |
| 88. do. **de Jérusalem** .......... | — 75 | 6 |
| 68. do. **de Negrepont,** Traube gross, Beeren schön rosa, sehr wohlschmeckend; empfehlenswerth. Septbr. **neu** .......... | 1 — | — |
| 83. do. **Duhamel**; früh weiss, grosstraubig .......... | — 75 | — |
| 92. do. **gros blanc.** Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., I. Ranges. E. Aug. | 1 — | — |
| 245. do. grosse grappe; grosstraubig .......... | — 75 | — |
| 89. do. **musqué de Nantes,** Traube gr., locker, Beeren weisslichgrün, gross, sehr fruchtbar, I. Ranges. Septbr. .......... | — 75 | 6 |

| | pr. St. M. | ₰ | 10 St. M. |
|---|---|---|---|
| 87. **Chasselas Napoléon**, Trb. schön u. gross; Beeren sehr gross, weiss, sehr zuckerhaltig, Rebe sehr stark; mfrüh | — | 75 | 6 |
| 85. do. **Vibert**; delikat, weissgelb, lockere Traube, E. Aug. | — | 75 | — |
| 94. **Decandole** (Rother Trollinger Calebstraube) Trb. u. Beeren gross, roth, sehr fruchtbar, Oct., oft sehr gross | 1 | — | — |
| 5. **Diamant** (Diamant-Gutedel, Perltraube) Trb. sehr gr., locker. Beeren gelb, gr. eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. September | 1 | — | 8 |
| 33. **Elbling**, Trb. gr., Beeren weisslich grün; sehr fruchtbar. Ende Sept. | — | 5 | 6 |
| 191. » Rother; | — | 5 | — |
| 196. **Frankenthaler** (Schwarzer Trollinger Black Hamburgh), Trb. sehr gr., Beeren dunkelviolett, vorzüglich. Ende September | 1 | 2 | — |
| 132. **Frankenthaler de Costes**; Traube sehr schön, schwarz, früher als der gewöhnliche Frankenthaler | 1 | 50 | — |
| 75. **Golden Hambro**, Trb. gr., Beeren gr., ambragelb, spätreifend, allseitig als eine der vorzüglichsten Sorten anerkannt | 1 | 25 | — |
| 244. **Griechischer, Gelber** | — | 75 | — |
| 247. **Grosser Weisser** | — | 75 | — |
| 111. **Gros Guillaume**, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., sehr fruchtbar I. Ranges. Oct. | 1 | 25 | — |
| 119. **Grüner von Madeira**; mgr., locker, sehr saftreich, graugrün, August | 1 | — | — |
| 1. **Gutedel, Gewöhnlicher rother**, Trb. ziemlich lang, hellroth, mittelfrüh | — | 75 | - |
| 178. do. **Krach-**, ein sehr süsser weisser Gutedel, Sept. | — | 75 | - |
| 44. do. **Pariser** (Chasselas de Fontainebleau) früh, weiss, A. — M. Sept.; s. fruchtbar, sehr beliebt | — | 75 | 6 |
| 2. do. **Weisser**, Trb. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig u. sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept. p. 100 St. 50 M. | — | 75 | 6 |
| 73. do. **Weissgelber Gold-** | — | 75 | — |
| 127. **Impériale noire**; Trb. gross; Beeren sehr gross, fast rund, schwarz; Rebe stark u. fruchtbar 2. Hälfte Septbr.; eine der besten Tafeltrauben | — | 75 | — |
| 36. **Italian blanc** | — | 75 | — |
| 123. **Kadarkas, Grüner** | — | 75 | 6 |
| 115. **Kientzheimer Früher weisser** (Joanneno charun, Gelbe Seidentraube; gr. weisse etwas gedrungene Traube. A. Sept. | — | 75 | — |
| 116. » Grossbeeriger (Joanneno à gros grain) | 1 | — | — |
| 117. **Kowes** (Sang de Pierre) | — | 75 | 6 |
| 107. **Lampar Fardevany**, Trb. sehr gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtb. I. Rang. E. Sept. | 1 | — | 8 |
| 11. **Leipziger, Früher** (Früher weisser Malvasier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, s. süss u. gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten Aug. | — | 75 | 6 |
| 28. **Lenne's Ehre**; Tr. s. gr., locker, Beeren gelblich, gewürzt, feinschalig, October | — | 75 | — |
| 157. **Madeleine angevine**; Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss, sehr früh. Rebe kräftig u. fruchtbar | 1 | — | — |
| 128. do. **précoce de Hongrie**, Trb. mgr., gedrängt, Beeren schwarz, klein; sehr fruchtbar. September | — | 75 | 6 |
| 10. **Malinger, Früher** (Chass. précoce de Malingre); Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. August | 1 | — | 8 |
| 32. **Malvasier, Blauer**; Trb. gr. gedrängt, Beeren schwarzblau. gr., gewürzt; die beste und früheste der grossbeerigen blauen Sorten; auch sehr gut zum Treiben. Sept. | — | 75 | 6 |
| 16. do. **Fuhrmann's blauer**; Sept. | 1 | | — |
| 37. **Malvoisie Martina**; | — | 75 | 6 |
| 95. **Mataro**, Beeren weiss; Anfang October | — | 75 | 6 |
| 41. **Melier, Grauer**; schöne, auch in unserem Klima noch im Freien reifende Sorte | — | 75 | 6 |
| 97. **Milton**, Trb. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem parfümirtem Geschmack; fruchtbar. Septbr. neu | 1 | — | — |
| 120. **Minestra**; Trb. und Beeren mgr., locker, schwarz, mfrüh | — | 75 | 6 |
| 102. **Muscat blanc de Jésus**; Trb. mgr., locker, Beeren gelb, gr.; fruchtbar. Anf. Sept. | 1 | — | 8 |
| 100. do. **de la mi-août**, sehr früh, schwarz | 1 | — | — |
| 99. do. **de Sarbelle**; gr., runde schwarze Beeren, mittelfrüh | 1 | — | — |
| 84. **Muskateller, Alexandriner**; Traube gross, Beeren gelb, vorzüglich, Oct. | — | 75 | 6 |
| 137. do. **Ingram's hardy prolific.**; grosse ovale schwarze Beeren; E. Sept. | 1 | — | — |
| 112. do. **von Genua** (Muscatellier de Gênes); | 1 | — | — |
| 55. **Nogaret**; mittelfrüh, schwarz, gr. runde Beeren | — | 75 | — |
| 126. **Perle grosse noire**; gross, schwarz | — | 75 | — |
| 113. **Précoce de Hongrie**; früh aus Ungern | — | 75 | 6 |
| 104. **Rouge du Cantal**; | — | 75 | — |
| 186. **Schönfeiler, Rother**; | — | 75 | — |

| | pr. St. M. | pr. St. ₰ | 10 St. M. |
|---|---|---|---|
| 61. **Solferino**; mgr., weiss mit röthlichem Hauche, reichtragend, Sept., sehr gut | 1 | — | — |
| 170. **Sylvaner, Rother**; Trb. mgr., sehr dicht, süss, Sept. | — | 75 | — |
| 110. **Szilva szolo.**, gute ungarische Tafeltraube | — | 75 | — |
| 108. **Tokos**; aus Ungarn | — | 75 | — |
| 195. **Traminer**; hellroth, vorzügliche Tafeltraube | — | 75 | — |
| 228. „ **Weisser**; vorzügliche Tafeltraube | — | 75 | — |
| 65. **Trentham Black**, Trb. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig u. süss, von eigenthümlichem Geschmacke; r chtragend. Oct. | 1 | — | 8 |
| 105. **Ulliade noire précoce**; schwarz, mittelfrüh | 1 | — | — |
| 27. **Vanillentraube**; eine der edelsten grossbeerigen Tafeltrauben mit vanilleartigem Muskatgeschmack. A. Oct. | 1 | — | — |
| 119. **Vert de Madère** (Grüner von Madeira); | — | 75 | 6 |

# Griechische und Kaukasische Weinsorten.

à Stück 1 M.; 10 Sorten à 1 St. 9 M.; 10 St. im Rummel 6 M.

Diese Trauben zeichnen sich durch ihre enorme Grösse aus u. werden gewöhnlich ½—2 Kilogr. schwer, dürften jedoch bei uns im Freien nur selten reifen.

234. **Buddischuri**, weisse Keltertraube.
235. **Kischuri**, rothe Keltertraube.
269. **Kadin-Parmak** (Frauenfinger).
315. **Kischmisch, Persischer**; langbeerig, ziemlich dichte Trb., blau; E. Oct.
314. „ **Weisser**
256. **Nichate**; weiss, Traube lang, bis 2 Kilo schwer.
274. **Pechleri.**
265. **Rhoditi** (von d. Insel Rhodus), roth, süss reichtragend, dünnschalig.
273. **Santorino.**
267. **Sarante-Eklisia.** (40 Kirchen) aus Naxos, mgr., dicht, von schöner Farbe und Form, angenehm säuerlich.
266. **Thibéa** (von Theben), blassroth, Beeren länglich, Traube fest, mit schwachem Muskatgeschmack.
268. **Trappa.**

# Amerikanische Sorten.

10 Sorten à 1 Stück ........ 7 M.

Da dieselben härter sind als unsere einheimischen Sorten, so eignen sie sich ganz vortrefflich für Laubengänge und halten, einiger Massen im Schutz stehend, unsere Winter ohne Bedeckung aus.

Einige von ihnen werden in Amerika auch als Tafelweine geschätzt u. zeichnen sich meist durch einen starken Muskatgeschmack aus, z. B. Nr. 74, 122, 138, 183, 197, 199, 282, 284, 287. Die hier nicht aufgeführten siehe bei den Ziergehölzen unter Vitis.

| | p. St. M. | p. St. ₰ | 10 St. M. |
|---|---|---|---|
| 138. **Alexandra**, blau | — | 75 | 6 |
| 284. **Canby's August**, schwarz | — | 75 | 6 |
| 122. **Clinton**, dklviol. 100 St. 50 M. | — | 75 | 6 |
| 510. **Concord**, schwarz | 1 | — | — |
| 511. **Creveling**, schwarz, früh | 1 | — | 8 |
| 512. **Diana**, hellroth, früh | 1 | — | 8 |
| 181. **Elisabetha** | — | 75 | — |
| 50. **Isabella**, schwarzblau | — | 75 | — |
| 74. **Municipal red**, roth | — | 75 | 6 |
| 183. **Narzissa** | 1 | — | — |
| 287. **Northern Muscadine**, hochroth | — | 75 | 6 |
| 282. **Rebecca**, weiss | — | 75 | 6 |
| 199. **Roger's Hybride Nr. 2**, dklrth. | — | 75 | 6 |
| 197. „ „ Nr. 12 | — | 75 | — |
| 275. **rotundifolia** (Muscadine) | — | 75 | — |
| 513. **To Kalon**, schwarz | 1 | — | 8 |

# Stachelbeeren.

| | | p. St. M. ₰ | 100 St. M. |
|---|---|---|---|
| **Beste grossfrüchtige englische** in ca. 100 Sorten, starke einjährige resp. zweijährige Pflanzen mit Namen | | — 40 | 35 |
| de gl. | ohne Namen | — 35 | 30 |
| desgl. | ca. 1 Meter hohe, veredelte Stämme ......... 1,25 bis | 1 50 | — |
| desgl. | deutsche Sorten | — 35 | 30 |
| desgl. | amerikanische; Früchte klein, roth, blau beduftet, ausserordentlich reichtragend, vorzüglich zum Einmachen und zur Bereitung von Stachelbeerwein, da sie eine grössere Menge von Saft liefern, als die europäischen | — 35 | 30 |

# Johannisbeeren.

**Kräftige Pflanzen.**

| | p. 10 St. M. ₰ | 100 St. M. |
|---|---|---|
| Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten | 2 50 | 20 |
| Weisse und rothe oder schwarze im Rummel | 2 — | 15 |
| Hochstämmige, in einigen Sorten ............ p. St. 1—1½ M. | — — | — |

## Rothe.
à St. ₰

7. **Buddeus' Hellrothe**; gr. spät ........ 40
34. **Chenonceau**; spät, s. langtraub. s. gr. .... 30
58. **Eyatt's nova**; kl., dklroth m. geschlitzten Blättern .......... 40
22. **Frauendorfer grosse**, gr., zieml. voll ..... 30
53. **Fruchtbare** (La Fertile); gross voll I .. 50
63. **Fruchtbare von Angers** (Fertile d'Angers) gross I ......... 50
15. **Gondouin**, mgr., gut .......... 30
13. **Kaukasische** (Du Caucase. Roëm von Haarlem). gr. ........ 30
21. **Kirsch-Johannisbeere**, **Rothe** sehr gr. I .......... 30
5. **Langtraubige** (Red currant), gr. I ..... 30
38. **Red grape grosse**; mgr., s. voll ........ 40
17. **Ringens**; zieml. gr., langtraubig, mfrüh I . 40
44. **Rothe Englische**; mgr., früh ......... 40
10. " **Holländische**, gr. I ......... 30
48. " **Grosse** gr. I., sehr fruchtbar ..... 30
37. " **Kaiserliche** (impériale rouge) sehr langtraubig ......... 30
23. " **Knight's grosse** (Knights large red) gr., zml. voll, gut ......... 30
61. **Ruby Castle**; mgr., zieml. voll süss ...... 50
54. **Schöne von St. Giles**; gr. u. mgr., voll... 50
2. **Süsse rothe**; mgr. ......... 30
11. **Versailler** (Versaillaise); gr., I, mild ...... 30

## Rosafarbige.

16. **Champagner**, Grosse fleischfarb., gr. ..... 30
45. **Gewöhnliche** Rosafarbige; gr. ......... 30
59. **Gloire de Sablons**, mit weiss und roth gestreiften Früchten, klein ......... 30

à St. ₰

12. **Holländische rosenrothe**; gr., voll, gut I. 40
14. **Perl-Johannisbeere, Gestreifte** (Grosse perle rayonnée) mgr., voll ......... 30

## Weisse.

32. **Champagner, Weisse**; mgr. ......... 50
51. **Durchsichtige**; mgr., zieml. voll ......... 30
62. **Englische weisse**; mgr. süss ......... 30
50. **Esperen's Weisse**; gr. u. mgr., voll, gut. 50
33. **Grosse Weisse**, gr. I ......... 30
20. **Holländische weisse**, sehr gr. u. süss I. 30
1. **Kaiserliche weisse**; s. gr., gelblich I! ... 50
60. **Perle blanche**; mgr. süss, gut ......... 50
68. **Weisse Kirsch-**. gr., voll ......... 50
41. **Weisse von Verrières**, mgr., zml. voll ... 30

## Schwarze. (Ahlbeeren, Cassis.)

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind besonders zur Bereitung von Johannisbeersaft und Johannisbeerwein zu empfehlen. Sie werden aber auch als Tafelfrucht vielfach den rothen und weissen vorgezogen.

9. **Ambrafarbige**, gr., gut ......... 30
49. **Bang up**, sehr gross, I. grösste neue engl. Sorte, süss ......... 50
28. **Gewöhnliche schwarze** ......... 30
56. **Kentish hero**; gr. ......... 30
64. **Lee's Black Currant**, neu! ......... 50
6. **Neapolitanische, Schwarze** (Black-Naples) gr. I ......... 30
29. **Ogden's grosse** I. ......... 30
8. **Merveille de la Gironde**, gr. I ......... 30
3. **Victoria**, Schwarzfrüchtige, gr. I ......... 30

# Himbeeren.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten p. 100 St. 10 *M.*, p. 10 St. 1,50 *M.*
do. do. do. remontirende.......... p. 100 „ 15 „ „ 10 „ 2,— „

| | à St. ₰ |
|---|---|
| 1. **Antwerpener Gelbe**, mgr. | 25 |
| 8. **Barnet**, gr. roth | 25 |
| 23. Battler's Riesen; roth | 25 |
| 14. Bienenstock (beehive); gr., roth, voll | 25 |
| 56. **Billard's Immertragende** (Perpètuel de Billard) remont. roth, **neu!** | 50 |
| 28. **Brinkle's Orange**; orangegelb | 30 |
| 7. **Chili-, rothe,** (Riesen-H.); gr. voll | 25 |
| 12. Englische grosse rothe | 25 |
| 4. **Fastolff**, roth | 25 |
| 19. „ **Neue remontirend**, roth | 30 |
| 51. **Fine white**; gelb, Neu! | 50 |
| 10. **Grosse Gelbe** sehr gut! | 50 |
| 20. **Herrenhäuser frühe rothe**; | 25 |
| 32. „ immertragende rothe; remont. | 25 |
| 47. Hornet, roth | 25 |
| 44. Knevett's Riesen-, roth | 25 |
| 49. **Malta**, remont. gelb | 30 |
| 18. Merveille, Neue gelbe, remontirend | 25 |
| 22. Nonpareil; roth | 25 |
| 45. Paragon; roth | 25 |
| 21. Prinz von Wales; roth | 25 |
| 55. Queen Victoria; rth. Neu! | 50 |
| 6. **Schöne von Fontenay** remontirend | 25 |
| 46 Schwarze Herbst- (Autumn black) ohne Ausläufer | 75 |
| 57. Stachelarme gelbe (Sans èpine á fruit jaune) grossfrüchtig, gelb. **Neu!** | 25 / 50 |
| 16. **Sucrèe de Metz**, gr. gelb remont. | 30 |
| 17. Surprise d'automne, gelb, romontirend | 25 |
| 30. Vicepräsident French; roth | 25 |
| 5. **Vorsters Grosse**, rth. | 25 |

# Brombeeren.

Die Früchte sind zur Bereitung von Fruchtsaft ganz vorzuglich geeignet. Die rankenden und die aufrechten haben meist schwarze, die himbeerartigen rothe Früchte. Die rankenden Sorten zieht man am Besten am Spalier. Das 2jährige Holz, nachdem es Früchte getragen hat, muss entfernt werden.

| | pr. St. ₰ | 10 St. *M.* |
|---|---|---|
| 17. Amerikanische Gelbe; aufrecht | 50 | 4 |
| 18. Americanus caesarius; aufrecht | 50 | 4 |
| 3. **Arenarius**; rankend | 40 | 2½ |
| 2. **Armenische**; rankend | 40 | 3 |
| 40. Arnold's Hybride; himbeerart. | 30 | 2 |
| 33. Clarke; himbeerartig | 30 | 2 |
| 23. **Dorchester**; caessius; aufrecht | 40 | 3 |
| 42. Franconia; himbeerart. | 30 | 2 |
| 1. Hybridus fructu maximo; rankend | 40 | 3 |
| 21. **Jaspisartige**; aufrecht | 50 | 4 |
| 44. **Kittatiny**; aufrecht | 50 | 4½ |
| 7. **Lawton** (New Rochelle); aufrecht | 50 | 4 |
| 43. Miners Trailing; rankend | 50 | — |
| 26. Newman's Thornless; aufrecht | 50 | — |
| 9. Tiliaefolius; rankend | 40 | — |
| 28. Walker; himbeerartig | 30 | 2 |

# Erdbeeren.

(Beste Pflanzzeit: August und September)

**Preise der Sorten nach meiner Wahl.**

| | *M.* | ₰ |
|---|---|---|
| 100 Stück der besten neuen in 4 Sorten | 12 | — |
| 100 „ „ „ in 10 „ | 18 | — |
| 100 „ „ „ in 25 „ | 25 | — |
| 100 „ „ älteren in 2 „ | 2 | — |
| 100 Stück der besten älteren in 4 Sorten. | 3 | — |
| 100 „ „ „ in 10 „ | 4 | — |
| 100 „ „ „ in 25 „ | 10 | — |
| 1000 „ „ „ in 10 „ | 15 | — |

## A. Monatserdbeeren.

| | p. St. ₰ | 10 Stück ℳ ₰ | 100 St. ℳ |
|---|---|---|---|
| 184. **Alexander** (Busse), grösste weisse, neu! | 50 | 3 — | — |
| 144. Blanche d'Orleans, weiss, sehr fein | 25 | 2 — | — |
| 145. **Brune de Gilbert**, schwarzbraun, sehr aromatisch | 20 | 1 50 | — |
| 158. Double perpétuelle, gr., roth | 25 | 2 — | — |
| 179. **Gloire de St. Genis**, roth, sehr starkwüchsig und dankbar | 15 | — 50 | 3 |
| 206. Gloire d'Orléans; **neu!** gr., lebhaft roth, längl. oval, Fr. fest, gewürzt, auf starken Stielen | 50 | — — | — |
| 146. Janus, gr., roth oft fast doppelt | 30 | 2 50 | — |
| 185. Rankenlose, Busse's; **neu!** dunkelziegelroth, grösser als die anderen Rankenlosen, von feinstem Aroma; s. kräftig, sehr reichtragend | 100 | — — | — |
| 180. „ Rothe; zur Einfassung von Rabatten recht gut | 25 | — — | — |
| 181. „ Weisse; do. do. | 25 | — — | — |
| 186. **Reine des quatre saisons**; roth, rund, ausserordentlich fruchtbar | 30 | 2 50 | — |
| 147. Trouillet; gr., roth, sehr tragbar | 25 | 2 — | — |

## B. Scharlacherdbeeren.

| | p. St. ₰ | 10 Stück ℳ ₰ | 100 St. ℳ |
|---|---|---|---|
| 182. **Beehive** (Bienenstock); mgr., scharlachroth, sehr reichtragend und früheste der Erdbeeren | 25 | 2 — | — |
| 183. **May-Queen** (Maikönigin); mgr., scharlach, allerfrüheste Erdbeere | 25 | 2 — | — |

## C. Moschuserdbeeren (Vierländer).

| | p. St. ₰ | 10 Stück ℳ ₰ | 100 St. ℳ |
|---|---|---|---|
| 190. Monstrous Hautbois; schwarzbraun, sehr aromatisch, grösste dieser Gattung | 25 | 1 50 | — |
| 29. Royal Hautbois; mgr., ausserordentlich aromatisch | 25 | 1 50 | — |

## D. Grossfrüchtige (Ananas-) Erdbeeren.

| | p. St. ₰ | 10 Stück ℳ ₰ | 100 St. ℳ |
|---|---|---|---|
| 121. Admiral Dundas, sehr gross, kräftig und reichtragend | 15 | — 75 | — |
| 174. Alpha, gr., lebhaft scharlachroth. Nach 3 jähriger Erfahrung des Züchters früheste aller bekannten wirklich grossfrüchtigen Sorten; eignet sich zum Treiben; reichtragend und kräftig. Neu! | 60 | 5 — | — |
| 198. Amy Robsart (Dr. Roden); sehr frühe Treibsorte, sehr ertragreich und aromatisch. Neu! | 75 | 6 — | — |
| 98. Askot Pine-apple, mittelfrüh | 15 | — 75 | 5 |
| 99. Avenir, gr., eiförmig, glänzend hochroth | 15 | — 75 | — |
| 30. **Bijou**, mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, spät, sehr fruchtbar | 15 | — 75 | 5 |
| 194. Bonny Lass (Dr. Roden), sehr spät. Neu! | 100 | — — | — |
| 44. **Boule d'or**, gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, glänzend orange, ziemlich tragbar, spät, vielleicht die schönste bek. Sorte | 15 | — 75 | 5 |
| 80. British Sovereign, sehr gr., mittelfrüh, sehr reichtragend | 15 | — 75 | — |
| 187. Brown's Wonder, neuere englische Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll, trägt hier nicht voll | 15 | — 75 | — |
| 115. **Carolina superba**, gr., orange; mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren | 15 | — 75 | 5 |
| 92. Ceres, gr., dunkelroth, saftreich, sehr tragbar | 15 | — 50 | 3 |
| 101. Châtelaine, gr., brillant-carmoisinroth, auffallend lang | 15 | — 75 | 5 |
| 122. **Cockscomb**, dick, kegelförmig, dunkelroth; sehr tragbar, spät | 15 | — 75 | 5 |
| 93. **Cornish Diamond**, sehr gross, dunkelroth; spät, reichtragend | 25 | 1 50 | — |
| 209. Crescent seedling; mgr., glänzend roth, guter Qual., ganz ausserordentlich fruchtbar; neue amerikanische Sorte | 100 | — — | — |
| 171. Deutscher Held, ziemlich gr., dunkelroth, niedrig | 50 | 3 — | — |
| 170. **Deutsche Kaiserin**, gr. oder sehr gr., carmoisinroth, mittelfrüh, fruchtbar | 50 | 3 — | — |
| 168. Deutscher **Kronprinz**, gr., abgerundet kammförmig, lebh. roth; mittelfrüh. | 30 | 2 — | — |
| 169. **Deutsche** Kronprinzessin, mgr., glockenförmig mit langem glänzendem Halse ohne Samen, zinnoberroth, früh. Ganz **neue Form!!** | 30 | 2 — | — |
| 191. **Deutsche** Perle (Göschke), gr., glockenförmig, ähnlich der „Deutschen Kronprinzessin“, weiss mit rosa Anhauch, früh. **Neu!** | 75 | 6 — | — |
| 86. Director Fürer, sehr gross, hahnenkammförmig, mittelfrüh | 20 | 1 50 | — |
| 173. **Duc de Magenta**, ungeheuer gr., rund oder gelappt, kirschroth, ziemlich spät. Prachtvolle Dessert-Erdbeere. **Neu!** | 75 | 6 — | — |
| 84. **Duc de Malakoff**, sehr gross, dunkelroth, reichtragend | 15 | — 75 | 5 |
| (207) 94. **Duke of Edinburgh**, erster Grösse oft enorm gr., lachsfarbig, mittelfrüh | 50 | — — | — |
| 95. **Early prolific**, gr., carminroth, früh, vorzüglich zum Treiben | 25 | 2 — | — |
| 139. **Elisa Vilmorin** (Gloede), die grösste Chili-Erdbeere, enorm gross, fruchtbar | 15 | 1 — | — |
| 81. **Elton improved**, mgr., lebhaft roth, etwas spät | 15 | — 75 | — |
| 160. **Eppendorf**, mgr., rund, lebhaft rosa, mittelfrüh | 30 | — — | — |

| | p. St. ₰ | 10 Stück M. ₰ | 100 St. M. |
|---|---|---|---|
| 187. **Eugen Fürst** (Göschke), gr. oder sehr gr., dunkelbraun, Form veränderlich, dauerhaft, sehr volltragend, mittelfrüh. Neu! | 50 | 4 — | — |
| 176. **Exquisite**, gr., rundlich, lebh. zinnoberroth; kräftig, reichtragend, mittelfrüh | 50 | 4 — | — |
| 117. **Fairy Queen**, gross, von länglicher Form, glänzend orange, kräftig und sehr fruchtbar | 15 | — 75 | — |
| 110. **Formosa**, gr., herzförmig, carmoisinroth, fruchtbar | 15 | — 75 | — |
| 167. **Freiherr von Stein**, gr., roth, mittelfrüh, oft zusammengewachsen | 30 | 2 — | — |
| 97. **Germania**, gr., oval, kräftig, frühreifend | 15 | — 50 | 3 |
| 177. **Gipsy-Queen** (Zigeunerkönigin); sehr gr., rund zuweilen stumpfkegelförmig, dunkelroth bis schwarzbraun, reichtragend; mittelfrüh. **Neu!** | 50 | — — | — |
| 67. **Globe**, gr., von schöner ovaler Form, carmoisinroth, reichtragend | 15 | — 50 | 3 |
| 85. **Graf Bismarck**, von bedeutender Grösse, regelmässig, glänzend carmoisin bis dunkelpurpur, mittelfrüh | 15 | 1 — | — |
| 172. **Graf Moltke**, sehr gr., breit kammförmig, dunkelbraun, fruchtbar, spät | 50 | 3 — | — |
| 50. **Gweniwer**, schön gr., lebhaft orange, sehr fruchtbar, zum Treiben geeignet | 15 | 1 — | — |
| 124. **Haquin**, sehr dick, oval konisch, dunkelroth, ausgezeichnete späte Fr. | 15 | — 75 | — |
| 192. **Helvetia** (Göschke), gr., lang kegelförmig, lebhaft zinnoberroth, reichtragend, mittelfrüh. **Neu!** | 75 | — — | — |
| 195. **Hundredfold** (Dr. Roden), mgr., dunkelroth, kegelförmig, früh, sehr ergiebig. **Neu!** | 75 | 6 — | — |
| 153. **James Carter**, gr., regelmässig rund, hell kirschroth, mittelfrüh | 15 | 1 — | — |
| 103. **James Veitch**, sehr gr., lebhaft roth, fruchtbar, früh | 20 | 1 50 | — |
| 118. **John Powell**, mgr. oder gr., eiförmig, orangeroth | 15 | 1 — | — |
| 125. **Jucunda**, gr., roth, spät, gedeiht in jedem Boden | 15 | — 50 | 3 |
| 211. **Kerr's prolific** (Kerr); **neu!** ebenso schön als Jucunda, aber besserer Qualität und ganz besonders fruchtbar | 100 | — — | — |
| 4. **La Constante**, spät, ziemlich regelmässig, roth, Fl. fest | 20 | — — | — |
| 61. **La robuste** gr. rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar und frühreifend | 15 | — 60 | 4 |
| 25. **Lucida perfecta**, gr., regelmässig rund, lebhaft ziegelroth, ausserordentlich fruchtbar, spät; ganz vorzügliche Chili-Erdbeere | 15 | — 60 | 5 |
| 196. **Mac Mahon**, ungeheuer gross, **grösste der neueren französischen Züchtungen** | 25 | 2 — | — |
| 188. **Matador**, sehr gr., oft enorm zinnoberroth, regelmässig länglich, von angenehm süss-säuerlichem Kirschgeschmack, sehr fruchtbar, mittelfrüh. **Neu!** | 75 | 6 — | — |
| 197. **Monseigneur Dupanloup** (Dubois); **neu!** s. gr., länglich kegelförmig, bisweilen abgestumpft, scharlach, voll, schmelzend, sehr parfümirt, mittelfrüh, hält sich lange; sehr kräftig und sehr fruchtbar | 75 | — — | — |
| 14. **Monstrueuse de Robine**, gr., kegelförmig, roth, sehr gut! | 15 | — 50 | 3 |
| 57. **Napoleon III.** spät, sehr reichtragend, sehr gr. und schön! | 30 | 2 — | — |
| 201. **Phénomène** (Mulié); **neu!** s. gr., 2 bis 3lappig gespalten, gleichend einer Doppelfrucht, scharlach; sehr robust, trägt früh und reich | 75 | — — | — |
| 111. **Président**, gr. oder sehr gr., rund und lapptg, roth. kräftig, fruchtbar | 15 | — 60 | — |
| 105. **Président Wilder**, gr., schön konisch oder oval, karmoisinroth | 15 | — 60 | — |
| 112. **Prince impérial**, mittelgr., lebhaft roth, fruchtbar, früh | 15 | — 60 | — |
| 205. **Prinzess Alice Maud**; frühe fruchtbare zum Treiben beliebte Sorte | 25 | 1 50 | — |
| 104. **Prinzess Dagmar**, veränderlich, lebhaft rosa, früh | 15 | — 75 | — |
| 202. **Professor Burvenich** (Mulié); **neu!** gr., rundlich hahnenkammförmig, dunkel lackroth; Fl. dunkelrosa, zuckerig, saftvoll; ausserordentlich tragbar, mittelfrüh | 75 | 6 — | — |
| 203. **Professor Pynaert** (Mulié); **neu!** ausserordentlich gr., schön roth, hahnenkammförmig, abgeplattet, saftig, mfrüh. Sehr werthvoll | 75 | 6 — | — |
| 83. **Progrès**, gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpur, fest, reichtragend u. früh. Sehr zu empfehlen! | 15 | — 60 | 5 |
| 68. **Rëus van Zuidwyk**, sehr gr., länglich oder hahnenkammförmig, zinnoberroth etwas spät | 25 | 1 50 | — |
| 106. **Rubis**, gr., rund, glänzend roth, mittelfrüh | 15 | — 75 | — |
| 204. **Sanct Lambert**; reichtrgd., z. Treiben u. z. Marktverk. ganz vorzüglich empf. | 25 | 1 50 | — |
| 140. **Savoureuse**, mgr., rundlich kegelförmig, scharlach, fruchtbar, mittelfrüh | 20 | 1 — | — |
| 126. **Sir Charles Napier**, schön und gr., herzförmig, orangeroth glänzend, sehr fruchtbar | 15 | — 50 | 3 |
| 5. **Sir Harry**, gr., rund, scharlach, mittelfrüh, von enormer Fruchtbarkeit | 15 | 1 — | — |
| 162. **Sir John Fallstaff**, sehr gr., glänzend orange; kräftig u. sehr fruchtbar | 25 | 2 — | — |
| 119. **Souvenir de Kieff**, gr., kegelförmig, zuweilen abgeplattet, fruchtbar, mittelfrüh | 15 | — 60 | 4 |
| 141. **Succès**, gr., herzförmig, orange, sehr reichtragend, auf starken Stielen | 25 | 1 50 | — |
| 189. **Surpasse Bijou**; gr., lebhaft zinnoberroth, regelmässig rund, sehr reichtragend | 30 | 2 — | — |
| 120. **Topsy**, mgr. oder gr., meist lang, lebhaft roth, fruchtbar, mittelfrüh | 15 | — 60 | 4 |

| | p. St. ₰ | 10 Stück ℳ ₰ | 100 St. ℳ |
|---|---|---|---|
| 175. **Traveller** (Laxton), erster Grösse, oval oder kegelförmig, lebhaft roth, Pflanze niedrig, sehr fruchtbar; ziemlich spät. **Neu!** | 75 | — — | — |
| 156. **Unser Fritz**, gr., regelmässig, lebhaft carmoisinroth; sehr fruchtbar, mfrüh | 25 | 1 50 | 10 |
| 108. **Victoria Ovata**, gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth, kräftig und fruchtbar | 15 | — 60 | — |
| 166. **Waltham Seedling**, gr., glänzend kirschroth, ziemlich spät | 25 | 1 50 | — |
| 65. **White - Pine - apple**, gr., regelmässig rund, rein weiss, fruchtbar, sehr zu empfehlen | 15 | — 60 | 4 |
| 127. **Wonderful** (Perle de Rastede), gr., verlängert, abgeplattet, lebhaft roth, ausserordentlich fruchtbar, spätreifend | 50 | — — | — |

## D. Grossfrüchtige Remontirende

Sie tragen 2mal nur, wenn alle Ranken sorgfältig entfernt werden.

| | p. St. ₰ | 10 Stück ℳ ₰ | 100 St. ℳ |
|---|---|---|---|
| 37. **Ananas perpétuelle**; mgr, kegelförmig oder oval, scharlach | 25 | 1 50 | — |

## Amerikanische Moosbeere

(Vaccinium macrocarpum, Cranberry).

| | p. St. ₰ | 10 Stück ℳ ₰ | 100 St. ℳ |
|---|---|---|---|
| Mit dieser grossfrüchtigen, der Preisselbeere im Geschmack ähnlichen, Moosbeere, werden in Nordamerika Hunderte von Morgen bebaut und geben dort bedeutende Erträge. Auch bei uns sind bereits glückliche Versuche gemacht, und verspricht diese Pflanze auch hier auf feuchtem Moor- oder Sandboden sehr ertragreich zu sein | 25 | 1 50 | 13 |

# ROSEN.

Mein Rosensortiment umfasst circa 400 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt. Die mit **h** bezeichneten sind als Hoch- oder Mittelstämme vorräthig, die mit **n** bezeichneten als niedrige auf den Wurzelhals veredelte.

## Allgemeine Preise.

| | | p. St. ℳ ₰ | 100 St. ℳ |
|---|---|---|---|
| **Hochstämme** von 1,20—1,60 m Höhe | ℳ 1,75 bis | 2,50 | 150 |
| **Mittelstämme** „ 0,60—1,10 m „ | „ 0,90 bis | 1,50 | 75—125 |
| **Niederstämme** „ 0,30—0,50 m „ | | —,70 | 60 |
| **Niedrig veredelte** oder **Wurzelächte** | | —,55 | 50 |
| **Trauerrosen**, 1,70—2,25 m hohe Stämme | ℳ 2,50 bis | 4,— | — |
| **Kletter-** oder **Rankrosen** | „ 0,50 bis | 1,— | 45—70 |

NB. Hochstämmige Thee- und Noisettrosen sind 50 ₰ theurer, falls sie besonders verlangt werden.

## Treibrosen aus dem Lande.

(Vorrath 20,000 Stück.) Veredlungen auf den Wurzelhals.

| | | pr. 100 St. ℳ |
|---|---|---|
| starke Pflanzen 2 und 1jähr. Veredl. | I. Qual. | — 45 |
| do. do. „ „ „ | II. Qual. | — 35 |

418. Achille Gonod.
36. Alexandrine Bachmeteff.
205. **Anna Alexieff.**
2. Auguste Mie.
88. **Beauty of Waltham.**
41. Berthe Baron.
208. Duc de Bohan.
253. Elisabeth Vigneron.
588. Eugène Fürst.
7. **General Jaqueminot.**
149. **Gerbe des roses.**
6. **Gloire de Dijon.**
640. **Jean Liabaud.**
226. **John Hopper.**
132. **Jules Margottin.**
137. **La France.**
56. **Louise Odier.**
668. Louis Späth.
392. Mad. Scipion Cochet.
414. Mad. Soupert (Moos).
333. Mad. Victor Verdier.
42. Marie de Blois (Moos).
67. **Mistress Bosanquet.**
486. Monsieur Etienne Dupuis.
172. Paeonia.
421. Paul Neron.
397. **Perle des Blanches.**
365. Pierre Notting.
84. Sidonie.
150. **Souvenir de la Malmaison.**
139. **Triomphe de l'Exposition.**

## a) Remontant-Rosen (Oefterblühende).

h. 412. **Abbé Bramerel** (72); gr., glänzend crm. m. purpur u. sammtig dunkel nüancirt.
h. n. 418. **Achile Gonod**; gr. lchtd. crm., im Verblühen violettroth.
h. 499. **Albert Payé** (74); gr., s. zart seidenartig rosa.
n. 445. **Alfred Colomb**; gr., centifolienförmig, glänzend feuerroth.
h. n. 36. **Alexandrine Bachmeteff**; gr., lebh. rth., flache Schalenform, kräft.
h. 426. **André Fresnoy**; s. gr., lchtd. roth mit purp. nüancirt.
h. n. 205. **Anna Alexieff**; gr., hell lachsrosa, s. kräft., wenig rem.
h. 565. **Antoine Mouton** (75) s. gr., centifolienförmig, lebh. rosa, fast so gross wie »Paul Néron.« **Neu!**
h. n. 2. **Auguste Mie**; gr., rosa, leicht aufblühend, kräft., I.
n. 405. **Baron Bonstetten** (72); s. gr., schwarz sammt.-crms.; kräftig.
h. 31. **Baronne de Rothschild** (68); gr., zart rosa m. w. nüancirt, schöne Blume!
h. n. 88. **Beauty of Waltham**; gr.; lebh. seidenartig crms., Rückseite silberfarben, Kamellienbau, gut rem. kräft. I!
h. n. 41. **Berthe Baron** (69); schön rosa m. leicht weissl. nüancirt.
h. 471. **Blanche de Meru** (70); mgr., leicht rosa in weiss übergehend.
h. 106. **Bouquet de Marie**; mgr., w. m. grünlich, in Rispen blühend.
h. 46. **Camille Bernardin**, gr., lcht. crms., gut gef.
h. 533. **Capitaine Christy** (74); s. gr., s. zart fleischfarb. rosa. Centr. dunkler.
h. 85. **Charles Boissière**, s. gr., s. gef., lebh. feuerrth. mkräft., blüht schön in feuchten warmen Sommern.
h. n. 451. » **Margottin**; gr., blendend crm., Centr. leuchtend feuerroth.
h. 52. » **Turner** (70); gr., glänzend crms., becherförm.
h. 104. **Cleopatra**; gr.. s. gef. lchtd rosa, innen dunkler, reichblühend.
n. 481. **Climbing Victor Verdier** (72) gr., centifolienrosa m. lchtd. crm., kletternd.
h. 523. **Comtesse de Brosson** (74); gr., hellrosa m. weissl. berandet, Centrum rosettförmig;
h. 568. **Comtesse de Serenye** (75) s. gr.. centifolienförmig, zart rosa m. crm. schattirt. **Neu!**
h. 657. » **Vally de Serenye** (76); gr. amarantcrm. **Neu!**
h. 243. **Deuil du prince Albert**; gr., dkl. crms. m. schwarz schatt., kräft.
h. 617. **Dingée Conrad** (76); gr., glänzend hochroth, s. schöne Form. **Neu!**
h. 222. **Duc de Cazes**; gr., lchtd. purp. crms. kugelförm, mkräft., rem. gut I.
h. n. 208. **Duc de Rohan**; gr., blendend zinnoberroth, kugelförm., Farbe beständig, mkräft., I.
h. 591. **Duchesse de Vallembrosa** (76). gr. zart rosa, Centr. dunkelrosa in weisslich rosa übergehend; schöne Form. **Neu!**
h. n. 4. » **d'Orleans** (52); gr., hortensienrosa, schalenförmig, kräft.
h. 72. **Duke of Edinburgh** (69); gr., crms. m. leicht. crm. schattirt.
h. n. 353. **Elisabeth Vigneron**; s. gr., frisch rosa, leicht gef
h. 185. **Empereur de Maroc**; mgr., sammt purp., in schwärzl. übergehend, mkräft. I.
h. n. 78. **Enfant de France**; s. gr., w. fleischfarb. m. dunklerem Herz.
h. 503. **Ernest Herger** (74); gr., dkl. purpur. leuchtend nüancirt;
~~h. n. 124. **Etendard du grand homme**; s. gr., dkl. purp., kräft.~~
h. 174. **Etienne Levet** (72); gr., gut gebaut, prächtig carmin.
h.(687)588. **Eugène Fürst** (67); gr., Petalen breit, glänzend sammtig dunkelviol. u. lackroth.
h. 95. **Feu brillant**; mgr., lchtd. feuerroth.
n. 97. **Fischer Holmes**; gr., blendend scharlach, zieml. gef. I.
h. n. 108. **Général Baral** (68); gr., rosa m. viol. Anhauch u. sammet bläulichem Reflex.
h. n. 7. » **Jaqueminot**; gr., feurig rth. m. Sammt, zieml. gef. kräft., rem. gut I.
h. 131. » **Washington**; gr., lchtd. rth., gut rem., kräft. I.
h. 273. **Génie de Chateaubriand**; gr., lebh. viol. rth. Rückseite silberglänzend, päonienförm., Petalen gekerbt, flatterig, kräft.
n. 149. **Gerbe des roses**; mgr., fleischfarb.-lila in reichen Dolden blühend, zieml. gef. gut rem., kräft.
h. 570. **Gonsoli Gaëtano** (75); gr., fast gef., seidenartig weiss.
n. 501. **Hortense Mignard** (74); Petalen breit, lchtd. kirschrth., Rückseite fleischfarben, in Büscheln blühend.
h. 507. **Jean Dalmais** (74); s. gr., schön gebaut, veränderlich rosa.
n. 294. **Jean Goujon**; s. gr., schalenförm., lebh. rth., s. kräft., wenig rem.
h. n. 640. **Jean Liabaud** (76); s. gr., sammtig crms. mit schwarz. **Neu!**
h. 618. **Jean Soupert** (76); gr., sammt-purp., schön dachziegelförmig.
n. 296. **John G. Veitch**; gr., glänzend roth, im Verblühen viol., fast gef., sehr reichblühend.
h. n. 226. **John Hopper**; gr., lebh. crms.-rosa, schöner Bau, sehr gef., kräft
h. n. 132. **Jules Margottin**; gr., lebh. kirschroth. dachziegelartig, reichblühend, gut rem.
h. 215. **Juliette Lartay**, gr., blendend roth, Rückseite schieferfarbig, kräft.
h. 298. **L'Abondante**; gr., lchtd. feuerroth.
h. 237. **La Brillante**; mgr., durchsichtig hellcrm., in Rispen blühend, mkräft.
h. 589. **La Mignonne** (75); mgr., scharlach, später in chinesisch roth übergehend.
h. n. 14. **La Reine**; s. gr., rosa mit etwas lila, schalenförm., reichblühend, ähnlich einer Centifolie, gut rem., kräft., I!
h. 575. **La Souveraine** (75); s. gr., Petalen breit, lchtd. carm.-rosa.
n. 155. **Léopold I, roi des Belges**; s. gr., dkl. crms., s. gef., kräft.
h. n. 668. **Louis Späth** (76); gr., chinesisch rosa m. weiss nüancirt u. berandet.
h. 301. **Madame Ducamp**; gr. schön purpur.

n. 302. **Madame Elisa Vilmorin**; gr., dunkel scharlach m. braun nüancirt.
h. 181. " **Hector Jaquin**; gr., zart lilarosa, kugelförmig, voll.
h. 391. " **Lacharme** (73); s. gr., w., leicht rosa schattirt.
h. n. 119. " **Louise Carrique**; mgr., lchtd. dklrth., reichblühend in Büscheln, kräft.
n. 404. " **Louis Levêque** (74); s. gr., dachziegelartig, leuchtend hellrosa, Centr. dunkler.
h. 579. " **Rivière** (75); s. gr., s. zart rosa.
h. n. 392. " **Scipion Cochet**; (73); s. gr., dachziegelförmig, lchtd. kirschrosa, silberig gerandet.
h. 18. " **Trotter**; mgr., lebhaft rosa, kräft.
h. n. 333. " **Victor Verdier**; gr., lchtd. crm., schalenförmig, Blumen auf starken Zweigen, I.
h. 167. " **Vidot**; gr., fleischfarb. weiss m. rosa, kräft., Blume I. Ranges, aber rem. wenig.
h. 305. **Mademoiselle Amélie Halfen**; gr., schöne Form, leuchtend crms., mstark
h. 195. " **Annie Wood**; mgr., leuchtend roth, reichblühend, feine Form.
h. n. 508. " **Eugénie Wilhelm** (74); mgr., dunkelamarant-purp. m. schwärzlich und feuerroth nüancirt. **Neu!**
h. 492. **Marguerite Jamain** (74); gr., s. frisch fleischfarbig rosa.
h. 204. **Marie Baumann**; gr., lchtd. roth, voller als „General Jaqueminot“ reichblühend, I.
h. 485. **Marquise de Chambon** (72); mgr., lachsrosa, Centrum dunkler.
h. 212. **Maurice Bernardin**; gr., lchtd. hell zinnoberroth, kugelförmig, in Büscheln blühend, I.
h. 581. **May Turner** (75); s. gr., lachs rosa.
h. n. 486. **Monsieur Etienne Dupuy** (74); gr., ausgezeichnet lchtd. rosa, Rückseite silberig.
n. 172. **Paeonia**; gr., dkl. crms. rosa, Ränder der Petalen gefranzt.
h. 524. **Paulin Talabot** (74); gr., blendend dkl. rosa oder crm., sehr blühbar.
h. n. 421. **Paul Néron** (70); s. gr., schöne Form, dklrosa, extra, I.
h. n. 397. **Perle des blanches** (73); mgr., schöne Form, rein w. leicht geröthet, I.
h. n. 365. **Pierre Notting**; gr., schwärzl. purp., tief schalenförm., reichblühend, I.
h. 37. **Pius IX.**; gr., crms. m. lila Anflug, s. kräft.
h. n. 242. **Prince Camille de Rohan** (61); gr., sammtig dkl. crms. m. hochroth, kräft.
h. 218. **Puëbla**; gr., s. feurig roth, becherförm., I.
h. n. 142. **Reine des Violettes**; gr., dkl.-viol., flach, kräft., etwas rem.
h. n. 225. **Sénateur Favre**; gr., lchtd. roth, rund gebaut.
h. 144. " **Vaïsse**; gr. blendend dklrth., feste Petalen, Farbe beständig, rem. gut, kräft., I!
h. n. 84. **Sidonie**; gr., lachsfarb. rosa, gewölbt, rem. gut, Blumen etwas unregelmässig, Blatt glänzend, kräft., I.
h. 624. **Souvenir d'Arthur de Sansal** (76); mgr., oder gr., frisch centifolien rosa, wohlriechend. **Neu!**
h. 632. " **de David d'Angers** (76); gr., dunkelroth m. purp.-viol. nüancirt. **Neu!**
h. 240. " **de Monsieur Poiteau** (69); gr., lchtd. lachsrosa, s. kräft.
h. 490. " **de Spa** (74); gr., dklrth. mit feuerroth erhellt, prächtig.
h. 244. " **de William Wood**; gr., schwarz-purpur mit feuerroth.
h. 423. " **du général Douai** (72); gr., fast gefüllt, schön lchtd. rosa.
h. 320. " **du Président Lincoln**; mgr., sammt. crms. m. schwärzl. etwas unregelmässig, kräft.
h. 504. **Thomas Mills** (74); s. gr., blendend crm. weissl. berandet, becherförmig, sehr blühbar.
h. n. 139. **Triomphe de l'Exposition**; gr., sammt. dkl. crms., gut rem., mkräft. I.
h. 317. **Vainqueur de Goliath** (62); gr. leuchtd. feuerroth, s. gef., kugelförm.
h. 257. **Van Houtte** (70); s gr., dunkel feuerroth mit dunkel-crms. schattirt, prächtig centifolienförm., mkräft, I.
h. 227. **Victor Trouillard**; gr. dkl. scharlach mit feurigem Reflex, kräft.
n. 127. " **Verdier**; gr., crmrosa, schöne Form, rem. gut, mkräft.
h. 83. **William Jesse**; s. gr., hellcrms. m. purp. Anflug, fast gef., Centifolienbau, mkräft.

## b. Bourbon-Rosen.

Die Rosen dieser Klasse besitzen weniger leuchtende Farben, zeichnen sich aber durch vollendete Formenschönheit, reiches Blühen und Remontiren aus.

h. 45. **Boule de neige**; mgr., rein w., rund wie ein Schneeball; gut rem., I.
h. n. 137. **La France** (68); s. gr., silberrosa, Centr. lilarosa, äussere Petalen leicht umgebogen, reichblühend, sehr elegant, mkräft., I.
h. n. 56. **Louise Odier**; mgr., rosa, kräft., vollendete Centifolienform. Gute Treibrose, I.
h. 258. **Madame Alfred de Rougemont**; mgr., w. m. leicht rosa, reichblühend, becherförmig, kräft.
n. 67. **Mistress Bosanquet**; mgr., w., Centr. zart fleischf., schalenförm., s. reich und lange blühend, kräft. Gute Treibrose, I.
h. n. 678. **Robusta**; mgr., sammt. feuerroth, in purp. übergehend, in Bouquets blühend.
h. n. 150. **Souvenir de la Malmaison**; s. gr., s. gef., leicht w. fleischfarb., atlasartig, reichblühend, kräftig. Gute Treibrose, I!

## c. Noisett-Rosen.

Preise 50 ₰ höher.

In Rispen blühend, manche sehr reich, gut remontirend. Die grossen Blumen etwas hangend.

h. 264. **America**; gr., weissgelb, Centr. lachsgelb.
h. 231. **Céline Forestier**; gr., flach gelbl., Centr. dunkler, kräft. I.

h. 272. La biche; gr., fleischfarb. w., lockere Bl., s. reichblühend.
h. 378. Madame Caroline Küster (73); gr., orange, kugelförm., reichblühend.
h. 379. Marie Accary (73); mgr., gut gef., schöner Bau, w. m. leicht rosa u. g. tuschirt.
n. 275. Noisette d'Anjou; weiss, etwas gefüllt, oft über 20 Blumen in einer Dolde.
h. 214. **Zilla Pradel**; mgr., milchweiss m. gelbl. Schimmer, rem. gut, kräft. I.

## d. Theerosen.

Preise 50 ₰ höher.

Alle von feinem Wohlgeruch, sehr zarten Farben und hängendem Habitus, müssen im Winter gut gedeckt werden.

h. 532. Aureus (74); mgr., kupfergelb.
h. 456. **Belle Lyonnaise** (70); gr., dkl. kanariengelb.
h. 454. **Chamois** (70); gemsengelb, bisweilen in kupfergelb übergehend.
h. 438. Coquette de Lyon (72); mgr., zeisiggelb, gut gebaut.
h. 352. Duc de Magenta (59); s. gr., kupferig fleischfarbig, reichblühend.
h. 278. Homère; mgr., fleischf. w. lebh. rosa gerandet.
h. n. 6. **Gloire de Dijon**; gr., lachsgelb, s. reichblühd., s. gut rem., kräft. I!
h. 535. Helvetia (74); gr., lachsrosa, Centr. pfirsichrosa.
h. 409. Madame Azélie Imbert (72); gr., lachsgelb, s. schön.
h. 540. " Bérard (71); gr., hell rosa, s. schön.
h. 425. " Camille (72); gr., kirschroth m. weisslichen Reflexen.
h. 419. " de Vatry; gr., dkl. rosa.
h. 417. " **Falcot**; nankingelb in hell übergehend.
h. 601. Madame John Taylor (76); s. gr., kupferig w. Neu!
h. 430. " **Jules Margottin**; mgr., citrongelb m. pfirsichrosa im Centrum.
h. 652. " Tronel (76); gr., flach, fleischfarb. weiss m. gelb nüancirt.
n. 505. Mademoiselle Antonia Decarly (74); mgr., kanariengelb.
h. 307. **Maréchal Niel**; s. gr., dkl. glb., becherförm., blüht spät. Holz nicht kurz zu schneiden! I!
h. 434. Regulus; mgr., flach, lchtd. kupferroth, aussen silberrosa.
h. 182. Souvenir d'un ami; s. gr., lachsfarbig m. rosa, reichblühend.
h. 555. Tantine; (75); gr., hellkirschroth in solferinoroth übergehend.

## e. Moosrosen, Remontirende.

h. n. 414. Madame Soupert (72); mgr., lchtd. kirschroth, s. bemoost, s. blühbar.
h. n. 199. Salet (Mad. Salet); gr., hellrosa, schöne Form, wohlriechend, kräft.
h. n. 403. **Soupert et Notting** (75); s. gr., lchtd. rosa, Centifoliengeruch, s. blühbar, s. schön. **Neu!**

## f. Monatsrosen.

(Bengalensis, Semperflorens.)

p. St. 35 ₰ 100 St. 25 ℳ

n. 670. Belle Marseillaise.
n. 339. **Cramoisi supérieur**; mgr., lchtd. dkl. crms., I.
n. 411. Ducher; weiss .................................................. p. St. 50 ₰
n. 335. Eugène Beauharnais; mgr., lchtd. purp. I.
n. 674. Louis Philippe; dkl. purp.
n. 675. **Nemesis**; schwärzlich purp.
n. 676. Purpurea; purp.

**Die folgenden Sorten blühen nur ein Mal, u. verlangen meist einen langen Winterschnitt od. sind nur auszuschneiden.**

## g. Moosrosen.

h. n. 193. **A long pedoncule**; mgr., zart rosa, in sehr reichen Büscheln blühend, vollkommene Centifolienform, auf langen Stielen stehend, kräft. I.
h. n. 286. **Arthur Young**; gr., dunkel purp. m. viol. schattirt, becherförmig.
n. 698. Cristata; gr., rosa, herrliche Knospe.
n. 295. **Gewöhnliche**; gr., rosa, schön; wurzelächt.
h. n. 196. **Gloire des mousseuses**; gr., fleischfarb. rosa, Centr. dunkler u. gefaltet, Moos reichlich.
h. 103. Madame de la Roche-Lambert; gr., prächt. amarantrth.; s. gef.
h. n. 42. Marie de Blois; gr., hellrosa m. Lilaschimmer, kugelförm.
h. n. 362. **Ninette**; mgr., lebh. kirschroth, ranunkelförm., Moos braun.

## h. Kletter- oder Prairierosen. (R. rubifolia, arvensis etc.)

In unserem Klima an geschützte Lauben od. an Wände zu pflanzen. Ein mit Rosen bekleidetes Haus bietet in deren Blüthezeit einen wahrhaft prachtvollen Anblick.

n. 521. **Amanda!**
n. 520. **American. Maid;**
n. 152. **Beauty of the prairies**; mgr., leicht gef., lilarosa I.
h. n. 347. **Belle de Baltimore**; kl., milchweiss m. gelbl. Schein.
n. 522. **Dundee Rambler;**
n. 690. **Fanny.**
n. 349. **Gracilis** (Boursaultii gracilis); mgr., lchtd. rosa.
n. 366. **Grosse Rankrose**; gr., hellrosa.
*n. 519. **Linnean Hill Beauty,**
n. 368. **Michigan Anna Maria**; kl., fleischf., gut gef., flach.
n. 687. **Präsident;**
*n. 689. **Pride of Washington**; lilarosa, s. schön.
h. n. 154. **Rouge**; gr., s. gef., m. weissl. Streifen, s. kräft. u. reichblühend. I.
h. n. 69. **Ruga**; mgr., schalenförm., hell fleischfarb., in gelbl. übergehend, theeartig duftend, s. schlanke lange Zweige; s. kräft. I.
n. 370. **Triomphe de la Duchère**; mgr., weissl. rosa, flach, gut gef.
n. 371. **William de Virginie**; mgr., leicht gef., rosa.

## i. Diverse.

n. 672. **Alba unica**; weisse Centifolie.
n. 683. **Bicolor** (R. lutea); leuchtend orangeroth, Rückseite gelb. Alte bekannte Kapuzinerrose.
n. 337. **Burgundiana rosea**; kl., rosa, s. früh blühend (Dijonröschen).
n. 338. — **rubra**; kl., dklviolettrosa, gut gef.
n. 310. **Centifolia major**; gr., rosa.
n. 311. — **minor**; kleine Centifolie.
n. 685. **Fortune's double yellow** (R. lutea); gummigutgelb m. crm. u. lachsgelb.
h. n. 48. **Madame Plantier** (R. hybr.) mgr., rein weiss, reichblühd. I.
n. 671. **Maidenblush**, hellrosa.
n. 163. **Multiflora** (de la Grifferaie); crmrosa, s. schöne starkwüchsige Gruppenrose.
h. n. 44. **Persian yellow** (R. lutea); mgr., goldgelb, blüht nur an den Spitzen der vorjährigen Zweige.
n. 319. **Pimpinellifolia**; mgr., w., s. reichblühend.
h. 605. **Pompon blanc parfait** (76); kl., zart fleischfarben in weiss übergehend, Bouquet von 6 — 12 Blumen. Neu!
n. 345. **Ranunkelrose**; mgr., crms., in viol. übergehend, reichblühd.
n. 321. **Rubrifolia livida**, *Koch*; die ganze Pflanze ist roth, Blume unbedeutend.

# Sortiment der Ziergehölze.

**Die Sortimente gelten nach meiner Wahl**, und sind die gewöhnlichen Sorten nicht inbegriffen.
**Besonders starke u. schöne Exemplare werden zu erhöhten Preisen** abgegeben.
**Weniger als 10 Stück werden zu den Partiepreisen nicht abgegeben**
**Was hundertweise vorräthig ist**, ist hinter der Preiskolonne mit * bezeichnet und wird nach dem 10 Stückpreise berechnet.

### Abkürzungen:

b. = *buntblättrig (weiss, gelb, roth oder silbergrau).*
h. i. = *halb immergrün*
i = *immergrün*
P. = *Pyramide*
T. = *Trauerbaum*
§. = *Schlingpflanzen*

* = *Pflanzen, die etwas geschützten Stand verlangen.*
△ = *Pflanzen, die empfindlich sind u. im Winter trocken bedeckt werden müssen.*
I, II, III, IV. = *Baum 1ter, 2ter etc. . . . . Grösse*
V, VI, VII, VIII = *Strauch 5ter, 6ter etc.. Grösse*

# A. Laubhölzer.

(Siehe auch **Alleebäume** u. **Gehölzsämlinge**.)

**Acer** *L.*, **Ahorn**........ 1 Sortiment v. 12 Sorten à 1 St. ℳ 10.

| Nr. | | p. Stück ℳ ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig |
|---|---|---|---|---|
| | Erste Gruppe. | | | |
| 10. | circinatum, *Pursh.*, Rundblättriger Ah. VI | — 50 | — | — |
| 11. | **Ginnala**, *Max.* (A. tataricum laciniatum, Rgl); m. weit ausgezackten Blättern, aus Sibirien. Sehr elegant. **Neu!** V......... 1—2m. hoch | — 80 | 7 | * |
| * 12. | macrophyllum, *Prsh.*, Grossblättriger; von schönem Effect, N. Amer. III | — 60 | 5 | — |
| 1. | Pseudoplatanus, *L.*, Stumpfblättriger (Weisser od. Platanen-Ah.); II. (s. auch Alleebäume)........ 2m. hoch | — 50 | 4 | * |
| b. 2. | — **bicolor**, *Hrt. Britz.*; Weissbunt gefleckt und marmorirt, eine hier entstandene sehr schöne Varietät | 1 25 | 11 | — |
| — | — ........ junge Hochst. | 2 — | 18 | — |
| 4. | — **erythrocarpum**, *S. L.* Rothfrüchtiger; III., s. hübsch mit Früchten | 1 — | 9 | — |
| — | — ........ junge Hochst. | 2 — | 18 | — |
| 55. | — **euchlorum**; siehe Neuheiten. | | | |
| b. 5. | — **fol. purpureis**, *Hrt.* Purpurblättriger; auf d. Unterseite der Blätter ganz purpurroth, macht Effect, besonders als Hochst. II., III., (s. auch Alleebäume) 1—2m. hoch | — 75 | 6 | * |
| b. 6. | — **Leopoldi**, *Hrt.*, weissb., die jungen Triebe blutroth | 1 — | 9 | — |
| — | — ........ junge Hochst. | 2 — | 18 | — |
| 52. | — Rafinesquianum, *Hrt.*; junge Triebe bräunlich, Laub dunkel | 1 — | — | — |
| 8. | — serotinum, *Hrt.*; Später stumpfblättriger | — 80 | 7 | — |
| b. 9. | — tricolor, *Hrt.*; Dreifarbiger; weiss, roth u. grün | 1 — | 9 | — |
| — | — ........ junge Hochst. | 2 — | — | — |
| 81. | — velutinum | — 75 | — | — |
| b. 63. | — **Woorleii**; neuer Ahorn mit goldgelben Blättern | 1 25 | — | — |
| 14. | spicatum, *Lam.*, Aehrentragender; VI | — 50 | — | — |
| 15. | tataricum, *L.*, Tartarischer; hoher, allbekannter Zierstrauch. IV, V 0,50 bis | 1 — | 4—9 | * |
| | Zweite Gruppe. | | | |
| | **a.** | | | |
| 24. | Lobelii, *Ten.*, Lobel's Ah.; m. dunkelgrünen Blättern. Süd Italien | 1 25 | — | — |
| 25. | nigrum. *Mchx.*, (A. saccharinum, *Wangenh.*) Zucker-A.; N.-Amer II, III. | — 60 | 5 | — |
| *b. 27. | **pictum** *Thunb.*, **rubrum** (A. colchicum rubrum, *Hrt.*,) m. rothen Zweigspitzen V | 1 — | — | — |
| 16 | platanoïdes, *L.*, Spitz-A.; mit glänzendem Laube. II, III (s. auch Alleebäume) | — 50 | 4 | — |
| b. 77. | — aureo marginatum; gelblich gerandet | 1 — | — | — |
| 83. | — columnaris; *Hrt.*, Säulenförmiger; **neu!**........ 1j. Veredl. | 1 25 | — | — |
| 17. | — cucullatum, *Hrt.*, Hohlblättriger; | 1 — | 9 | — |
| 18. | — **dissectum**, *Hrt.*; m. eingeschnittenen Blättern, IV | 1 — | 9 | — |
| 20. | — globosum, Kugel-Ahorn | 1 — | 9 | — |
| 22. | — **Lorbergi**, Lorberg's A.; m. scharf gezackten Blättern, raschwüchsiger als Nr. 18. Neuere Sorte | 1 25 | 11 | — |
| b. 78. | — **purpureum Reitenbachi**, sehr schöne Neuheit! Belaubung im Sommer und Herbst bräunlich purpur...1jähr. Veredl. | 1 75 | 15 | — |
| 23. | — **Schwedleri**, Schwedler's A.; mit blutrothen Zweigspitzen, altes Laub bräunlichgrün, sehr schön! III.. 1—2m. h. | 1 — | 8 | * |
| — | — schöne Hochstämme........ ℳ 1,50 bis | 4 — | 18 | * |
| | **b.** | | | |
| 28. | campestre, *L.*, Feld-A. Massholder; IV, V........ 1½—2m. h. | — 40 | 3 | * |
| b. 31. | — pulverulentum. *Hrt.*, Bestäubtblättriger Feld-A.; sehr hübsch | 1 25 | — | — |
| * 34. | italum, *Lauth* (A. opulifol., Vill.) Italienischer; IV | 1 — | — | — |
| 35. | liburnicum, *Hrt.*, Liburnischer; s. kleinblättr. VI | 1 — | — | — |
| 36. | Monspessulanum, *L.*, A. von Montpellier; kleinblättrig V | — 50 | — | — |
| 37. | neapolitanum, *Ten.*; Laub mehr röthlich als unser Feldahorn | — 60 | — | — |
| * 38. | obtusatum, *Kit.*, Stumpfer italienischer | 1 — | — | — |
| 40. | tauricum *Hrt.*, Taurischer; kleinblättrig | 1 — | — | — |

| | p. Stück M. ₰ | 10 St. M. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| Dritte Gruppe. | | | |
| 41. **dasycarpum**, *Ehrh.*, (eriocarpum) Silber-A.; Unterseite der Blätter silbergrau, sehr raschwüchsig. II, III. (s. auch Alleebäume) 2m. hoch | — 50 | 4 | * |
| 46. — dissectum Wagneri; | 1 25 | — | — |
| 79. — **laciniatum Wieri**; siehe Neuheiten. | | | |
| 80. — sanguineum; | 1 — | — | — |
| 45. rubrum, *L.*, Rothblühender A.; blüht im April schön roth IV, III | — 60 | 5 | * |
| 59. — palmatum | 1 — | — | — |
| 76. — tomentosum; | 1 — | — | — |
| Vierte Gruppe, Negundo. | | | |
| 47. **Negundo**, *L.*, Eschenblättr. A.; sehr hell belaubt u. ausserordentlich raschwüchsig III, IV. starke Sträucher 2m. h. | — 40 | 3½ | * |
| 48. — californicum, *Hrt.*; starkwüchsiger als Nr. 47 | — 50 | 4 | * |
| 56. — crispum; Krausblättriger | 1 — | 9 | — |
| b. 49. — **fol. argenteo var.**, *Hrt.*, Weissbunter; eines der schönsten bunten Gehölze, die bei uns im Freien aushalten. An den Rand der Gebüsche od. einzeln zu pflanzen. Einjähr. Veredl. | — 50 | 4 | — |
| do. do. starke Pyramiden M. 1,25 bis | 4 — | 11—20 | * |
| do. do. Hochst. M. 2 bis | 2 50 | 18 | — |
| 57. — violaceum, *Hort.*; m. s. dunkelgrünen Blättern | 1 — | — | — |
| §. **Actinidia polygama** (Prunus), *Max.*, neues Schlinggewächs aus Ost-Sibirien u. Japan, trägt Früchte von der Grösse der Stachelbeere u. dem Geschmack der Weintraube | 1 25 | 11 | — |
| **Aesculus**, *L.*, **Rosskastanie.** 1 Sortim. von 12 Sorten à 1 St. 12 M. | | | |
| a) **Eigentliche Rosskastanie** (Hippocastanum). | | | |
| 10. digitata, Gefingerte; Blätter fingerförmig. V | 1 25 | — | — |
| 11. floribunda, Reichblühende 1,25 bis | 3 — | — | — |
| 1. Hippocastanum, *L.*, Gemeine; III, II 2m. hoch (s. auch Alleebäume) | — 60 | 5 | — |
| 2. — **fl. pl.**, Gefüllt blühende IV | 1 25 | — | — |
| — — — do. junge Hochst. | 3 — | — | — |
| 4. — laciniata (A. H. heterophylla dissecta); Geschlitztblättrige. Die Belaubung ähnlich einem Farrn 1,25 bis | 2 50 | — | — |
| 5. — umbraculifera, Schattenreiche; Krone kugelförmig 1,50 bis | 2 50 | — | — |
| b. 6. — Memmingeri, Memminger's mit punktirten Blättern 1,25 bis | 2 50 | — | — |
| 32. pumila fl. pl., Gefüllte Zwerg-K. 1,25 bis | 2 50 | — | — |
| 7. **rubicunda**, *Lodd.* (carnea, *Willd.*), Rothblühende; blüht jünger und 14 Tage später als die Gemeine Kast., behält auch im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger. III. IV. (s. auch Alleebäume) | 1 25 | 11 | — |
| 9. — coccinea; dunkelroth 1,50 bis | 3 — | — | — |
| b. 8. — fol. marginatis, *Hrt.*, Gelbrandige rothblühende | 1 50 | — | — |
| b) **Pavien** (Pavia). mit meist glänzenden Blättern und schwächerem Wuchse. | | | |
| 14. glabra, *Willd.*, Glattblättrige; blüht gelb, N.-Amer. IV, V 1 bis | 2 50 | — | — |
| 15. — Ohioensis, *D. C.*, Glattblätter. v. Ohio 1 bis | 2 50 | — | — |
| 16. — pallida, *Willd.*, Glatte weissliche 1 bis | 2 50 | — | — |
| 18. hybrida, *D. C.*, (A. discolor, Prsh.), Zweifarbige; kleiner Zwergbaum, s. dankbar blühend mit kleinen rosa Blüthen | 1 — | — | — |
| 19. **lutea**, *Wangenh.* (Pavia flava, *Mönch.*), Gelbblühende; V | — 80 | 7 | — |
| do. do. junge Hochst. | 2 — | — | — |
| 20. Lyoni, *Hrt.*, Pavie von Lyon 1 bis | 2 50 | — | — |
| 28. **macrostachya**, *Mchx.* (-parviflora, *Walt*), Strauch-P., blüht in grossen weissen Rispen im Hochsommer | 1 — | — | — |
| 21. marylandica, *Bth. C.*, P. v. Maryland 1 bis | 2 50 | — | — |
| 23. Pavia atrosanguinea, Dunkelblutrothe P. 1,25 bis | 2 50 | — | — |
| 24. — coriacea, *Hrt.*, Lederblättrige P. 1 bis | 2 50 | — | — |
| 25. — mutabilis, *Spach.*, Veränderliche P.; Kelch rosa, Krone gelb 1 bis | 2 50 | — | — |
| 27. — versicolor, *Hrt.*, Wechselfarbige P. | 1 — | — | — |

| | p. Stück ℳ | p. Stück ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Ailanthus**, *Desf.*, **Götterbaum**; | | | | |
| * 1. glandulosa, *Desf.*, Aechter; m. sehr grossen gefiederten Blättern, schöner Baum, IV. . . . . 1—2m. h. | — | 50 | 4 | * |
| **Akebia**, *Dne*, **Akebie**. | | | | |
| § 1. quinata (Rajania), *Thunb.*, ein feinblättriger lianenartiger Kletterstrauch mit violetten Blüthen | — | 75 | 6½ | — |
| **Alnus**, *Gärtn.*, **Erle** (Else) . . . . 6 Sorten à 1 St. ℳ 6. | | | | |
| 1. americana, Amerikanische E.; herrliches Grün! | — | 60 | 5 | — |
| 2. barbata, *C. A. May*, Bärtige; von den einheimischen Arten sehr abweichend, hübsch, III | 1 | — | — | — |
| 4. cordata (Betula) *Lois*, Herzblätter. E.; Italien, kleinbl., IV . . . . . 0,60 bis | 1 | — | 5 | — |
| 6. glutinosa, *L.*, Roth-E.; III, II . . . . . 2m. hoch (s. auch Alleebäume) | — | 40 | 3½ | * |
| b. 7. — fol. var., Gelbbuntblättrige R.-E. | 1 | — | — | — |
| 9. — **imperialis**, *Hrt.*, Kaiserliche R.-E.; sehr zierlich geschlitzt, IV | 1 | 25 | 11 | — |
| 8. — laciniata, *Hrt.*; geschlitztblättrig | 1 | 25 | — | — |
| 11. — quercifolia, *Willd.*, Eichenblättrige R.-E. . . . 1 bis | 2 | — | 9—18 | — |
| 29. — sorbifolia, *Hrt.*; ebereschenblättrig | 1 | 25 | — | — |
| 12. hybrida, *Hrt.*, Bastard-E. | 1 | 50 | — | — |
| 14. incana, *Willd.*, Weiss-E., Nordische E. III . . . 2½—3m. hoch | — | 75 | 6 | — |
| 17. — **laciniata**, *Hrt.*, Geschlitzte W.-E., wohl die schönste aller Erlen III | 1 | 25 | — | — |
| 19. — plicata, *Hrt.*, faltigblättrig . . . . 1 bis | 2 | — | — | — |
| 20. — sublaciniata, *Hrt.*, halbgeschlitzte . . . . 1 bis | 2 | — | — | — |
| 22. oblongata, *Mill.*, Längliche E. . . . . 1 bis | 2 | — | — | — |
| 24. rugosa (Betula) *Ehrh.* (A. serrulata, *Willd.*), Nordamerikanische Strauch-E.; buschig V. . . . . 1—2m. h. | — | 75 | | |
| 25. sibirica, *Fisch.*, Sibirische E. | 1 | 25 | — | — |
| **Amelanchier**, *Med.*, **Felsenbirne**. | | | | |
| 2. **canadensis** (Mespil), *L.*, (Amel. Botryapium, *D. C.*), Kanadische F.; im Herbst schön rothblättrig, V | — | 75 | 6 | — |
| 4. rotundifolia (Crataeg.) *Lam.* (Mespil. Amelanchier, *L.*); Gemeine F.; blüht sehr früh V, VI | — | 30 | 2½ | * |
| 5. spicata (Crataeg.) *Lam.* (-ovalis sanguinea, *Hrt.*) Blut-F. | — | 75 | 6 | — |
| **Amorpha**, *L.*, **Unform**; alle blühen im Juli, meist bräunlich mit violett, und werden ziemlich hoch. | | | | |
| 3. crispa, *Hrt.*, Gekräuselte | — | 50 | — | — |
| 8. fruticosa, *L.*, Strauchartige; macht mit seinen gefiederten Blättern einen sehr schönen Effect, gedeiht auch auf schlechtem Sandboden gut; VII, VI . . . . . stark | — | 30 | 2½ | * |
| **Ampelopsis** siehe Vitis. | | | | |
| **Amygdalopsis** siehe Prunus triloba. | | | | |
| **Amygdalus**, *L.*, **Mandel**, **Pfirsich**. | | | | |
| 510. communis fl. pl., *Hrt.*, Gefüllte Mandel; | 1 | 50 | 13 | — |
| 508. georgica, niedrig bleibend | — | 50 | 4 | — |
| 513. orientalis, *Mill.*, Morgenländische M.; mit blassgrüner Belaubung, sehr üppig wachsend, V | 1 | — | — | — |
| * 504. Persica alba pl., Gef. weissblühende chinesische Pf. | 2 | — | — | — |
| * 501. — camelliaeflora pl., Kamellienblüthige | 2 | — | — | — |
| * 505. — coccinea pl., Gef. scharlachrothe Pf. | 2 | — | — | — |
| * 502. — dianthiflora pl., Gef. nelkenblüthige Pf. | 2 | — | — | — |
| 500. — **fl. pl.**, Gefülltblühende Pf.; die härteste Sorte mit grossen hübschen röschenähnlichen Blumen | 1 | 50 | 13 | — |
| 506. — **fol. purpureis**, **Purpurblättrige Pf.**; hart und recht constant. Die Farbe bleibt auch im Sommer purpurn, und die Früchte sollen ganz dunkelroth sein und sehr angenehm schmecken . . . . . 1,50 bis | 2 | 50 | 13 | — |
| * 503. — roseaeflora pl., Gef. rosenblüthige | 1 | 50 | | — |
| 509. persicoides, Ser., Pfirsich-Mandel | 1 | — | 9 | — |
| **Aralia**, *L.*, **Aralie**. | | | | |
| △ 1. chinensis, *L.* (japonica, *Hrt.* = Dimorphantus mandschuricus, *Max.*); | 1 | 25 | | — |
| **Aristolochia**, *L.*, **Osterluzei** (Pfeifenwinde). | | | | |
| § 1. Sipho *L'Hér.*, Grossblättrige . . . . ℳ 1,25 bis | 2 | — | 11—18 | — |
| **Armeniaca** s. Prunus Armeniaca. | | | | |
| **Aronia** s. Sorbus | | | | |
| △ **Aukuba**, *Thunb.*, **Goldorange**. 12 Sorten à 1 Stück ℳ 9. | | | | |
| Nach Wahl des Bestellers aus folgenden Sorten: | 1 | — | 9 | — |

**Aukuba.**

21. japonica augustifolia.
22. — arborea.
18. — bicolor.
6. — dentata vera.
5. — fol. aureo marginatis.
20. — grandidentata.
10. — hermaphrodita.
3. japonica himalaica.
1. — longifolia.
24. — — var.
11. — macrodontha.
7. — maculata.
12. — medio-picta.
25. japonica ovata.
16. — punctata.
9. — pygmaea.
8. — salicifolia.
16. — viridis femina.
15. — — mascula.
4. — — vera.

| | pr. Stück M. | Pf. | 10 St. M. | hundertweise vorräthig |
|---|---|---|---|---|
| * **Azalea**, *L.*, **Azalee**. | | | | |
| **mollis**, *Bl.* (A. sinensis, *Lodd.*); sehr schöne harte Species! In gemischten Farben, starke Pflanzen | 2 | 50 | — | — |
| pontica *L.*, Pontische A.; starke Pflanzen in den schönsten Farben (weiss, gelb und roth) gemischt ... M. 1. 25 bis | 2 | 50 | 11–22 | — |
| **Berberis**, *L.*, **Berberitze** (Sauerdorn); 8 Sorten à 1 St. ... M. 5 | | | | |
| a) **Mahonien**, fiederblättrig, immergrün. | | | | |
| i. 1. **Aquifolium**, *Prsh.*, Gemeine M.; ein sehr zierender u. harter Strauch, VII, m. grossen gelben Blüthendolden ... starke Pflanzen | — | 50 | 4 | * |
| i. * 3. japonica (Ilex) *Thunb.* (B. Bealii *Fort.*), Japanische M., schöne Einzelpflanze | — | 75 | — | — |
| b) **Aechte Berberitzen**: | | | | |
| 15. cretica, *L.?*, Kretische B., feine zierliche Belaubung | — | 75 | — | — |
| 17. Jacquini, *Hrt.*, Jacquin's B. | — | 60 | — | — |
| 19. macracantha, *Schrad.*, Grossstachelige B. | 1 | — | — | — |
| 20. **macrophylla**, *Hrt.*, Grossblättr. B.; sehr glänzendes Laub u. grossblättrig | 1 | — | 9 | — |
| h. i. * 21. **microphylla**, *Först.* (B. dulcis, *Sweet*), Buchsblättrige, sehr zierlich, Frucht blau | — | 60 | 5 | — |
| h. i. 22. **Neubertii**, *Hrt. Bollw.*, Neubert's B.; sehr schön grossblättrig mit glänzenden elegant gezähnten Blättern, Bastard von Berb. Aquifolium | 1 | — | 9 | — |
| 23. sibirica, *Hrt. nicht Pall.*, Sibirische B. | 1 | — | — | — |
| 24. sinensis, *Desf.* (B. monosperma, *H.*); Chinesische B. | — | 60 | 5 | — |
| 25. vulgaris, *L.*, Gemeine B.; VI, VII. Die rothen Beeren zum Einmachen benutzt | — | 25 | 2 | * |
| b. 26. vulgaris, **fol. atropurpureis**, *Hrt.*, Purpurblättrige B.; sehr dunkel purpurfarbige Blätter, schön, VII, VI ... starke Sträucher | — | 40 | 3 | * |
| 33. — fol. marginatis; gelbrandig | — | 75 | — | — |
| **Betula**, *L.*, **Birke**: ... 10 Sorten à 1 Stück M. 8 | | | | |
| a) **Eirundblättrige Birken:** | | | | |
| 1. alba, *L.* (B. odorata, *Bechst.*), Gemeine Weiss-B.; III. ... ca. 2m. h. | — | 40 | 3 | * |
| P. 7. — **fastigiata**, *Hrt. Bollw.*, **Pyramiden-W.-B.**; streng pyramidal wie die italienische Pappel ... 0,75 bis | 2 | 50 | 7 | — |
| T. 21. alba **laciniata**, *Hrt.*, Geschlitztblättrige W.-B.; eine ausserordentlich zierliche Art mit etwas hängenden Zweigen ... 0,75 bis | 3 | — | 7–25 | — |
| b. 40. alba **purpurea**, *Hrt.*, Purpurblättrige W.-B. **eine der besten Neuheiten**, die in den letzten Jahren in den Handel kamen. Sie ist von hervorragendem landschaftlichem Werth und ersetzt in den Gegenden wo die Blutbuche nicht gut gedeiht, dieselbe vollständig ... 1jähr. Vered. | 1 | — | 9 | * |
| — — ... 2–3jähr. Veredl. | 1 | 50 | 13 | * |
| — — ... Hochst. | 3 | — | 27 | * |
| 4. davurica, *Pall.*, Daurische B.; | — | 75 | — | — |
| 39. **davurica vera**, *Hrt.*, mit rundlicher graugrüner Belaubung. Sehr schön! | — | 75 | 7 | — |
| 6. excelsa, *Ait.*, Hohe B.; starkwüchsig, schön, II ... 0,75 bis | 1 | 50 | 6 | — |
| 8. fruticosa, *Pall.* (B. Gmelini, *Bge.*); Strauchartige B.; VI ... 0,75 bis | 1 | 50 | 6–12 | — |
| 9. glandulosa, *Hrt.*; strauchartig, ähnlich fruticosa | — | 75 | 6 | — |
| 34. humilis, *Schrenk*; niedrigere Unterart von B. fruticosa | — | 75 | 7 | — |
| 11. macrophylla, *Hrt.*, Grossblättrige B. | 1 | 50 | — | — |
| 35. **nana**, *L.*, Zwerg-B.; VIII, fast kriechend mit zierlichen zahlreichen Blättchen | 1 | — | 8 | — |
| 15. papyracea, *Ait.*, Papier-B.; | — | 60 | 5 | — |
| 16. **papyracea grandis**, *Bth. C.*, Grossblättr. Papier-B.; starkwüchsig, II, III | 1 | — | — | — |
| — — ... Hochst. | 2 | — | — | — |
| T. 18. **pendula elegans Youngii** *Hrt.*, neue sehr zierliche Hänge-B. | — | 75 | 7 | — |
| 19. pirifolia, *Bth. C.*, Birnblättrige Papier-B., mit dunklem Laube ... 1 bis | 2 | 50 | — | — |
| 20. populifolia, *Ait.*, Pappelblättrige B.; | — | 50 | 4 | — |

| | pr. St. | | 10 St. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| | ℳ | ₰ | ℳ | |
| **Betula.** | | | | |
| 41. populifolia purpurea, *Hrt.;* neue Purpur-Birke, die stärker wachsen soll | 2 | 50 | — | — |
| 22. pubescens, *Ehrh.*, Brocken-B. . . . 1 bis | 1 | 50 | — | — |
| T. 23. **pubescens asplenifolia**, *Hrt.*, Farrnblättr. Brocken-B.; hübscher Trauerbaum . . . 1 bis | 2 | — | — | — |
| 42. — fol. var., *Hrt.*; weissbuntblättrig . . . | — | 75 | 7 | — |
| 24. — undulata, *Z.*, Wellige Br.-B. . . . | 1 | 25 | — | — |
| 36. Soccolovii, *Hrt.*, in der Art wie fruticosa . . . | 1 | — | 9 | — |
| T. 27. **tristis**, *Hrt.*, Trauer-B.; alte Rinde weiss, e. gut hangende Sorte; III, IV . . . 0,75 bis | 2 | 50 | 7—22 | — |
| b) **Weissbuchenblättrige Birken.** | | | | |
| 30. lenta, *L.*, (B. lutea, *Hrt.*,) Zucker-B.; sch. belbt., Blätt. oft gelbl. gerandet, V. IV | — | 75 | — | — |
| 32. **ulmifolia**, *S. u. Z.* (B. costata, *Trautv.*), Ulmenblättrige B.; aus Japan neu eingeführter schöner Baum . . . | 1 | 25 | — | — |
| **Bignonia** s. Catalpa und Tecoma. | | | | |
| **Broussonetia**, *Vent.*, **Papierbaum**; | | | | |
| * 1. papyrifera (Morus) *L.*, Aechter; mit feigenähnlichen, graugrünen Blättern, schöne Decorationspflanze, VI, VII. . . . | — | 60 | 5 | — |
| **Buddleja**, *L.*, **Buddleie**. | | | | |
| Lindleyana, *Fort.*; niedriger Strauch m. gelblichen Blüthen . . . | — | 50 | 4 | — |
| **Buxus**; *L.*, **Buxbaum**; | | | | |
| i. 1. **sempervirens**, *L.*, (B. arborescens, *Lam.*), Gemeiner **baumartiger**; VI, wird trotz seiner sehr zierenden Eigenschaften noch viel zu wenig angepflanzt, 30—60 Ctm. hoch . . . 0,75 bis | 1 | 50 | 7—13 | * |
| — 0,60—1m. hohe **schöne Pyramiden** . . . 2 bis | 4 | — | 17—35 | * |
| i. b. 2. — fol. arg. marg., Weissrandiger; VII . . . | — | 75 | — | — |
| i. 3. — **macrophylla**, Grossblättriger; 0,80—1m. h. Pyram. 1 bis | 4 | — | 9—35 | — |
| i. 4. — **myrtifolia**, Myrtenblättriger; sehr hübsch, für Winter-Bouquets anstatt Myrten zu verwenden 0,50—0,90 m. h. 1,50 bis | 4 | — | 13—35 | — |
| i. 5. suffruticosa, *Willd.*, Gemeiner staudiger B.; beliebt zu Einfassungen, p. laufenden Meter | — | 75 | 6 | * |
| i. * 6. subglobosa, *Hrt.*, Kugeliger B.; bleibt niedrig . . . 0,75 bis | 1 | 50 | 7—13 | — |
| **Calycanthus**, *L.*, **Gewürzstrauch**; s. auch Chimonanthus. | | | | |
| 1. floridus, *L.*, Reichblühender; die braunen Blüthen haben einen starken melonenähnlichen herrlichen Geruch . . . | 1 | — | 9 | — |
| **Caprifolium** s. Lonicera. | | | | |
| **Caragana**, *Lam.*, **Karagane** (Erbsenbaum) 10 Sorten à 1 St. ℳ 8. Alle besitzen zierliche gelbe Schmetterlingsblüthen im Früh-Sommer. | | | | |
| 1. arborescens, *Lam.*, Baumartige K.; V. . . . starke Sträucher | — | 30 | 2 | * |
| 2. — nana, *Hrt.*, Niedrige K.; kugelförmig VII, VIII . . . Hochst. | 1 | 50 | — | — |
| T. 3. — **pendula**, *Hrt.*, Trauer-K.; 1½—2 Meter hohe Stämme ℳ 1,25 bis | 1 | 50 | 11—13 | * |
| — — **starke über 2m. hohe Stämme** m. starker Krone . . . 2 bis | 2 | 50 | 18—22 | — |
| 4. **Chamlagu**, *Lam.*, Chinesische K. . . . Hochst. | 1 | 50 | — | — |
| 16. frutescens, *DC.*, Strauchartige K.; . . . | — | 30 | 2 | * |
| 6. glomerata, *Hrt.*, Büschelblättrige K.; Laub dunkel, VII . . . Hlbst. | 1 | — | — | — |
| 8. jubata (Robinia), *Pall.* Ganz merkwürdige stachelige Pflanze . . . Hchst. | 1 | 50 | — | — |
| 9. microphylla, *Lam.*, kleinblättrige K., VII . . . | 1 | — | — | — |
| T. 11. **pygmaea arenaria**, *Fisch.* (gracilis, *Hrt.*) . . . Hochst. ℳ 1,25 bis | 1 | 50 | — | — |
| 12. — mollis, *Bess.* (C. frutescens mollis, *D. C.*) Weichhaarige Zw.-K.; Hochst. ℳ 1 bis | 1 | 50 | — | — |
| 13. Redowskii, *D. C.*, Redowski's K., m. langgestielten Blüthen . . . 1 bis | 1 | 50 | — | — |
| 14. spinosissima (Robinia) *Laxm.* (C. spinosa, *D. C.*) Dornige K.; . . . 1 bis | 1 | 50 | — | — |
| 15. tragacanthoides (Robin) *Pall.*; Traganthartige K., stachelig, 1 Meter hoch | 1 | — | — | — |
| **Carpinus**, *L.*, **Weissbuche** (Hainbuche); s. auch Ostrya | | | | |
| 2. Betulus, *L.*, Gemeine W.; sehr starke Pyramiden . . . 3—4m. hoch | 1 | 50 | 13 | — |
| do. do. . . . 2—3m. „ | — | 75 | 6½ | — |
| do. . . . 1½m „ | — | 50 | 4 | — |
| 3. — Carpinizza, *Kit.*, Karpinizza-W. . . . 1 bis | 2 | — | — | — |
| 9. — fastigiata, *Hrt.*, Pyramiden W.; . . . | 1 | 50 | — | — |
| b. 4. — fol. arg. var., *Hrt.*, Weissbuntblättrige W. . . . | 1 | — | — | — |
| 5. — fol. purpureis, *Hrt.*, Purpurröthliche W. . . . 1 bis | 2 | — | — | — |
| 4. — **quercifolia**, *Desf.* (C. B. fol. incisis, *Desf.*); Eichenblättrige W.; zierlich . . . 1 bis | 1 | 50 | 9 | — |
| T. 7. — **pendula**, *Hrt.*, Trauer-W.; . . . 1 bis | 2 | — | — | — |

| | pr. St. ℳ ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| **Carya**, *Nutt.*, **Hickory**; werden alle ziemlich hoch, machen grade Stämme u. haben schön gefiedertes Laub. | | | |
| 3. amara (Jugl.) *Mill.*, Bitterer H. .......... 0,75 bis | 1 25 | — | — |
| 9. tomentosa *Nutt.* (Jugl. alba, *Mill.*) Vexir-H.; .......... 0,30m. h. | — 75 | — | — |
| * **Castanea**, *Mill.*, **Essbare Kastanie** (Marone) | | | |
| 4. vesca, *Gärtn.* (C. sativa, *Mill.*) Aechte Kastanie .... Starke Hochst. | 4 — | — | — |
| * **Catalpa** *Scop.*, **Trompetenbaum**: | | | |
| 5. Bungei, *C. A. Mey*, Bunge's T.; gedrungener als № 3, sonst sehr ähnlich | — 75 | 6 | — |
| 3. Kämpferi, *S. et Z.*, Japanischer T., bleibt niedriger als № 1, blüht schon als 1 Meter hohe Pflanze .......... | — 60 | 5 | — |
| 2. Kämpferi nana, *Hrt.* (C. Wallichii, *Hrt.*), Zwerg-T., .......... | 1 — | — | — |
| 1. **syringaefolia**, *Sims.* (C. bignonioïdes, *Walt.*); herrliche grossblättrige Dekorationspflanze, vorzüglich schön, wenn sie im August mit ihren grossen rosskastanienähnlichen Blüthendolden geziert ist .......... | — 50 | 4 | — |
| 6. — argenteo var., *Hrt*, weissbunt .......... | 1 50 | — | — |
| 4. — **aurea**, *Hrt.*; mit goldgelben Blättern **neu**! .......... | 2 — | — | — |
| * **Ceanothus**; *L.*, **Säckelblume**; alle blühen im Sommer sehr reich, wunderschöne Bouquetblume! | | | |
| 1. **americanus**, *L.*, Amerikanische, VII blüht silbergrau .......... | — 30 | 2 | * |
| 10. Gloire de Versailles; blau .......... | 1 — | — | — |
| 3. hybridus. *H.*, Bastard-S.; hat kleinere Blumensträusse, aber reichblühend | — 50 | — | — |
| 6. roseus; rosa blühend, schön; .......... | — 50 | — | — |
| **Celastrus**, *L.*, **Baummörder**; | | | |
| §. 1. scandens, *L.*, Kletternder B.; Stark wuchernde Schlingpflanze .... 2m. h. | 1 — | 9 | — |
| * **Celtis**, *L.*; **Zürgelstrauch**; gedeihen am Besten halbschattig. | | | |
| 2. australis, *L*, Südlicher Z. V. IV. .......... | — 50 | 4 | * |
| 4. occidentalis, *L.*, Nordamerikanischer Z.; V. .......... | — 60 | 5 | — |
| **Cephalanthus**, *L.*, **Kopfblume**. | | | |
| 1. occidentalis, *L.*, Abendländische .......... | — 60 | — | — |
| **Cerasus** s. Prunus. | | | |
| * **Cercis**, *L.*, **Judasbaum** (Judaslinde). | | | |
| 2. Siliquastrum, *L.*, Aechter J.; in der Jugend zärtlich, VI, VII. klein | — 50 | — | — |
| **Chaenomeles** s. Cydonia japonica. | | | |
| **Chamaecerasus** s. Lonicera. | | | |
| * **Chionanthus**, *L.*, **Schneeflocke**; | | | |
| * 1. virginica, *L.*, Virginische S.; mit grossen weissen Blüthenrispen im Juni, muss jung bedeckt werden, VII, sehr zu empfehlen .......... | 1 — | — | — |
| **Cladrastis**. *Raf.*, **Gelbholz** (Virgilie); | | | |
| 2. lutea (Virgilia) *Mchx.*, Aechtes G.; VI. zierlich belaubt... ℳ 0,75— | 2 50 | 6—22 | — |
| §* **Clematis**, *L.*, **Waldrebe**; Sortiment v. 12 Sorten à 1 St. .......... ℳ 10 | | | |
| — — grossblumige im Rummel .......... | — 75 | 6½ | * |
| 6. fusca, *Turcz.*; eigenthümliche graubraune Färbung, glockenförmig; Staude neu! | 1 25 | 10 | * |
| 29. integrifolia, *L.*, dunkel veilchenblau, glockenförmig, Staude .......... | — 50 | 4 | * |
| 3. **Vitalba**, *L.*, Gemeine W.; weiss blühend mit federartigen Samen 0,50 bis | — 75 | 4—6 | * |
| 4 **Viticella**, *L.*, Italienische W.; blau sehr reichblühend, glockenförmig .......... 0,50 bis | — 75 | 4—6 | — |
| 5. — rubra; röthlich .......... | — 75 | — | — |

Nachstehendes Sortiment dieses schönen Schlingstrauches ist mit vieler Sorgfalt gesammelt und enthält die besten mannichfaltigsten und neuen Varietäten. Die angeführten Preise gelten für 1—2jähr. Veredlungen. Stärkere Pflanzen in einigen Sorten 0,50—1 ℳ theurer.

| **Clematis**. | pr. Stück ℳ ₰ |
|---|---|
| 131. Albert Victor; lavendelblau mit hellerem Rande .......... | 1 — |
| 145. Alexandra; hell röthlich violett ... | 1 50 |
| 14. apiifolia.; wächst sehr üppig w.... | 1 — |
| 15. **Aureliani**; porzelanblau .......... | 1 50 |
| 123. Bangholm Beauty .......... | 1 25 |
| 124. — Belle .......... | 1 25 |
| 101. **Bélisaire**; hell viol. m. breiten hellen Bändern; sehr hübsch. | 1 — |
| 16. brasiliensis, helllila m. weissem Band, oft gefüllt .......... | 1 — |
| 18. coerulea odorata; kl. bl., wohlriechend .......... | — 75 |
| 139. Duchess of Edinburgh; rein weiss, gef. | 2 — |
| 108. Duke of Buccleugh; malvenblau, im Verblühen blass lila, runde Bl. | 1 50 |
| 125. **Duke of Edinburgh**; reich dkl. purp. viol., eine der prächtigsten blauen .......... | 1 25 |

| | pr. Stück M. | ₰ |
|---|---|---|
| **Clematis.** | | |
| 154. Duke of Norfolk; tief malvenfarbig mit breiten hellen Bändern; **neu**! | 2 | 50 |
| 153. Edith Jackman; weiss m. delikat malvenfarben; grblum.; **neu**! | 2 | 50 |
| 115. Fair Rosamond; rosaweiss | 1 | — |
| 86. **Floribunda**; weiss m. blass lilarosa Bändern; s. grblum. | 1 | — |
| 19. florida; h. viol., marmorirt | 1 | — |
| 102. — pallida; milchweiss, Ränder leicht viol. | 1 | — |
| 21. Fortunei; w., gef. | — | 75 |
| 22. **Frankofurtensis**; d. viol., reichblhd. | — | 75 |
| 23. fulgens; dkl. viol., 12—14cm. breit | — | 75 |
| 24. Gloire de St. Julien.; w. | 1 | 50 |
| 25. **grandiflora mutabilis**; w., gr. | 1 | — |
| 26. Hendersoni; bl. kl., glockenförm. | — | 60 |
| 69. Henryi; rahmweiss, grbl. | 2 | — |
| 27. Impératrice Eugénie | 1 | — |
| 28. imperialis | — | 75 |
| 30. intermedia; bl., nicht rankend | — | 60 |
| 31. **Jackmanni**; dkl. viol. 11—12cm. | 1 | — |
| 32. John Gould Veitch, h. lila | 1 | 25 |
| 99. Lady Londesborough; silberig viol., hübsch | 1 | — |
| 138. — Stratford de Redcliffe; dkl. lila | 1 | — |
| 33. lanuginosa; hellblaugrau | 1 | — |
| 34. — candida; w. m. lila Anhauch | 1 | 25 |
| 35. — nivea; w. m. lila Anhauch | 1 | 25 |
| 97. lanuginosa nivea pl.; gef. w. | 1 | 50 |
| 74. **Lawsoniana**; purp. rosa, dunkler geadert; s. gr. | 2 | — |
| 75. Lilacina pl. h. lila, mgr., s. gef. | 1 | 25 |
| 118. Lord Derby; hell lavendelbl. | 1 | 25 |
| 109. — Henry Lennox; hübsch hellbl. m. milchweissen Mittelbändern | 1 | — |
| 105. — Londesborough; tief bläul. lila m. kupferig purp. Bändern | 1 | — |
| 119. Lord Mayo; dkl. rosalila | 1 | 25 |
| 76. — Napier; dkl. malvenrosa m. rth. | 1 | — |
| 77. Lucie Lemoine; rein w., stark gef. | 1 | 50 |
| 78. **Mad Granger**; leuchtend purpur | 2 | — |
| 36. Mad. Isidore Salles | 1 | — |
| 79. **Madame van Houtte**; w. in bläulich übergehend, gr. | 1 | 50 |
| 80. **Magnifica**; reich purp. m. carmoisin schattirt | 1 | — |
| 141. Maiden's blush; bläul. weiss | 1 | 50 |
| 81. **Marie Lefèvre**; malvenrosa, gr. | 1 | 50 |
| 82. **Miss Bateman**; milchw. gr. | 1 | — |
| 126. **Mistress G. M. Innes**; hell viol., blasser werdend, dicht gef. in 4 Reihen Petalen, 10—12cm. breit; **neu**! | 2 | 50 |

| | pr. Stück M. | ₰ |
|---|---|---|
| 142. Mistress Hope; seidenartig malvenfarben, dunkler bandirt, grblum. | 1 | 50 |
| 106. — Howard Vyse; weiss, an den Rändern lila gezeichnet | 1 | 50 |
| 127. — Melville; weiss, m. schwach rosa | 1 | 25 |
| 130. — S. C. Baker; lilaweiss m. weissen Bändern | 1 | — |
| 107. — Villiers Lister; weissl. rosa | 1 | — |
| 37. montana *Ham.*; w., ähnl. Vitalba | — | 60 |
| 104. — grandiflora; w. | — | 75 |
| 84. **Nigricans**; dklviol. | 1 | 50 |
| 111. paniculata (Vitalba japonica), weiss, wohlriechend, blüht im September | 1 | — |
| 38. patens amethystina plena | — | 75 |
| 39. — candidissima, plena; reinw. | — | 75 |
| 40. — Clara; hell lila | 1 | 25 |
| 41. — Helena; weiss | — | 75 |
| 42. — insignis; violett | — | 75 |
| 43. — Louisa fl. pleno, rahmweiss | 1 | — |
| 44. — Marie; purp. blau | — | 75 |
| 45. — monstrosa, rein w. hlb. gef. | — | 75 |
| 46. — Sophia; hell violett | — | 75 |
| 47. — — fl. pleno; h. viol., gef. | 1 | — |
| 48. — violacea | — | 75 |
| 49. perfecta; weiss | 1 | — |
| 50. **Prince of Wales**; dkl. viol., 11—12cm. | 1 | 25 |
| 89. Princess Mary; hrosa m. w. Bändern | 1 | — |
| 155. Princess of Wales; dkl. bläul. malvenfarben m. reichem Seidenglanz | 2 | 50 |
| 87. **Queen Guinevere**; hell viol. blau | 1 | — |
| 51. reginae; dkl. viol. 9—10cm. breit | 1 | — |
| 114. Rendatleri; rein weiss | 1 | — |
| 52. **Rubella**; dkl. samtig roth-viol., herrliche runde Bl., s. reichblühend | 1 | — |
| 66. **rubro-violacea**; viol., 12—13cm. | 1 | — |
| 91. **Sensation**; h. weissl. lila, 15—16cm. | 2 | 50 |
| 54. Splendida; dkl. kastanienpurp. | 1 | — |
| 55. Standishi; dklbl. | — | 75 |
| 92. **Star of India**; röthlich pflaumenfarb. m. purpurbraunem Band, reichblühend | 1 | — |
| 132. Stella; leicht viol. m. deutlichen dkl. pflaumenrothen Mittelbändern | 1 | 25 |
| 122. The Queen; malvenlila, reichblühend | 1 | — |
| 128. Thomas Tennent; rein weiss, grblum. | 1 | 50 |
| 56. Van Houttei; weiss m. etwas violett | — | 75 |
| 57. **venosa**, röthl. purp., heller geadert, m. hellerem Bande, s. reichbl. | — | 75 |
| 133. Vesta; weiss, 8 Petalen | 1 | 50 |
| 63. **Viticella Modesta**; hell purp. viol., tiefer blau geadert, s. reichblühend | 1 | — |
| 64. — purpurea; ähnlich Jackmanni | 1 | — |

| | pr. Stück M. ₰ | 10 St. M. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| **Colutea**, *L.*, **Blasenstrauch.** | | | |
| 1. arborescens, *L.*, Baumartiger B.; blüht gelb, den ganzen Sommer hindurch, V. VI. | — 30 | 2½ | * |
| 8. — monstrosa, *Hrt.*, Monströser | — 75 | 6 | — |
| 4. istria, *Mill.* (C. Halepica, *Lam.*), Istrischer B.; m. braungelben Blüthen, VI | — 50 | — | — |
| 3. istria pygmaea; braungelb, niedrig | — 60 | — | — |
| 6. orientalis; bräunlich orange, heller als № 4 | — 50 | 4 | — |
| **Comptonia s. Myrica.** | | | |
| **Coriaria**, *L.*, **Gerberstrauch.** | | | |
| * 1. myrtifolia, *L.*, Myrthenblättriger | — 60 | 5 | — |
| **Corchorus** s. Kerria. | | | |
| **Cornus**, *L.*, **Hartriegel.** | | | |
| 11. alba, *L.*, (C. stolonifera, *Mchz.*), Weisser H.; V, Holz braunroth im Winter, Blüthe u. Beeren weiss | — 35 | 3 | * |
| b. 15. **alba fol. arg. marginatis**; Blätter weiss gerandet, constant und schön ... 0,75 bis | 1 50 | 6—13 | — |
| 2. Amomum, *Mill.* (C. coerulea, *Lam.*, C. fastigiata, *H.*), Bläulicher H., V, VI, stark | — 35 | 3 | * |
| 3. — sericea, *Hrt.*, Seidenhaariger H.; VI, VII | — 50 | — | — |
| 6. citrifolia, *Hrt.* (candidissima, *Mill.*) feinblättrig | — 60 | — | — |
| 8. **mascula**, *Dur.* (C. mas, *L.*), Kornelkirsche; blüht schon im März. V, VI. | — 40 | 3 | * |
| b. 14. **mascula fol. arg. marg.**; Blätter weiss gerandet, constant u. schön | 1 — | — | — |
| 9. sanguinea, *L.*, Gemeiner H.; VI, V | — 30 | 2½ | * |
| b. 10. „ fol. var., *H.*, Buntblättriger gem. H.; VI | — 60 | 5 | — |
| 12. **sibirica**, *Hrt.*, (C. tatarica, *Mill.*), Sibirischer H.; mit korallenrothem Holze, sehr zierend, VII | — 60 | 5 | — |
| **Coronilla** Emerus, *L.*, Scorpions-**Kronenwicke** | — 40 | — | — |
| * **Corylopsis** spicata, **Scheinhasel**; gelbblühend | 1 25 | — | — |
| **Corylus**, *L.*, **Hasel**; (s. auch Obst) | | | |
| 500. americana, *Walt.*, Amerikanische H.; VI, wird nur 2—2,50m. hoch | — 75 | 6 | — |
| 501. Avellana, *L.*, Gemeine H.; V, IV | — 40 | 3½ | * |
| b. 502. „ **atropurpurea**, *H.*, Blut-H.; Blätter dunkelpurpur, sehr schön | — 80 | 7 | — |
| b. 503. „ **aurea**, *H.*, Goldblättrige H.; noch neu! | 2 50 | — | — |
| 504. „ **laciniata**, *H.*, Geschlitzte H.; sehr zierend | — 75 | 6 | — |
| T. 505. „ pendula, *H.*, Trauer-H.; noch neu! ... 1,50 bis | 2 — | — | — |
| 506. „ **quercifolia**, *Hrt.*, Eichenblättrige H. | — 75 | — | — |
| P. 508. **Colurna**, L., Byzantinische Baum-H.; V, IV, stets baumartig u. pyramidal | — 75 | 6 | — |
| 511. serotina, *H.*; VI, VII | 1 — | — | — |
| **Cotinus**, *Scop.*, **Perrückenstrauch**; | | | |
| 1. **Coccygea**, *Scop.*, (Rhus Cotinus, *L.*), Aechter; die Früchte gleichen einer Perrücke, VI | — 50 | 4 | * |
| **Cotoneaster**, *Med.*, **Zwergmispel**; | | | |
| 10. borealis, *Hrt.*; Fr. korallenroth | — 75 | — | — |
| 2. lucida, *Schlecht.*; Blätter glänzend, Fr. schwarz | — 75 | 6 | — |
| i. * 3. microphylla, *Wall.*, Kleinblättrige Z.; VIII, Blüthen myrtenähnlich; Fr. roth | — 60 | — | — |
| 4. nigra, *Wahlb.* (C. laxiflora, *Jacqu. fil.*), Schwarzfrüchtige Z.; VII, VIII | — 50 | 4 | — |
| 12. nummularia, *F. et M.*; Fr. roth | — 75 | — | — |
| 6. Fontanesii *Spach.* (Mesp. raceuiflora, *Desf.*), Doldentraubige Z. | — 75 | — | — |
| * h. i. 7. **Simmondsii**, *H.*, Simmonds Z.; VI, sehr hübsch, m. korallenrothen Beeren bietet uns Ersatz für die sehr empfindliche Mespilus pyracantha | — 50 | 4 | — |
| 8. sinensis, *Hrt. gall.*; Fr. schwarz | — 75 | — | — |
| 9. tomentosa (Mesp.), *Ait.*; Belaubung graugrün, Fr. roth | — 75 | — | — |
| **Crataegus**, *L.*, **Dorn**; 10 Sorten à 1 St. M. 10, 10 Sorten à 1 St. M. 5. | | | |
| a) Scheinmispeln, baumartig, grossblumig; | | | |
| 20. grandiflora, *Sm.* (Cr. stipulosa, *Hrt.*) Grossblumige Scheinm. ... 0,60 bis | 1 50 | 5—13 | — |
| 21. leucophloeos *Mnch.* (Cr. pirifolia, *Ait.*), Urnenfrüchtige Sch.; Fr. orange ... 0,60 bis | 1 50 | 5—10 | — |
| b) **Beerenmispeln** (Microcarpae), Sträucher m. sehr vielen gelb-rothen Früchten: | | | |
| 23. **populifolia**, *Walt.* (cordata. Mill.); Fr. korallenroth ... 0,60 bis | 1 — | 5—8 | — |
| c) **Dornmispeln** (Parvifoliae), niedrige Sträucher, sparrig, kleinblättrig, mit langen Dornen und grünlichen Früchten; | | | |
| 24. flava, *Ait.* (flexispina, *Mnch.*), Glatte Dornen | — 60 | 5 | — |
| 25. uniflora, *Mnch.* Kleinblättr. D.; merkwürdig krauser Strauch | — 75 | 6 | — |

| | p. St. ℳ ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| **Crataegus.** | | | |
| d) **Scharlachdorn** (Coccineae); starke Sträucher, Früchte roth u. gross | | | |
| 27. coccinea, *L.*, Gewöhnlicher Scharlachd. 0,50 bis | — 75 | 4—6 | * |
| 66. rotundifolia, *Mnch.* Rundblättriger Purpurdorn | — 60 | — | — |
| 29. purpurea, *Hrt.* (Cr. glandulosa, *Hrt.*) purpurfrüchtiger Sch.; sehr grossfrücht. | — 75 | 6 | — |
| c) **Hahnsporndorn** (Crus Galli), starke Sträucher mit grossen glänzenden Blättern und rothen Früchten, alle sehr schön: | | | |
| 33. Crus galli (Crat.) *L.*, (Crat. pyracanthifolia, *H.*), Gemeiner H. | — 50 | 4 | * |
| 28. **Douglasii** *Lindl.* (glandulosa, *Manch.* Crus galli ovalifolia, *Hrt.*); sehr schön belaubt, langdornig 0,60 bis | 1 — | 5—8 | — |
| 68. — **macracantha**, *Lodd.*; Dornen über 5cm. läng | — 60 | 5 | — |
| 37. **Fontanesiana**, *Steud*, badia, *Hrt.* = Bosciana, *Hrt.*); Fr. braunroth | — 60 | 5 | — |
| 69. linearis, *Hrt.*, schmalblättrig | — 60 | 5 | — |
| 38. **prunifolia**, *Poir.*, (Crat. Crus galli splendens, *Hrt.*), Pflaumenblättriger H. sehr schön in der Blüthe und in der Fruchtreife 0,50 bis | 1 50 | 4—18 | * |
| 39 **salicifolia** (Crat.) *Med.*, Weidenblättriger H.; Fr. braunroth 0,60 bis | 1 50 | 5 | — |
| (Die vorstehenden Arten gehören der Neuen, die nachfolgenden der Alten Welt an.) | | | |
| f) **Dunkelfrüchtiger Dorn** (Nigrae), Sträucher von graugrüner Belaubung und dunklen Früchten: | | | |
| 40. Celsiana, *H.*, Cels' Dorn; sparrig, schwarzfrüchtig. ℳ 0,60 bis | 1 50 | 5—18 | — |
| 41. melanocarpa (Crat.), *Bieb.*, Schwarzfrüchtiger Dorn; aus d. Kaukasus. | — 60 | — | — |
| 42. nigra (Crat.) *W. u. K.*, Ungarischer Schwarzdorn; die Blüthen verändern sich allmählig von weiss in dunkelroth, blüht früh 0,60 bis | 1 50 | 5—10 | — |
| 43. sanguinea (Crat.), *Pall.*, Blutdorn; *Sibirien* | — 50 | 4 | — |
| g) **Azarol-Dorn** (Azaroli), mit filzigen Blättern und kleinen Aepfeln ähnlichen grossen Früchten; | | | |
| 44. tanacetifolia, *Poir.*, Rainfarnblättriger D. 0,60 bis | 1 — | 5—8 | — |
| h) **Weissdorn** (Oxyacanthae) mit kleinen gelappten Blättern u. kleinen meist rothen Früchten: | | | |
| 45. brevispina, *H. C. L.*, Kurzdorniger W.; buschig, sehr stachelig | — 60 | 5 | — |
| 74. **Oxyacantha**, *L.*, Gemeiner **Weissdorn**. Da es ausserordentlich schwierig und für den Gärtner unwichtig ist, die beiden Species des Weissdorns — den 1 grifflichen (Cr. monogyna, Jacq.) u. den 2 grifflichen (Cr. Oxyacantha, L.) — u. ihre folgenden Abarten getrennt zu halten, so führen wir sie alle unter den gebräuchlichsten Namen auf (s. auch Heckenpflanzen.) | — 30 | 2½ | * |
| P. 47. — fastigiata, *Hrt*, Pyramidaler W.; 0,60 bis | 1 50 | 5—13 | — |
| 72. — **filicifolia**, Hrt.; farrnblättrig | — 60 | 5 | — |
| 48. — **fl. albo pl.**, Gefüllter W.; 5,60 bis | 1 50 | 5—13 | * |
| 49. — **fl. kermesino pl. (Paul's New Scarlet), Dunkelroth gefüllt.** W.; prachtvoll in der Blüthe, starke Pyramiden | — 60 | 5 | * |
| — — — Hochst. 1 bis | 2 — | 9—18 | * |
| pr. 1000 St. 1000 ℳ | | | |
| Der allgemein bekannte gefüllte Rothdorn sieht gegen diesen neueren rosa aus und bleibt im Effect weit hinter ihm zurück. Als Alleebaum, abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überwältigender Wirkung. | | | |
| 57. — fl. puniceo, *Hrt.*, einfach dunkelroth. | — 75 | — | — |
| 50. — **fl. rubro pl.**; (Gumperi bicolor); dunkelrosa gefüllt 0,60 bis | 1 50 | 5—13 | * |
| T. b. 51. — **fol. arg. var.**; sehr schön weissbunt 0,60 bis | 1 50 | 5—13 | — |
| T. 52. — horrida *Carr.*, Abschreckender W.; ausserordentlich stachelig, merkwürdig | — 75 | — | — |
| 65. — pectinata, Hrt.; kammblättrig | — 60 | 5 | — |
| T. 53. — **pendula** (reginae, *Loud.*); sehr zierlich hängend; mit Früchten, auch blühend schön 0,75 bis | 2 — | — | — |
| T. 65. — — **fl. roseo**; einfach rosa, hängend | — 60 | 5 | — |
| T. 67. coccinea pendula, *Hrt.*; hängend mit einfach rothen Blüthen | — 75 | — | — |
| 54. trigyna, Dreistempeliger W. | — 75 | — | — |
| **Cydonia**, *Tourn.*, **Quitte.** | | | |
| 120. **japonica**, *Pers.*, (Pirus japonica. *Thunb*), Japanische Qu.; blüht feuerroth im April, oft auch im Herbst. Einer der schönsten Blüthensträucher. VI. | — 60 | 5 | * |

| | p. St. ℳ | ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Cydonia.** | | | | |
| 125. **japonica** candida; weiss blühend | — | 75 | — | — |
| 124. — cardinalis; feurig roth | — | 75 | — | — |
| 121. — fl. carneo; fleischfarbig | — | 75 | — | — |
| 122. — fl. rubro; dunkelroth | — | 75 | — | — |
| 129. — gigantea | — | 75 | — | — |
| 123. — macrocarpa; grossfrüchtig | — | 75 | — | — |
| 104. — Mallardii; rosenroth, gebändert | — | 75 | — | — |
| 105. — Moerloosii; weiss mit carmin getuscht | — | 75 | — | — |
| 127. — nivea intus kermesina; innen dklrosa gefleckt, hängend | — | 75 | — | — |
| 106. — umbilicata; rosa | — | 60 | — | — |
| 115. **vulgaris**, *Pers.*, Gemeine Qu.; Frucht sehr wohlriechend | — | 40 | 3 | * |
| P. 116. — pyramidalis, *Hrt.*, pyramidal wachsend | — | 75 | 6 | — |
| **Cytisus**, *L.*, **Gaisklee**; (s. auch Laburnum). | | | | |
| 2. elongatus, *W. und K.*, Ruthenförmiger G.; die Zweige der ganzen Länge nach mit Blüthen besetzt, VII | — | 35 | 3 | * |
| 3. hirsutus, *L.* (C. triflorus, *Lam.*), Rauher; VII | — | 35 | 3 | * |
| 4. purpureus, *Scop.*, Purpurblüthiger G.; halbstämmig veredelt. ℳ 1,50 bis | 2 | — | — | — |
| **Daphne**, *L.*, **Seidelbast.** | | | | |
| 1. Laureola, *L.*, Lorbeer-S.; VII | — | 50 | — | — |
| 2. Mezereum, *L.*, Gemeiner S.; VII—VIII | — | 50 | — | — |
| △ **Desmodium**, (neue japanesische Einführung, sehr zierlich) | | | | |
| △ 1. racemosum, *Hrt.* (penduliflorum, *Hrt*); wird 2m hoch, friert zurück, blüht aber dennoch im September sehr voll mit rosa Schmetterlingsblumen | — | 50 | — | — |
| △ 2. Dilleni, *Hrt.*; bleibt niedriger und blüht früher | — | 40 | 8 | * |
| * **Deutzia**, *Thunb.* **Deutzie**; alle blühen weiss oder weisslich | | | | |
| 3. crenata, *S. u Z.*, Gekerbte D.; die bekannteste, VI, VII | — | 40 | 3 | * |
| 5. **crenata fl. pl.**, weiss gefüllt, aussen lila-rosa, sehr vollblühend, die schönste von allen Deutzien; VI, VII | — | 40 | 3 | * |
| b. 11. — foliis albo punctatis, *Hrt.*, Blätter weiss punktirt | — | 60 | 5 | — |
| 6. Fortunei. *Hrt.*, Fortune's D.; rein weiss, VII | — | 50 | 4 | — |
| 4. — fl. pl., *Hrt.* (cren. candidissima pl., *Hrt.*); gefüllt, rein weiss | — | 50 | 4 | * |
| * 7. **gracilis**, *S. u. Z.*, zierliche D; VIII | — | 30 | 2½ | * |
| — **starke Büsche zum Treiben.** p. 100 St. ℳ 20. | | | | |
| **Diervilla**, *Mill.*, **Diervilla**; (siehe auch Weigela). | | | | |
| 1. canadensis, *Willd.* (D. Lonicera, *Mill.*), Kanadische D.; VII, gelbblühend | — | 40 | 3 | — |
| 2. splendens) *Carr.* (sessilifol., *Schuttlew.*), Glänzende D.; VII, m. bräunlichen, glänzenden Blättern | — | 40 | 3 | — |
| **Diospyros**, *L.*, **Lotuspflaume** (Dattelpfl.) | | | | |
| △ 1. virginiana *L.*, Virginische L.; im Vaterlande essbar | — | 75 | 6 | — |
| **Elaeagnus**, *L.*, **Oelweide** (Oleaster); | | | | |
| b. 1. **argentea**, *Prsh.* (E. macrophylla, *Hrt.*) Shepherdia argentea, *H.*),Silber-Oe; VII Blätter auf beiden Seiten von metallischem Silberglanz | — | 60 | — | — |
| b. 2. **angustifolia**, *L.* (E. argentea, *Hrt.*), Gemeine Oe.; Blätter unten grauweiss, junges Holz silbergrau, VI | — | 40 | 3 | * |
| — » » » » 1½—2m. hoch. | — | 60 | 5 | — |
| 5. angustifolia hortensis. *Hrt.*; mehr silberfarben als Nr. 2 | — | 60 | — | — |
| 6. — latifolia, *Hrt. Britz.*; grossblättrig | — | 75 | — | — |
| 7. — pyramidalis, *Hrt. Britz.*; | — | 75 | — | — |
| 8. -- rotundifolia, *Hrt. Britz.*; | — | 75 | — | — |
| * 10. edulis, *Hrt.*, Essbare Oe. | — | 60 | — | — |
| 4. orientalis, *L.*, Morgenländische Oe.; Blätter gelblich grün | — | 60 | 5 | — |
| **Evonymus**, *L*, **Spindelbaum** (Pfaffenhütchen); | | | | |
| 1. americana, *L.*, Amerikanischer S.; grossblättr., dunkelgrün, VII | — | 75 | — | — |
| 2. **angustifolia**, *Prsh.*, **fol. purpureis.**, Schmalblättr. mit brauner Herbstfärbung | — | 75 | — | — |
| 4. **europaea**, *L.*, Europäischer S. VI., durch seine rothen Früchte sehr zierend, für grössere Gebüsch-Partien geeignet, doch nicht unmittelbar an den Wegen ... 0,30 bis | — | 60 | 2½—5 | * |
| 3. europaea atropurpurea, *Hrt.*, Purpurfrüchtiger Sp. | — | 50 | 4 | — |
| h. 5. — fol. var., Weissbuntblättriger S.; ... stark | — | 75 | 6 | — |
| 6. — fr. albo, Hrt.; weissfrüchtig. Hochst. | 1 | 50 | — | — |
| 7. — fr. coccineo, *Hrt.*, Scharlachfrüchtiger Sp. | — | 50 | 4 | — |
| 10. **Maackii**, *Hrt.*, Maack's S.; m. glänzenden Blättern, hübsch | — | 60 | 5 | — |
| — ... hübsche Stämme | 1 | 50 | 13 | — |
| 11. **nana**, *Bieb.* (E. nana rosmarinifol. *Hrt.*)Zwerg-S.; VIII, wird nur fusshoch | — | 30 | 2½ | * |
| — ... 1—1,20m. hohe veredelte Stämme. 1 bis | 1 | 75 | 9—16 | — |

| | p. St. M. | p. St. ₰ | 10 St. M. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Evonymus.** | | | | |
| b. * 12. radicans fol. arg. marg., *Hrt.* hübsch ........ hübsch | — | 50 | — | — |
| i. * 13. — viridis, *Hrt.*, Grüner wurzelnder S.; kriechend........ | — | 35 | 3 | * |
| 14. verrucosa, *Scop.*, Warziger S.; Zweige mit braunen Warzen besetzt, schön dunkel belaubt ........ 0,75 bis | 1 | 25 | — | — |
| **Fagus**, *L*, **Buche** (Rothbuche) | | | | |
| 3. sylvatica, *L.*, Gemeine B., Rothbuche; I, II ........ | — | 60 | — | — |
| h. 5. — **atropurpurea**, *Hrt.*, Blut-Buche; purpurblättrig ........ | 1 | — | 9 | — |
| do. **schön Pyramiden** v. 1—3,50m. hoch. 2 bis | 10 | — | 18—90 | — |
| 13. — heterophylla, Hrt.; ........ | 1 | 50 | — | — |
| T. 15. — pendula, *Hrt*, Trauer-R.-B. ........ starke Hochst. | 5 | — | — | — |
| h. 20. — purpurea latifolia, *Hrt.* ........ 2,50— | 5 | — | — | — |
| **Fontanesia**, *Labill.*, **Fontanesie.** | | | | |
| 1. Fortunei, *Hrt.*; ein äusserst zierlicher dem Liguster ähnlicher Strauch | — | 60 | — | — |
| 2 phillyreoides, Labill. ........ klein | — | 50 | — | — |
| **Forsythia**, *Lind.* **Forsythie**; blühen schon Ende März, gelb. | | | | |
| 1. Fortunei, *Lindl.*, Fortune's F.; von kräftigem, aufrechtem Wuchse, VI. | — | 40 | 3½ | * |
| 4. Sieboldii, *Hrt.*; scheint noch stärker zu hängen als No. 2 ........ | — | 50 | — | — |
| * 2. suspensa (Syringa) *Thunb.*, Ueberhängende F.; stark hängend, VI zum Bekleiden von Mauern geeignet ........ | — | 40 | 3½ | |
| * 3. viridissima, *Lindl.* Dunkelgrüne F.; schön, VII ........ | — | 40 | 3½ | — |
| **Fraxinus**, *L.*, **Esche** ........ 12 Sorten à 1 St. 10 *M.* | | | | |
| Die Eschen zeigen eine ausserordentliche Mannichfaltigkeit in der Belaubung, im Wuchs und in der Herbstfärbung der Blätter, sind landschaftlich sehr wirkungsvoll und begnügen sich selbst mit ärmeren Bodenarten. | | | | |
| a) **Eschen der alten Welt.** | | | | |
| 22. argentea, *Hrt.* eine sehr schöne helllaubige E., wahrscheinlich Abart von excelsior ........ 0,80 bis | 2 | — | — | — |
| 1. excelsior, *L.*, Gemeine E.; I. ca. 2½—3m. h. (s. auch Alleebäume) ........ | — | 50 | 4 | * |
| 2. — asplenifolia, *C. Koch* (F. linearis, *Hrt.*), Farrnblättrige E.; zierlich | — | 80 | 7 | — |
| 3. — **aurea**, *Willd.*, Gold-E; junges Holz goldgelb ... *M.* 0,80 bis | 2 | 25 | 7—20 | — |
| h 5. — **concavaefolia fol. var.** *Hrt.*, Bunte hohlblättrige E.; Blätter fast weiss im 2tem Triebe ........ *M.* 0,80 bis | 1 | 50 | 7—13 | — |
| 6. — **crispa**, *Loud.*, Krausblättrige E.; Blätter schwarzgrün u. sehr kraus, von niedrigem langsamen Wuchse .... *M.* 0,80 bis | 2 | — | 7—18 | — |
| 27. — cucullata, *Hrt.*, Hohlblättrige E.; Blätter nahe beisammen stehend, kräftiger als Nr. 6 ........ *M.* 0,80 bis | 2 | — | 7—18 | — |
| 25. — **elegantissima**, *Hrt.*; Blätter sehr zierlich getheilt, ausserordentlich schön ........ *M.* 0,80 bis | 1 | 50 | 7—13 | — |
| 8. — heterophylla, *C. Koch* (F. monophylla, *H.*); hat meist ungefiederte Blätter ........ *M.* 0,80 bis | 2 | — | 7—18 | — |
| T. 9. — **pendula**, *Ait*, **Trauer-E.**; Hochtämme m. 2 jährigen Kronen. *M.* 1,50 bis | 3 | — | 13—25 | * |
| 10. — **polemoniifolia**, (F. polem., *Poir.*) **Kugel-Esche**; besonders werthvoll für nördliche Gegenden, wo die Kugel-Akazie nicht gedeiht ........ | — | 80 | 7 | — |
| — — ........ Hochst. | 2 | — | 18 | — |
| 11. — simplicifolia laciniata, *A. M.*, Einfachblättrige geschlitzte; sehr eigenthümlich ........ *M.* 0,80 bis | 2 | — | 7 | — |
| P. 28. — spectabilis, *Hrt.*; im Wuchs ähnlich der italien. Pappel; doch ist das Holz oft merkwürdig dick, 2—3 mal so stark wie die Unterlage ........ *M.* 0,80 bis | 2 | — | 7—18 | — |
| * 13. lentiscifolia, *Desf.* (parvifolia, *Lam.* potamophila, *Rgl.*), Wickenblättrige E.; ........ *M.* 0,60 bis | 1 | 25 | 5—11 | — |
| T. 14. — **pendula** *Arb. Musc.* (parvifolia pendula, *Hrt.*, eine sehr fein belaubte und stark hängende Trauer-E. ........ *M.* 1 bis | 2 | 50 | 8—22 | — |
| 17. mandschurica, *Rupr.*; Blätter grösser u. gelblicher als bei excelsior .... | — | 60 | 5 | * |
| 12. oxyphylla, *Bieb.* (oxycarpa, *Willd.*), Spitzfrüchtige E; in allen Theilen kleiner als »excelsior« ........ | — | 60 | 5 | * |

| | p. St. M ₰ | 10 St. M | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| b) Amerikanisch-japanische Eschen. | | | |
| mit grossen Blättern und glänzendem Laube. | | | |
| 15. **alba**, *Marsh.* (= americana, *L.*, = pubescens, Hrt. = rotundifolia? Hrt.), Weisse Esche; ein grossblättriger herrlicher hochwachsender Baum mit grauer Rinde ... M 0,60 bis | 2 50 | 5—22 | * |
| 16. americana, *Willd.* Blätter oben dklgrün, unten graugrün ... | — 80 | 7 | — |
| 21. arbutifolia, *H. S.* (= pennsylvanica latifolia, *C Koch.*); Blätter auf der Unterseite stark graufilzig ... M 0,80 bis | 2 — | 7 | — |
| b. 36. **aucubaefolia**, *Hrt*; hübsch gelbbunt ... | 1 — | — | — |
| 26. Boscii, *Hrt.*; frisch grün belaubt, ähnlich № 16 ... | 1 — | — | — |
| 31. juglandifolia, *Lam.*, Wallnussblättrige E.; von kräftigem Wuchs und freudig grüner Belaubung, ähnlich der F. alba ... M 0,80 bis | 2 — | — | — |
| 18. **mixta**, *Hrt.*; feinbelaubt, starkwüchsiger als parvifolia, Holz dunkelbraun | — 80 | 7 | — |
| 33. quadrangulata, *Mchx.*, Blau-E. junge Zweige schwach vierkantig ... | — 60 | — | — |
| 34. sambucifolia, *Lam.* (= nigra, *Marsh.*), Schwarz-E. von den nordamerikanischen Arten am meisten ähnlich unserer einheimischen E., wird aber nicht so hoch ... | — 60 | 5 | — |
| 19. — crispa, *Lodd.* nigra crispa, *Hrt.*), Krause Schwarz-E.; dunkelgrün, krausblättrig, wird nicht hoch ... | 1 — | — | — |
| c) Ornus, Manna-Esche (Blüthen-Esche.) | | | |
| 23. Ornus, *L.*, Gemeine Manna-Esche, schön blühend, IV, V ... | — 60 | 5 | — |
| * 32. — rotundifolia, *Hrt.*, Rundblättrige Manna-E.; blüht vorzugsweise reich ... | 1 — | — | — |
| **Genista** tinctoria, *L.*, **Färbeginster** ... | — 25 | 2 | * |
| **Gleditschia**, *Clayt.* **Gleditschie** (Christusdorn). | | | |
| 1. ferox, *Desf.*, (? Gl. sinensis, *Lam.*); Wilddornige Gl. ... M 0,80 bis | 1 50 | 7—13 | — |
| 3. longispina, *Hrt.*, Langstachelige Gl ... M 0,80 bis | 1 50 | 7 | — |
| 4. **macracantha**, *Hrt.*; oft mit 8—10cm. langen Stacheln ... M 0,80 bis | 1 50 | 7—13 | — |
| 2. monosperma, *Walt.* (Gl. inermis. *Mill.*), Einsamige Gl. ... | — 60 | 5 | — |
| T. 5. pendula, *Hrt.*, Trauer-G ... 0,80 bis | 1 50 | 7—13 | — |
| 6. **sinensis**, *Lam.* (G. horrida, *Willd.*). Chinesische Gl.; mit glänzendem Laube ... 0,80 bis | 1 25 | 7 | — |
| 7. sinensis nana, *Hrt.*; mit glänzendem Laube und hängendem Habitus ... | 1 — | 3 | — |
| 8. **triacanthos**, *L.*, (G. latisiliqua *Hrt.*) Dreidornige Gl. ... 2—2½m. h. | — 60 | 5 | * |
| 9. triacanthos inermis, *C. Koch* (G. tr. laevis, *Hrt.*) Unbewehrte dreidorn. Gl. | — 60 | 5 | — |
| Alle Gleditschien sind schöne Bäume mit lichter Krone u. hellgrüner Belaubung. | | | |
| **Gymnocladus**, *Lam.* **Geweihbaum** (Schusserbaum). | | | |
| 1. canadensis, *Lam.*, Aechter G.; IV, merkwürdiger Baum mit sehr langen doppelt gefiederten Blättern ... 1—2½m. h. M 1 bis | 2 50 | 9 | — |
| **Halimodendron**, *Fisch.*, **Salzstrauch**. | | | |
| 1. **argenteum** (Carag.) *Lam.*, Silbergrauer S.; Sehr hübscher grau belaubter Strauch mit hell violetten Schmetterlingsblüthen ... | — 60 | 5 | — |
| — ... Hochst. M 1 bis | 1 50 | 9—13 | * |
| **Hamamelis**, *L.*, **Zaubernuss**; | | | |
| 1. virginica, *L.* ... | — 60 | — | — |
| §* **Hedera**, *L.*, **Epheu** ... 8 Sorten à 1 St. 5 M | | | |
| 1. colchica, *C. Koch* (H. Roegneriana, *H.*), Kolchischer E. ... | — 75 | 6 | — |
| 2. Helix, *L.*, Gemeiner E. ... (12 St. starke Büsche 6—9 M) | — 60 | 5 | — |
| 15. Helix hibern. marmorata | — 75 | — | — |
| 17. — latimaculata | — 75 | 6 | — |
| 19. — marginata Collussi . | — 75 | — | — |
| 23. — palmata ... | — 75 | 6 | — |
| 24. — — aurea ... | — 75 | — | — |
| 29. — vitifolia ... | — 75 | — | — |

| | p. St. M ₰ | 10 St. M |
|---|---|---|
| 8. Helix canar. marmorata elegans ... | — 75 | 6 |
| 13. — **hibernica**, Schottischer grossblättriger; starke Büsche; 2m. hoch ... | — 75 | — |
| — ganz stark ... | 1 — | 9 |

Vorstehende Epheu-Arten eignen sich zum Begrünen von Säulen, Wänden etc. ganz vorzüglich.

| | p. St. M ₰ | 10 St. M | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| △ **Hibiscus** *L.*, **Festblume** (Eibisch). | | | |
| 2. palustris, *Hrt.*; mit grossen malvenartigen Blumen, friert ab, blüht aber doch im folgenden Herbste ... | — 75 | — | — |

| | p. St. *M.* ₰ | 10 St. *M.* | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| △ **Hibiscus.** | | | |
| 1. syriacus, *L.*, Syrische F., gedeiht bei uns besonders gut in geschützter Lage oder an grösseren Gewässern | — 50 | 4 | — |
| 4. — in den besten veredelten Sorten | — 75 | 7 | — |
| **Hippophaë** rhamnoïdes, *L.*, Gemeiner **Sanddorn**; VII ............ 1—2m. h. | — 45 | 3½ | * |
| **Hydrangea**, *L.*, **Hortensie**; | | | |
| * 5. nivea, *Mchx.* (H. radiata, *Walt.*); Blätter unterseits weissfilzig | — 60 | — | — |
| 9. **paniculata grandiflora**; weiss, sehr grossdoldig, herrliche Neuheit! *M.* 0,60 bis | 1 25 | — | — |
| **Hypericum**, *L.*, **Hartheu**; | | | |
| * 1. elatum, *Ait.* Hohes H.; VII, VIII, reich gelbblühend | — 30 | 2 | * |
| * 5. hircinum, *L.*, Bockkraut; Blüthen ockergelb | — 35 | 3 | * |
| **Iberis** sempervirens, *L.*, Immergrüne **Schleifenblume**; VIII, reichblühend, weiss | — 30 | 2½ | — |
| **Ilex**, *L.*, **Hülsen**, (Stechpalme): | | | |
| * 1. Aquifolium, *L.*, Gemeiner H. ........ 45—60cm. h. | — 75 | — | — |
| — ........ schöne Pyamiden mit Ballen *M.* 5 bis | 8 — | — | — |
| * **Indigofera** Dosua, *Ham.*; niedriger zierlicher Strauch mit rosa Blüthentrauben | — 40 | 3 | * |
| **Juglans**, *L.*, **Wallnuss**; s. auch Obst. | | | |
| 20. cinerea, *L.*, Oelnuss; aus dem Safte des Stammes wird Zucker gewonnen. II. | — 75 | — | — |
| 11. fruticosa, *H.*, Strauchartige W.; mit zierlicher Belaubung, VII | 2 — | — | — |
| 23. **nigra**, *L.*; Buttermuss; diese, wie »cinerea« gedeihen auf feuchten Plätzen u. besitzen eine reichgefiederte Belaubung, III ........ 2m. h. | — 75 | 6 | * |
| 24. nigra oblonga *Marsh.*, Buttermuss mit länglichen Nüssen | 1 50 | — | — |
| * 5. **regia laciniata**, Geschlitztblättrige W.; ausserordentlich zierend | 2 — | — | — |
| **Kalmia** latifolia; stark | 2 50 | — | — |
| **Kerria** *D. C.* **Kerrie** (Ranunkelstrauch); | | | |
| * 3. japonica (Rubus) *L.* (Corchorus japon. *Thbg.*), Japan. Kerrie | — 35 | 3 | — |
| 1. — **fl. pl.**, *Ert.*; gefüllt gelb, sehr hübsch | — 30 | 2½ | T * |
| b. △ 2. — fol. var., Weissbuntblättr. japan. K.; sehr hübsch | — 50 | 4 | — |
| 4. — ramulis aureo vittatis; mit gelbbunten Zweigen | — 50 | 4 | — |
| **Koelreuteria**, *Laxm.*, **Kölreuterie**; | | | |
| 1 paniculata, *Laxm.*, Rispenblüthige | — 50 | 4 | * |
| **Laburnum**, *L.*, **Goldregen.** (Bohnenbaum). | | | |
| 1. Adami, *Poir.*, Adam's G., Samenpflanzen | — 50 | — | — |
| 2. alpinum (Cytis.) *Mill.*, Alpen-G.; Wuchs compacter, Laub dunkler u. glänzender wie bei Nr. 4. | — 60 | 5 | — |
| 4. **vulgare**, *Gris.* (Cytis. Laburnum, *L.*,) Gemeiner G. IV—V | — 40 | 3 | — * |
| — starke 2½—3m. hohe Sträucher | — 70 | 6 | — |
| — starke Hochstämme ........ 1 bis | 1 50 | — | — |
| T. 6. — pendulum, Trauer-G. ........ Hochst. | 1 75 | — | — |
| **Laurocerasus** s. Prunus Laurocerasus. | | | |
| **Lembotropis**, *Gris*, **Aehrengaisklee**; | | | |
| 1. nigricans (Cytis.) *L.*, Gemeiner Ae.; mit dunklem Laube | — 40 | 3½ | — |
| 2. sessilifolius (Cytis.), *L.*, Spitzblättriger Ae. | — 40 | — | — |
| **Lespedeza**, *Mchx.* **Lespedeze.** | | | |
| 1. bicolor, *Turcz.*, Zweifarbige L.; esparsettähnliche Pflanze aus dem Amurgebiet, sehr schön blühend | — 50 | — | — |
| **Ligustrum** *L.*, **Liguster** (Rainweide): | | | |
| 1. **amurense** (Syringa) *Rupr.*, Amur-L.; glänzendbelaubt | — 40 | 3 | * |
| 4. atrovirens, *Hrt.*; dunkel belaubt | — 50 | 4 | — |
| * 16. chinense nanum. *Hrt.*; niedrige hübsche Art mit glänzenden Blättern | — 50 | 4 | — |
| * 2. **ovalifolium**, *Hrt.*; (-lucidum, *Ait.*- japonicum, *Hrt.*); grossblättr., schön, verliert die Blätter erst bei 6—8° R. Kälte. VI | — 40 | 3 | — |
| b. 20. ovalifolium fol. aur. var.; hübsch goldbunt | — 50 | 4 | — |
| P. 7. **species nova**; von pyramidalem Wuchs, VI | — 30 | 2½ | — |
| 8. **vulgare**, *L.*, Gemeiner L.; Der schönste Strauch als Unterholz u. als solcher halbimmergrün VI | — 25 | 2 | * |
| 9. — foliosum, *Hrt.*, Reichbelaubter L. | — 35 | 3 | * |
| 26. — fol. albo punctatis; weissgelb punktirt u. gefleckt | — 50 | 4 | — |
| b. 10. — **fol. var.**, Goldbuntblättriger L.; recht hübsch | — 40 | 3 | * |
| — — — ........ 1—1¼m. hohe Stämme | 1 50 | — | — |
| 11. — italicum; Laub mattgrün, Frucht gelblich, VII | — 30 | 2½ | * |

| | p. St. M. ₰ | 10 St. M. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| **Ligustrum.** | | | |
| T. 12. **vulgare** pendulum; Hängender gem. *L.*; neu! ........ Hochst. | 1 50 | — | — |
| P. 13. — **pyramidale**, *Hrt. Britz.*; hiesiger Sämling von reicher bräunlich grüner Belaubung und compactem Wuchs, VII ........ | — 40 | 3 | * |
| • **Liquidambar** *L.*, Amberbaum; | | | |
| 1 Styraciflua, *L.*, ........ kleine Pflanzen | — 60 | — | — |
| • **Liriodendron** Tulipifera, *L.*, **Tulpenbaum** ........ M 1. 50 bis | 3 — | — | — |
| **Lonicera**, *L.*, **Heckenkirsche, Gaisblatt.** | | | |
| a. Caprifolium, Gaisblatt, (Jelänger jelieber) | | | |
| § 1. Caprifolium, *L.* (L. italica, *Schm.*), Italienisches G.; gelblich blühend M 0,60 bis | 1 — | 5—9 | * |
| § 2. Douglasii (Caprif) *Lindl.*; gelblich, reichblühend, wohlriechend ........ | — 60 | 5 | — |
| § 3. flava, *Sims.* (L. Brownii, *Hrt.*) gelb, sehr grossblättrig ........ M 0,60 bis | 1 — | 5 | — |
| § • 4. brachypoda, *D. C.* (-flexuosa, *Thunb.*); weisslich, **sehr wohlriechend**, ist in milden Wintern vollkommen immergrün. An Gebäuden sehr zu empfehlen! ........ | — 60 | 5 | — |
| b. • § 17. — reticulata fol. var; goldbuntblättrig ........ | — 50 | 4 | — |
| § 5. **fuchsioides**; Fuchsienähnliches G., roth, schön, neu! sehr reichblühend | — 60 | 5 | * |
| § 6. grata, *Hrt.*, Angenehmes G.; gelblich, reichblühend ........ M 0,60 bis | 1 — | — | — |
| § 10. occidentalis Plantierensis, *Hrt.*; orangeroth ........ | — 60 | — | — |
| § 16. punicea *Hrt.*, roth ........ | — 60 | — | — |
| § 12. sempervirens superbum, *Hrt.*; roth schön ........ | — 60 | — | — |
| b. **Heckenkirsche**, nicht rankende; 10 Sorten à 1 St. M 4. | | | |
| 20. chrysantha *Turtsch.*, Gelbblühende H., ........ | — 50 | — | — |
| 37. fragrantissima, *Paxt.*, Wohlriechende H.; aus China ........ | — 60 | — | — |
| 21. hispida, *Hrt. nicht Pall.*, Rauhe H.; VI ........ | — 35 | 2½ | * |
| 23. **Ledebouri**, *Esch.*, Ledebour's H.; mit dunkler Belaubung und braunen Blumen, VII ........ | — 40 | 3 | * |
| 24. microphylla, *Willd.* (L. Sieversiana, *Bge.*), Kleinblättrige H.; VII, VIII.. | — 50 | 4 | — |
| • 11. Niaguerillei, *Hrt.*; etwas rankend, mit zierlichen gelben Blumen von orangeähnlichem Duft ........ | — 50 | — | — |
| 40. nigra, *L.*, Schwarzfrüchtige H.; ........ | — 50 | — | — |
| 25. orientalis, *Lam.* (L. caucasica, *Pall.*), Morgenländische H.; VII ........ | — 40 | 3 | * |
| 27. Ruprechtiana, *Regl.*, Ruprecht's H. ........ | — 40 | 3 | * |
| 28. **tatarica**, *L.*, Tartarische H.; allgemein beliebter hoher u. schönblühender Zierstrauch V ........ | — 25 | 1½ | * |
| — ........ stark | — 40 | 3½ | * |
| 46. — alba grandiflora; rein weiss, grblum. ........ | — 40 | — | — |
| 30. — fl. **albo**, Weissblühende tart. H. V. ........ | — 40 | 3 | — |
| 32. — fl. **rubro** (L. sibirica, *Hrt.*;) Dunkelrothe H.; V. ........ | — 40 | 3 | — |
| 33. — fr. luteo, Gelbfrüchtige tart. H.; V. ........ | — 40 | 3 | — |
| 41. — **gracilis**, *Hrt.*, grossblumig, weiss m. rosa Schein ........ | — 50 | 4 | — |
| 43. — **virginalis**, *Hrt.*; grblum., hell rosa m. dkl. gestreift u. marmorirt | — 50 | 4 | — |
| 36. Xylosteum, *L.*, Gemeine H.; V, VI. ........ | — 30 | 2½ | * |
| 48. — **Philomelae** *Hrt.*; sehr hübsch belaubt ........ | — 50 | 4 | — |
| **Lycium**, *L.*, **Bocksdorn.** | | | |
| 2. chinense, *Mill.*, Chinesischer B., wenig Dornen ........ | — 40 | 3 | — |
| 1. europaeum macrocarpum, *Hrt.*, Grossfrüchtiger gemeiner B. ........ | — 30 | 2 | * |
| 3. ruthenicum, *Murr.* Russischer B.; VIII, nicht überhäng. wie die anderen Sorten ........ | — 40 | — | — |
| △ **Maclura** aurantiaca, *Nutt.*, **Osagen-Orange**; VII ........ | — 70 | 6 | — |
| • **Magnolia** *L.*, **Magnolie**; | | | |
| 1. obovata, *Thunb.* (M. purp., *Curt.*); m. roth gefärbten Blumenblättern M 6 bis | 20 — | — | — |
| 3. Yulan Soulangeana und andere Spezies ........ „ 6 bis | 12 — | — | — |
| **Mahonia** siehe Berberis. | | | |
| § **Menispermum** canadense, *L.*, Kanadischer **Mondsame**; für Festons u. dergl. | — 60 | 5 | — |
| **Mespilus** *L.*, **Mispel.** | | | |
| 15. germanica, *L.*, Gemeine Mispel; Früchte essbar V ........ | — 70 | 6 | — |
| b. 16. — fol. arg. var.; weissbuntblättrig ........ | — 70 | 6 | — |
| Die übrigen siehe unter Crataegus u. unter Obst. | | | |
| **Morus**, *L*, **Maulbeere**; alle geben Futter für Seidenraupen. | | | |
| 1. alba, *L.*, Weissfrüchtige M.; IV. V. ........ | — 40 | 3 | * |
| 7. — Columbassa Lodd., Columbassa-M. ........ | — 80 | — | — |

| | pr. St. M. ₰ | 10 St. M. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| **Morus**, *L.*, **Maulbeere.** | | | |
| 2. intermedia. *Pers.* (M. L'Hou, *Hrt.*); sehr grblättrig | — 60 | — | — |
| 3. Morettiana. *Lodd.*, Moretti-M. | — 40 | 3 | — |
| 10. **multicaulis**, *Perr.* (=Constantinopolitana, *Lam.*) sehr grblättrig, ähnlich intermedia = L'Hou- =Tokwa | — 75 | 6 | — |
| * 4. nigra, *L.*, Schwarzfrüchtige M.; Beeren werden gegessen, VI. | — 50 | — | — |
| * 6. urticaefolia, *H.*, Nesselblättrige M.; schön | — 75 | 6 | — |
| **Myrica**, *L.*, **Gagel.** | | | |
| 1. asplenifolia, *L.* (Comptonia asplenifolia, *Banks*); sehr wohlriechend | — 75 | — | — |
| 2. cerifera, *L.*, Wachsmyrthe; halb immergrün | — 50 | — | — |
| **Myricaria**, *Desv.*, **Myrikarie.** | | | |
| * 2. daburica, *Hrt.*; Belaubung graugrün | — 40 | 3 | — |
| **Ostrya** vulgaris, *Willd.*, Weissbuchenblättr. **Hopfenbuche** | 1 — | — | — |
| **Paeonia** *L.*. **Paeonie** (Gichtrose, Pfingstrose). | | | |
| * 1. arborea, *Donn.*, (P. Moutan, *Sims.*), Baumartige P. . . . M. 1. 50 bis | 5 — | 13—45 | — |
| △ **Paulownia** imperialis, *S. u. Z.*, Kaiserliche **Paulownie**; sehr grossblättr. | — 80 | — | — |
| * § **Periploca** graeca, *L.*, Griechische Baumschlinge; klettert 6—7m. hoch, Laub glänzend, dunkelgrün, Blüthen wohlriechend . . . 0,75 bis | 1 — | — | — |
| **Phellodendron amurense**, *Rupr.*, **Sibirischer Korkbaum**; wird am Amur 15—18m. hoch und die Rinde dort allgemein als Kork benutzt, Blatt gefiedert und wohlriechend, sehr schön; neu 1—1,50m. hoch | 2 50 | 22 | — |
| — — junge Hochst. | 5 — | — | — |
| **Philadelphus**, *L.*, **Pfeifenstrauch** (Wild. **Jasmin**); 10 Sort. à 1 St. 3,50 M.— alle blühen weiss. | | | |
| 13. Columbianus, *Hrt.*, (columbarius?; VI, VII, Laub mattgrün, sehr reichblühend, grossblumig | — 40 | 3 | * |
| 14. cordatus, *Hrt.*, Herzblättriger Pf.; ähnlich dem vorigen | — 40 | 3 | * |
| 1. **coronarius**, *L.*, Gemeiner Pf., VI, V, sehr bekannt und verbreitet | — 30 | 2 | * |
| — . . . 2—3m hohe starke Sträucher | — 50 | 4 | * |
| b. 18. — **fol. aureis**, *Hrt.*; mit goldgelben Blättern. **Neu!** | — 60 | — | — |
| 21. — fl. pl., *Hrt.*; gefüllt | — 50 | 4 | — |
| 5. — nanus, *Mill.*, Zwerg-Pf.; VIII, bildet einen dichten Busch | — 40 | 3 | * |
| 7. — salicifolius, *Hrt.*, Weidenblättriger Pf.; VIII, eigenthümliche Belaubung | — 40 | 3 | — |
| 9. — Zeyheri, *Schrad.*, Zeyher's Pf.; VI, VII, frühblühend | — 40 | 3 | — |
| 22. dianthiflorus pl., *Hrt.*; Nelkenblüthiger gefüllter Pf. | — 50 | 4 | — |
| 6. **floribundus**, *Schrad.* (-pubescens, *Lois.*), Reichblühender Pf.; VI, V, schön | — 30 | 2 | * |
| — . . . stark 2—3m hoch | — 50 | 3½ | * |
| 2. Gordonianus, *Lindl.*, Gordon's Pf.; VI, V, hochwachsend, grossblumig | — 40 | 3 | * |
| 10. **grandiflorus**, *Hrt.*, Grossblumiger Pf; VI, V, durch die grossen dunkelgrünen Blätter und die grossen Blumen sich auszeichnend, sehr schön | — 40 | 3 | * |
| 23. grandiflorus speciosissimuss, *Hrt.* | — 50 | — | — |
| 12. inodorus, *Hrt.* (Lewesii, *Prsh.*); VII. Blätter hellgrün | — 40 | 3 | — |
| 3. Keteleeri fl. pl., *Hrt.*, Keteleer's gefüllter Pf., VII, neuere Züchtung! | — 40 | 3 | * |
| 4. **latifolius**, *Schrad.*, Breitblättriger Pf.; VI, hochwachsend, grossblumig | — 40 | 3 | * |
| * 11. laxus, *Schrad.* (inodorus, *L.*); VII, grossblumig, dunkelblättrig, Haltung überhängend | — 40 | 3 | — |
| 19. nivalis spectabilis pl., *Hrt.*; halbgefüllt | — 45 | 3½ | * |
| 25. pendulifolius, *Hrt.*; sehr grossblättrig | — 50 | — | — |
| 28. primulaeflorus *Hrt.*; **neu!** | — 75 | 6 | — |
| 30. pubescens Souvenir de Billiard; **neu!** . . . 1jähr. Steckl. | — 75 | — | — |
| 15. Satsumi, *Paxt?*, VII, aus Japan, Blätter breit, geadert | — 50 | 4 | — |
| 16. Schrenkii. *Rupr.*, Schrenk's Pf.; VII, ähnlich Nr. 15. scheint etwas höher zu werden | — 40 | 3 | — |
| 17. undulatus, *Hrt.*, Welliger Pf.; VII | — 40 | 3 | — |
| 26. Yokohamae, *Sieb.*; Neue Einführung aus Japan | — 40 | 3 | * |
| **Pirus**, *L.*, **Birne, Apfel.** | | | |
| a) **Aechte Birnen** (Pirophorum). | | | |
| 30. communis, *L.*, Waldbirne, s. Gehölzsämlinge. | | | |
| 31. — fol. var., *Hrt.*, weissgerandet, constant. VII | — 75 | — | — |
| T. 33. elaeagnifolia, *Pall.*, Oleasterblättrige B., Belaubung weissfilzig, hängend, VI | — 75 | 6 | — |

| | | pr. Stück M | pr. Stück Pf | 10 St. M | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pirus**, *L.*, **Birne, Apfel.** | | | | |
| — | 35. Michauxii, *Hrt.*; Belaubung graugrün, pyramidal | — | 75 | 6 | — |
| — | 36. nivalis, *L. fil.*, Schneebirne; Laub graugrün | — | 75 | 6 | — |
| — | 37. persica *L.* (P. cuneifolia, *Guss.*, Crataeg. cuneif.; *Hrt.*) Persische B.; VII. | — | 75 | 6 | — |
| | 39. **Pollveria**, *L.* (= auricularis, *Knoop* = Bollwilleriana, *D. C.*). Lazarolbirne, Hagebuttenbirne | — | 75 | 6 | — |
| | b) Aepfel (Malus). 10 Sorten à 1 St. 7 M. | | | | |
| — | 53. **baccata**, *L.*, Beeren-A.; Frucht klein, glänzend roth, V ... M 0,50 bis | 1 | 50 | 4—13 | * |
| | 54. — cerasifera, *Hrt.*, Kirschentragender B.-A., V | — | 75 | 6 | — |
| — | 73. — **fr. luteo**, *Hrt.*, Frucht gelb, gross | — | 75 | 6 | — |
| | 74. — **fr. maximo**; *Hrt.*, Frucht scharlach, gross | — | 75 | 6 | — |
| — * | 57. coronaria, *L.*; Geschmückter A.; Blumen gross, wohlriechend, schön belaubt | — | 75 | 6 | — |
| — | 58. dioica, *Mnch.*, (apetala, *Mnch.*), Grün blühender Feigen-A | — | 75 | 6 | — |
| | 50. Malus, *L.*, s. Obstwildlinge. | | — | | |
| —b. | 64. — aucubaefolia, *Hrt.*, Aukubenblättriger A.; hübscher Tafelapfel | — | 75 | 6 | — |
| b. | 65. — argenteo-marginata, *Hrt.*, Weissrandiger A.; schön, constant, VII | — | 75 | 6 | — |
| —b. | 66. — aureo-marginata, *Hrt.*, Goldrandiger A.; schön | — | 75 | 6 | — |
| —b. | 67. — foliis tricoloribus. *Hrt.*, Dreifarbiger A. | — | 75 | — | — |
| | 79. microcarpa praecox, *Hrt.*, Früher kleinfrüchtiger A. | — | 75 | — | — |
| | 59. prunifolia, *Willd.* Pflaumenblättriger A. | — | 50 | 4 | — |
| | 60. **prunifolia fr. coccineo** *Hrt.*; scharlachfrüchtiger Wachsapfel 0,75 bis | 1 | 50 | 6 | — |
| T. | 76. prunifolia pendula, *Hrt.*; hübscher Trauerbaum ... M 0,75 bis | 1 | 50 | 6 | — |
| | 51. pumila (Malus), *Mill.* (M. paradisiaca, *L.*). Paradies-A, VII | — | 50 | — | — |
| | 52. — gallica, *Hrt.*, Splitt-A., Doucin; VI | — | 50 | — | — |
| | 81. rivularis, *Hook.*; ähnlich No. 71 | — | 50 | 4 | — |
| | 80. sibirica fructu coccineo; Sibirischer scharlachfrüchtiger Wachsapfel | — | 75 | 6 | — |
| | 77. **spectabilis fl. albo pl.**, *Hrt.*, Weissgefüllter Pracht-A. | — | 80 | 7 | — |
| — | 68. — **fl. pl.**, Gefüllter Pracht-A.; VI. gef. hellrosa, 0,60 bis | 1 | — | 5—8 | * |
| T. | 69. — **floribunda**, *Sieb.*, Reichblühender Pracht-A.; Knospen dunkelroth, VI, sehr beliebte Varietät | — | 50 | 4 | * |
| | — hübsche Trauerbäume und sehr starke Pyramiden ... M 1 bis | 1 | 75 | 9—15 | T— |
| | 61. — Kaïdo, *Sieb.*, Kaïdo-Pr.-A.; V, reichblühend, Früchte gelb, von der Grösse einer grossen Kirsche ... M 0,60 bis | 1 | 50 | 5 | — |
| | 62. — Ringo, *Sieb.*, Ringo-Pr.-A.; V, ... „ 0,60 bis | 1 | 50 | 5—13 | — |
| | 78. — **Riversii pl.**, *Hrt.*; halb gefüllt, leicht rosa, schön | — | 75 | 6 | — |
| | 70. Tenorii fl. carneo pl., *Hrt.*; gefüllt rosa | 1 | — | — | — |
| T. | 71. Toringo, *Sieb.* (Mal. pendula, *H.*), Toringo-A.; mit zahlreichen kleinen carminrothen Blüthen und erbsengrossen Früchten | — | 60 | 5 | — |
| | 72. — major, *Hrt.*; in allen Theilen etwas grösser als der vorige | — | 75 | — | — |
| | **Planera**, *Gmel*, Planere | | | | |
| | 501. aquatica. *Walt.*, Wasser-Pl.; elegant hängend ... 0,75 bis | 1 | 75 | 6 | — |
| * | 504. Keaki, *Hrt.*, Japanische Pl.; hübsch belaubt | 1 | — | — | — |
| | 508. repens, *Hrt.*, Kriechende Pl.; ... 0,75 bis | 1 | 50 | 6 | — |
| * | 502. Richardii, *Mchx.* (Rhamn. carpinifolia, *Pall.*); stark hängend | — | 60 | 5 | — |
| | **Platanus** orientalis, *L.*, Gemeine **Platane**; Pyramiden | 1 | — | 8 | — |
| | **Populus**, *L.*, **Pappel.** Siehe auch Alleebäume. | | | | |
| — | 36. **alba Bolleana**, *Hrt. Britz.*; s. unter Neuheiten. | | | | |
| — | 2. **alba nivea**, *Hrt.*, Aechte Silberpappel; ausserordentlich werthvoller Landschaftsbaum ... 2—3m. hoch | — | 50 | 4 | — |
| — | 29. **angulata**, *Ait.* (macrophylla. *Lodd.*), Karolinische P., auffallend durch die sehr grossen Blätter und die eckigen jungen Zweige, jung etwas empfindlich | — | 75 | — | — |
| | 12. — Medusae, *Hrt.*; Blätter kleiner und härter ... 0,50 bis | 1 | 25 | — | — |
| — | 13. balsamifera macrophylla, *Hrt.*, Grossblättrige Balsam-P.; Unterseite d. Blätter silberig | — | 50 | 4 | — |

| | per Stück ℳ | ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig |
|---|---|---|---|---|
| **Populus**, *L.*, **Pappel.** | | | | |
| 15. balsamifera viminalis, *Hrt.*; schmalblättrig | — | 60 | — | — |
| 16. betulaefolia, *Prsh.*, Birkenblättrige Schwarz-P. 0,50 bis | 1 | — | 4 | — |
| 26. canadensis, *Mnch.* (monilifera, *Ait*), Kanadische P. 0,50 bis | 1 | 25 | 4–10 | — |
| 32. **canadensis aurea** (van Geert); Neuheit mit gelben Blättern, ähnlich der »Quercus Concordia«, von ebenso kräftigem Wuchse, wie die Stammform, landschaftlich sehr wirkungsvoll. Bei üppigem Wuchs tritt die gelbliche Färbung besonders hervor (Hochst. 2 ℳ) | 1 | — | 8 | — |
| — — 1jähr. Stecklinge | — | 30 | 2½ | — |
| 17. **candicans**, *Ait.* (Ontariensis, *Desf.*), Weissliche Balsam-P.; mit grossen unterseits silberglänzenden Blättern 0,50 bis | 2 | 50 | 4 | — |
| T. 11. canescens pendula, *Hrt.* (Parasol de St. Julien), Trauer-Grau-P.; hübsch. Hochst. ℳ 1,25 bis | 1 | 75 | — | — |
| 19. Eugenei, *Simon-Louis*; Abart der Kanadischen P., ausserordentlich schnellwüchsig 0,60 bis | 1 | 25 | 5–11 | — |
| P. 3. fastigiata, *Desf.*, Italienische Pyramiden-P. 2m. hoch | — | 50 | 4 | * |
| P. 34. — gigantea, *Hrt*; | — | 60 | 5 | — |
| P. 20. — Plantierensis femina; neue weibliche Pyramiden-P., sehr starkwüchsig und kräftig | — | 75 | 6 | — |
| P. 21. — — mascula, *Sim.-L.*; neue männliche Pyramiden-P.; Eigenschaften wie bei der obigen | — | 75 | 6 | — |
| T. 24. grandidentata pendula, *Hrt.*, Grosszähnige Trauerespe; Hochst. | 1 | 50 | — | — |
| P. 4. **hybrida Berolinensis**, *C. Koch*, Berliner Lorbeer-P.; Hybride von P. laurifol. und canadensis (im Berliner Botanischen Garten gewonnen), im Wuchse ähnlich der Pyramiden-P., jedoch etwas lockerer gebaut und die Blätter grösser. Ihr Hauptvorzug aber besteht darin, dass sie früher austreibt, ihre Blätter weniger von Insecten angegriffen werden und die Wurzeln eine geringere Ausbreitung besitzen 2m. hoch | — | 50 | 4 | * |
| 5. **laurifolia**, *Led.*, Lorbeerblättrige P., wird 14 Tage früher grün und hat eine mehr pyramidale Krone als die Schwarz-P., II 2–3m. hoch | — | 50 | 4 | * |
| 30. nigra, *L.*, Schwarz-P. | — | 50 | 4 | — |
| 27. rotundifolia, *Hrt.*; Hchst. | 1 | 25 | — | — |
| 28. **Simoni**, *Sim.-L*; grossblättrige sehr schöne Pappel aus China, 0,60 bis | 1 | 25 | 5–11 | — |
| T. 7. **tremula**, *L.*, **pendula**, Trauer-Espe Hochst. ℳ 1,25 bis | 2 | 25 | 11–20 | — |
| 22. tremuloides, *Mchx.* (= graeca, *Ait.* = Atheniensis, *Ludw.*), Nordamerikanische Espe | — | 60 | — | — |
| T. 23. — pendula, *Hrt.*; Hchst 1,25 bis | 2 | — | 11–18 | — |
| **Potentilla**, *L.*, **Fünffingerstrauch.** | | | | |
| 2. fruticosa, *K.* Strauchartiger F.; VII. | — | 35 | 3 | * |
| **Prinos**, *L.*, (**Ilex**, *C. Koch*), Winterbeere. | | | | |
| h. i. 20. verticillata, *L.*, Rostfarbenfrüchtige W.; | — | 60 | — | — |
| **Prunus**, *L.*, **Pflaume, Kirsche** 20 Sorten à 1 St. 14 ℳ | | | | |

a) **Aechte Pflaumen** (Prunus).

| | per Stück ℳ | ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig |
|---|---|---|---|---|
| 1. americana, *Marsh.*, Amerikanische Pfl.; sehr früh und reichblühend, VI. | — | 50 | 4 | — |
| b. 2. — fol. var., Gelbbuntblättr. amerik. Pfl. | — | 75 | 6 | — |
| T. 70. Armeniaca pendula, *Hrt.* Trauer-Aprikose | 1 | — | — | — |
| 4. — salicifolia, *Hrt.*, Weidenblättrige Aprikose; | — | 75 | 6 | — |
| 5. **cerasifera**, *Ehrh.* (Pr. Myrobalana, *Desf.*), Kirschpfl. zeichnet sich durch frühes Blühen aus, IV | — | 40 | 3 | — |
| 17. — gigantea, *Hrt.*, Riesen Kirschpflaume | — | 75 | 6 | — |
| b. 7. oeconomica, *Borkh.*, fol. var., Weissbuntblättrige Zwetsche; sehr schön weiss marmorirt, VI | — | 75 | 6 | — |
| b. 19. — **fol aureo marginatis**; goldrandig | — | 75 | 6 | — |
| P. 8. — pyramidalis, *Hrt.*, Pyramiden-Zwetsche; V, IV | — | 75 | 6 | — |
| b. 9. **orientalis fol. var.**, *Hrt.*, Morgenländische weissrandige Pfl., constant | — | 75 | 6 | — |
| 15. Petzoldi, *C. Koch* (Amygdalus chinensis, *Hrt.*), Petzold's Aprik.; Blüthen rosa gefüllt, kleiner, als bei Pr. triloba | — | 75 | 6 | — |
| 10. pumila, *Hrt*, Niedrige Pfl., VII | — | 50 | 4 | — |
| 33. — Susquehanae; *Hrt.*; kriechend | — | 50 | 4 | — |

| | pr. St. M. ₰ | 10 St. M. | hundertweise vorräthig |
|---|---|---|---|
| **Prunus.** | | | |
| 18. **Simoni**, *Hrt.*, Simon's Pfl.; neue strauchartige Pfl. aus China mit glänzenden Blättern und ziegelrothen grossen Früchten, völlig hart M 0,75 bis | 1 50 | 7—13 | — |
| 11. spinosa, *L.*, Schlehe, Schwarzdorn; VI | — 30 | 2¼ | — |
| 12. — **pl.**, *Hrt.*, Gefüllte Schlehe; in der Blüthezeit ausserordentlich schön | — 75 | 6 | — |
| * — — — Hchst. | 1 50 | — | — |
| 13. **tomentosa**, *Thunb.*, Filzige Pfl.; VII Neu! | — 75 | 6 | — |
| 14. **triloba**, *Lindl.*, Mandelaprikose; Blüthen prächtig, gleich kleinen gefüllten Rosen, reichblühend | — 60 | 5 | * |
| — — **1—1½ m. hohe Stämme** mit 2—3jährigen Kronen, M 1 bis | 1 75 | 9—15 | * |
| b) Kirschen (Cerasus). | | | |
| 21. **Avium**, *L.* **fl. pl.**, Gefülltblühende Süssk. (Hchst. 1,75 M) | 1 — | 8 | — |
| 35. — decumana, *Hrt.*, Tabakblättr. Süssk. sehr grossblättrig | 1 — | 8 | — |
| T. 22. — pendula, *Hrt.*, Trauer-Süssk.; schön hängend (Hchst. 1,75 M) | 1 — | 8 | — |
| b. 23. — pulverulenta tricolor, *Hrt.*, Dreifarbige bestäubtblättrige Süsskirsche, neu! | 1 — | 8 | — |
| 25. Cerasus, *L.*, fl. albo pl., Weissgefüllte Sauerk. Hchst. | 1 75 | 15 | — |
| 27. — fl. roseo pl., *Hrt.* (serrulata fl. pl., *C. Koch*), rosenroth gefüllt, | 1 75 | — | — |
| T. 38. — pendula fl. roseo; gut hängend. Neu! 1 bis | 1 75 | — | — |
| 26. — **Rhexii fl. pl.**, Sauerkirsche mit grossen gefüllten, kleinen Rosen ähnlichen Blüthen (Hchst. 1,75 M) | 1 — | 8 | — |
| 36. — semperverens, *Hrt.*; dunkelgrün glänzendblättrig | — 50 | 4 | — |
| 28. fruticosa, *Pall.*, kugelförmige Strauchweichsel. 0,75 bis | 1 75 | 7—15 | — |
| T. 29. — pendula; hängende Strauchk. Hochstämm. | 1 75 | 15 | — |
| * 30. **japonica fl. albo pl.** (**Pr. sinensis fl. albo pl.**) Weiss gefüllte japan. Zwergk.; **starke Büsche zum Treiben** | | | |
| — — veredelt | — 50 | 3¼ | * |
| — — — — — Hchst. | 1 25 | 11 | — |
| * 31. — **fl. roseo pl.**, Rosa gef. japan. Zwergk. veredelt | — 50 | 3½ | — |
| — **Diese beiden letzteren stark** wurzelächt | — 35 | 2½ | * |
| c) Traubenkirschen (Padus). | | | |
| 40. Mahaleb, *L.*, Steinweichsel; Blätter u. Holz wohlriechend, letzteres vielfach zu Pfeifenröhren benutzt. V 1½—2 m. h. | — 40 | 3½ | * |
| 41. — **compacta**, *Hrt. Britz.*; Eine hier entstandene sehr gedrängt wachsende reichbelaubte Abart | 1 — | 9 | — |
| 56. — fructu luteo, *Hrt.*; gelbfrüchtig | — 75 | — | — |
| 43. Padus, *L.*, Gemeine Traubenk.; V, IV 1½—2 m. hoch | — 40 | 3½ | * |
| b. 44. — **aucubaefolia**, Aukubenblättr. Traubenk.; Blätter regelmässig punktirt, sehr hübsch M 0,75 bis | 1 50 | 6—13 | * |
| 55. — fl. pl., *Hrt.*, Gefüllte Traubenk. | 1 — | 8 | — |
| 45. — **rotundifolia**, *Hrt.*; grossblättrig und grossfrüchtig M 0,75 bis | 1 50 | 7—13 | — |
| 46. **serotina**, *Ehrh.*, Späte Traubenk.; Blätter lorbeerähnlich glänzend, sehr schön, V, VI 1—1½ m. hoch | — 40 | 3½ | * |
| 47. — asplenifolia, *Hrt.*; farrnblättrig | — 75 | 7 | — |
| 48. — **cartilaginea**, *Lehm.*; pergamentblättrig. Sehr schön! | — 75 | 7 | * |
| 50. **virginiana**, *Ehrh.*, Virginische Traubenk., mit reichen rothen Trauben | — 40 | 3½ | * |
| T. 52. — pendula, *Hrt.*; hängend M 0,75 bis | 1 50 | — | — |
| d) Kirschlorbeer (Laurocerasus). | | | |
| i. △ 60. Laurocerasus, *L.* Gemeiner Kirschlorbeer M 0,75 bis | 1 — | 7—9 | — |
| **Ptelea**, *L*, **Lederbaum**. | | | |
| 1. trifoliata, *L.*, Dreiblättriger L., V | — 30 | 2½ | * |
| **Pterocarya**, *Kth.*, Flügelnuss. | | | |
| * 1. caucasica, *C. A. Mey.*; Kaukasische Fl.; schön belaubter Baum u. ausserordentlich raschwüchsig | — 75 | 6 | * |
| **Quercus**, *L.*, **Eiche** . . . nach meiner Wahl 12 Sorten à 1 St. 15 M. | | | |
| Die Eichen verdienen wegen ihres grossen Formenreichthums und ihrer Schönheit die häufigste Anpflanzung. | | | |

| Quercus. | pr. St. ℳ | ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **I. Eichen der alten Welt.** | | | | |
| a) **Robur**, Verwandte der deutschen Eichen. | | | | |
| 3. apennina, *Lam.*, Apenninen-E. ℳ 1 bis | 2 | — | — | — |
| 65. mongolica, *Fisch.*, Mongolische E. | 1 | 25 | — | - |
| 33. pubescens, *Willd.* (= lanuginosa, *Thuill.*) Weichhaarige E.; graugrün | 1 | 25 | — | — |
| 34. pyrenaica, *Willd.* (= Tozae, *Bosc*); scharfzackig graugrün belaubt | 1 | 50 | — | — |
| 103. Robur, *L.* (Q. pedunculata, *Hoffm.*), Sommer-E., Stiel-E. 2 m. hoch | — | 75 | 6 | * |
| b. 17. — **argenteo-marginata**; weissrandig, hübsch | 1 | 50 | — | — |
| b. 19. — — variegata; weissgestreift | 1 | 50 | — | — |
| b. 20. — **atropurpurea**, Blut-E.; dunkel purpurroth wie die Blutbuche | 3 | — | — | — |
| b. 12. — **Concordia**, *Hrt.*, mit goldgelben Blättern, schön 2 bis | 3 | — | 18 | — |
| P. 13. — **fastigiata** (Q. fastig., *Lam.*), Pyramiden-E. 1–2m. h. ℳ 1 bis | 2 | 50 | 9–22 | — |
| do. stärkere ℳ 3 bis | 12 | — | — | — |
| P. 15. — — cucullata, *Hrt.*. Hohlblättrige Pyramiden-E. | 2 | — | — | — |
| 106. — — viridis, *Hrt.*, Grüne Pyramiden-E. | 2 | — | — | — |
| 10. — heterophylla cucullata, *A. M.*; mit aufgetriebenen verschieden gestalteten Blättern | 1 | 50 | — | — |
| b. 22. — maculata, *Hrt.*, weiss gefleckt | 1 | 50 | — | — |
| 109. — multicaulis, *Bth. C.*, Vielstielige E. | 1 | 50 | — | — |
| 132. — **nigricans**, *Hrt.*, Laub röthlich braun | 2 | — | — | — |
| 131. — pallida, *Hrt.*; Laub gelblich grün | 1 | 25 | — | — |
| 29. — **pectinata**, *Hrt.*, Kammblättrige E.; weit ausgezackt, sehr schön | 1 | 25 | — | — |
| — — Hchst. | 2 | 50 | 22 | — |
| T. 25 — pendula, *Hrt.* Trauer-E. | 2 | — | — | — |
| T. 99. — **pendula Dauvessei**, *Hrt.*; sehr schöne Trauer-Eiche ℳ 2 bis | 4 | 50 | 23–40 | — |
| T. 110. — — **nova**, *Hrt.*, Neue Trauer-E.; schön ℳ 2,50bis | 4 | 50 | 23–40 | — |
| 134. — rubicunda, *Hrt.*, (= cuprea, *Hrt.*); Laub röthlich | 1 | 50 | — | — |
| b. 23. — pulverulenta, *Hrt.*, bestäubt weissbuntblättrig | 1 | 50 | — | — |
| 111. — rubrinervis, *Hrt.*, Rothnervige E. | 1 | 25 | — | — |
| 36. rubens, Röthliche? E. | 1 | 25 | — | — |
| 112. sessiliflora *Salisb.*, Winter-E., Stein-E.; mit sitzenden Früchten | — | 75 | — | — |
| 46. — Afghanistanensis, *Bth. Cat.*; glänzendblättrig | 1 | 50 | — | — |
| 40. — Falkenbergensis *Bth. C.*, Falkenberg-E., grossblättrig 1,25 bis | 2 | 50 | — | — |
| 43. — **longifolia hybrida**, *A. M.*, Langblättr. Bastard-E.; sehr lang- und schmalblättrig, hübsche Sorte | 1 | 50 | — | — |
| 42. — **Louetti**, *A. M.*, Louett's E.; starkwüchsig, mit dunkelgrünen, glänzenden, lorbeerähnlichen Blättern, hübsch | 1 | 50 | — | — |
| 51. species e Nikita, *Bth. C.*, E. aus Nikita; graugrün | 1 | 50 | — | — |
| 50. ventricosa, *Bth. C.* | 1 | 25 | — | — |
| b) **Cerris**, **Cerr-Eiche**, (Türkische od. Burgunder-E.; Blätter scharf gezähnt; Früchte im 2. Jahre reifend. | | | | |
| 113. Cerris, *L.*; Cerr-E.; Burgunder E.;) 1–2m. hoch | — | 75 | 6 | — |
| — junge Hochst. | 2 | — | 17 | — |
| 56. — crispa, *Hrt.*, Krausblättrige C.-E.; | 1 | 25 | — | — |
| 66. **conferta**, *Kit.* (Qu. pannonica, *Bth*). Dichtfrüchtige E.; sehr schöne grossblättrige Sorte 2jähr. Veredl. | 1 | 25 | 11 | — |
| 137. **Daimio**, *Hrt.*; Kaiser E.; neu aus Japan | 3 | — | — | — |
| 64. **macranthera**, *F. et M.*, Grossblum. E.; mit herrlichen dunkelgrünen Blättern, unter den grossblättrigen vielleicht die schönste. ℳ 1,25 bis | 2 | 50 | 11–20 | — |
| — junge Hochstämme | 2 | 50 | — | — |
| **II. Eichen der Neuen Welt** (Nordamerika). | | | | |
| 69. alba, *L.*, Weisse E.; prächtig rothe Herbstfärbung 1–2jähr. Veredl. | 1 | 50 | — | — |
| 119. **coccinea**, *Wang.*, Scharlach E.; Herbstfärbung roth. Hochst. ℳ 3 bis | 5 | — | — | — |
| 77. macrocarpa, *Mchx.*, Grossfrüchtige E.; mit auffallend grossen u. schönen Blättern | 1 | 75 | 7 | — |
| 72. olivaeformis, *Mchx. fil*; Olivenfrüchtige E. | 1 | — | 8 | — |

| | pr. St. ℳ | pr. St. ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Quercus.** | | | | |
| 73. olivaeformis Hampteri, *Hrt.*; mit grösseren Blättern als Nr. 72 | 1 | 50 | — | — |
| 121. **palustris**, *Dur.*, Sumpf-E.; gezacktblättrig | — | 75 | 7 | — |
| 75. ramosa, *Bth. C.*, Verzweigte E.; zu der Gruppe der weissen Eichen gehörig | 1 | 50 | — | — |
| 122. **rubra**, *L.*, Rothe E.; Herbstfärbung roth | — | 75 | 7 | — |
| **Rhamnus** *L.*, **Wegedorn, Kreuzdorn.** | | | | |
| 1. **alpina**, *L.*, Alpen-W.; m. grossen dunkelgrünen lederartigen Blättern | 1 | 50 | — | — |
| h. i. 3. Billiardi, *Hrt.* | — | 75 | — | — |
| 4. cathartica, *L.*, Gemeiner Kreuzd.; gut zu Hecken, VI | — | 25 | 2 | * |
| h. i. 5. chlorophora, *Hrt.*; hellgrün, schmalblättrig, halb immergrün | — | 75 | — | — |
| 7. Erythroxylon, *Pall?* | — | 75 | — | — |
| 8. Frangula, *L.*, Faulbaum, Pulverholz; VI | — | 25 | 2 | * |
| 9. **grandifolia**, *F. u. M.* (Rh. Imeretina, *Hrt.*), Grossblättriger Weged.; schön in derselben Art wie Rh. alpina, aber grossblättriger | 2 | — | — | — |
| 13. Purshiana *DC.*; ähnlich Nr. 8 | — | 50 | — | — |
| 14. tinctoria, *W. et K.*; ähnlich Nr. 4 | — | 50 | 4 | — |
| * 12. utilis, *Hrt.*, Nützlicher Wegedorn; mit hellgrünen, glänzenden Blättern, fast immergrün | — | 50 | 4 | — |
| **Rhododendron**, *L.*, **Alpenrose.** | | | | |
| △ i. 1. ponticum, *L.*, Gemeine A.; mit, 2—8 Knospen stark ... ℳ 1 bis | 2 | 50 | — | — |
| **Rhodotypus**, *S. et Z.* | | | | |
| 1. kerrioïdes, *S. et Z.*; kerrienähnlich mit weisser Blüthe | — | 40 | 3½ | — |
| **Rhus**, *L.*, **Sumach** (Essigbaum) | | | | |
| 9. carpathica, *Hrt.* | — | 60 | 5 | — |
| 8. copallina, *L.*, Kopal-S.; colorirt hübsch roth im Herbst | — | 60 | 5 | — |
| 1. glabra, *L.*, Glatter S.; V | — | 50 | 4 | — |
| * 3. — **laciniata**, *Hrt.*; Geschlitzter gl. S.; mit fusslangen, fein geschlitzten Blättern, von ausgezeichneter Wirkung als Einzelpflanze auf Rasen | — | 75 | — | — |
| 7. Osbeckii, *DC.*; schön grossblättrig | — | 75 | 6 | — |
| 5. Toxicodendron quercifolium, *Hrt.*, Eichenblättriger Gift-S. | — | 60 | — | — |
| 4. **typhina**, *Sorn.*, Virginischer S.; V, die rothen Hirschkolben ähnlichen Früchte sehr zierend | — | 40 | 3 | * |
| 6. venenata, *D. C.*, Giftiger S. (Gift-Esche) | — | 70 | — | — |
| **Ribes**, *L.*, **Johannisbeere, Stachelbeere** ... 12 Sorten à 1 St. 4 ℳ | | | | |
| Die Alpen-Johannisbeeren zeichnen sich aus durch ihr frühes Ausgrünen, die Schön- u. Goldtrauben durch ihre Blüthen, die Ahlbeeren durch ihre kräftige Belaubung. | | | | |
| 1. acerifolium, *Hrt.*, Ahornblättrige Goldtraube; VI | — | 25 | 2 | * |
| 2. albidum, *Hrt.*, Weissblühende Johannisb.; VII | — | 35 | 3 | — |
| 3. **alpinum**, *L.*, Alpen-Joh.; VII, sehr früh austreibend | — | 30 | 2½ | * |
| 32. atropurpureum, *C. A. Mey* (= petraeum, *Wulf.*), Rothblühende Johannisb.; | — | 50 | | — |
| 5. **aureum**, *Prsh.*, Aechte Goldtraube; VI, gelbblühend, Blätter im Herbst roth | — | 25 | 2 | * |
| 6. Diacantha, *Pall.*, Doppelstachelige Alpen-J. VII | — | 40 | 3 | — |
| 4. **floridum**, *L'Hérit.* (= americanum, *Mill*), Amerikanische Ahlbeere; VI, Blätter im Herbst rothbraum, hübsch! | — | 30 | 2½ | * |
| 7. gingkaefolium, *Hrt.*, Gingkoblättrige Goldtraube; VI | — | 40 | 3 | — |
| 8. **Gordonianum**, *Lem.*, Gordon's Schöntraube; Blüthe orangegelb, schön, VI | — | 40 | 3½ | — |
| 31. Grossularia arboreum, (R. uva crispa arboreum), Baumartige Stachelb. | — | 40 | 3½ | — |
| 10. nigrum, *L.*, Gemeine Ahlbeere. Schwarze Johannisb.; VI | — | 20 | 1½ | * |
| 11. — heterophyllum, *Hrt.*, Gezacktblättrige Ahlb.; schön | — | 40 | 3 | * |
| b. 12. — fol. arg. var.; weissbunt marmorirt, VII | — | 40 | 3 | — |
| b. 13. — fol. aur. var., Goldbuntblättrige Ahlb. | — | 40 | 3 | — |
| 14. niveum, *Lindl.*, Weissblühende Stachelb.; VII | — | 40 | — | — |
| 15. orientale, *Led.* (R. odoriferum, *C. Koch*), Orientalische Alpen-Joh.; VII | — | 40 | — | — |
| 16. rotundifolium, *Mchx.* (R. triflorum, *Willd.*), Rundblättrige Stachelb. VII. | — | 40 | 3 | — |
| 17. rubrum, *L.*, Gemeine Joh.; (s. auch unter Obst) | — | 20 | 1½ | * |
| 18. sanguineum, *Prsh.*, Rothblühende Schöntraube; VII, VI, schön | — | 40 | 3½ | — |
| 26. — carneum grandiflorum; fleischfarbig | — | 50 | 4 | — |
| 29. — — fl. pl.; gefüllt blühend | — | 50 | 4 | — |
| 27. — splendens; | — | 60 | — | — |

| | pr. St. ℳ | pr. St. ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Ribes.** | | | | |
| 19. saxatile, *Pall.*, Fels-Alpen-Joh. VII | — | 40 | 3¼ | — |
| 20. setosum, *Dougl.*, Borstigfrüchtige Stachelbeere | — | 40 | — | — |
| **Robinia**, *L.*, **Akazie** (Robinie) .......... 12 Sorten à 1 St. 10 ℳ | | | | |
| Die Akazien nehmen m. sandigem Boden fürlieb u. empfelen sich durch ihre grossen prächtigen Blüthentrauben u. ihre zierliche Belaubung. | | | | |
| * 5. **hispida**, *L.*, Borstige A., Rothblühende A.; wächst mehr strauchartig u. blüht schon ganz jung, wie auch ihre folgenden Abarten ℳ 1 bis | 2 | 50 | — | — |
| * 7. — complexa, Gedrängtblüthige b. A. .... Hochst. 2 „ | 2 | 50 | — | — |
| * 9. — macrophylla, *Schrad.*, Grossblättr. b. A. | 1 | 50 | — | — |
| 10. Pseud-Acacia, *L.*, Gemeine Akazie; (s. auch Alleebäume u. Gehölzsämlinge). | — | 40 | 3½ | * |
| 11. — amorphaefolia, *Lk.*, Unformblättrige gem. A. .... 0,75 bis | 2 | — | — | — |
| 12. — **angustifolia elegans**; äusserst zierlich belaubt, schwachwüchsiger als die gemeine A., neu! .... 1 bis | 2 | — | — | — |
| 13. — **aurea**, *Hrt.*, mit gelbgrünen Blättern, etwas hängend | 1 | — | — | — |
| 14. — Bessoniana, *Hrt.*, Besson's Kugel-A.; von üppigerem Wuchse als die gewöhnliche Kugel-A., aber mit lockerer Krone ........ ℳ 1 bis | 2 | — | — | — |
| 15. — Camusetii, *Hrt.*; Camuset's g. A.; mit dunklem Laube | — | 75 | 6 | — |
| 16. — crispa, *D. C.*, Krausblättrige g. A.; interessant .... 0,75 bis | 2 | — | — | — |
| 17. — cylindrica, *Hrt.*; Walzenförmige g. A. .... 0,75 „ | 2 | — | — | — |
| 20. — glaucescens, *Hrt.*; Graue g. A. | — | 75 | — | — |
| 21. — **inermis**, *D. C.*, **Kugel-Akazie** .... Hchst. 2 bis | 2 | 50 | 18—22 | * |
| 24. — **heterophylla**, *Hrt.* (R. monophylla, *Hrt.*); sehr schön | 2 | — | — | — |
| T. 34. — **pendula**, *Hrt.*, Trauer-A. .... Hchst. | 2 | — | — | — |
| 41. — pendulifolia, *Hrt.*; Blätter herabhängend .... ℳ 1 bis | 2 | — | — | — |
| 39. — **robusta Vignei**, (Transon); dunkelgrün, fein belaubt, etwas hängend .... 1 bis | 2 | — | — | — |
| 38. — **semperflorens**, *Hrt.*; **im Frühherbst zum 2ten Mal und ganz voll blühend** .... ℳ 1 bis | 2 | — | 8—18 | — |
| 27. — speciosa, *Hrt.*; von ungemein kräftigem Wachsthum 0,75 „ | 2 | — | — | — |
| 37. — umbraculifera latifolia, *Hrt.*, Grossblättrige u. sehr dunkellaubige Kugel-A.; | 1 | — | — | — |
| 1. **viscosa**, Vent. (R. glutinosa, *Sims.*), Klebe-A.; oft 2 mal, blühend, hellrosa .... ℳ 0,75 bis | 2 | — | — | — |
| 2. — albiflora, *Hrt.*; weissblühend .... ℳ 1 „ | 2 | — | — | — |
| 3. — **bella rosa**, *Hrt*; schön rosa .... 1 „ | 2 | — | — | — |
| **Rosa**, *L.*, Rose. | | | | |
| **multiflora**, (de la Grifferaie); schöne starke Sträucher für Gehölzgruppen | | 50 | 3½ | * |
| Die übrigen siehe besonderes Sortiment! | | | | |
| **Rubus**, *L.*, **Himbeere, Brombeere**; s. auch Obst. | | | | |
| § 512. **crataegifolius**, Weissdornblättrige Brombeere. Wir bezogen diese Brombeere aus dem Petersburger Bot. Garten; sie zeichnet sich durch ihre grossen, schön geformten Blätter aus | — | 60 | 5 | * |
| § 513. **fruticosus fl. albo pl.**, *Hrt.*; weiss gefüllt blühende Brombeere | — | 50 | 4 | — |
| * 514. — fl. roseo pl., *Hrt*; gefüllt rosa | — | 75 | — | — |
| 502. odoratus, *L.*, Wohlriechende Himbeere; mit grossen lillafarb Blüthen | — | 40 | — | — |
| § 511. parvifolius, *Hrt.*, Kleinblättrige Bromb.; zur schnellen Ueberkleidung kahler Flächen, wächst auch auf reinem Sande. Früchte blutroth ℳ 0,50 bis | — | 75 | 4—6 | * |
| **Salix**, *L.*, **Weide.** | | | | |
| a) in starken Exemplaren, je nach ihrem Wuchse 1¼—3m. hoch. | | | | |
| 11. **alba argentea**, *Hrt.*, (regalis. *V. Htte.*), Silber-W.; Blätter silberfarben, schön! | — | 30 | 2 | * |
| ** 13. annularis, *Hrt.* (pendula amul., *C. Koch*), Locken-W; sehr auffallende Form | — | 50 | — | — |
| T. 22. **caprea pendula**, *Hrt.*, Trauer-Palm-W.; breitblättrig, schöner Trauerbaum .... Hochst. | 2 | — | — | — |
| 1. **caspica**, *Hrt.*, (S. pruinosa, Wendl.). Kaspische W.; gute Bindeweide | — | 30 | 2 | * |

## Salix.

| | p. St. ℳ ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| b. 23. cinerea tricolor, *C. Koch* (caprea tricolor, *Hrt.*); Dreifarbige Grau-W.; hübsch bunt | — 40 | — | — |
| T. 6. **elegantissima**, *C. Koch* (Sieboldii, *Hrt.* = babylonica femina, *Hrt.*) Japanische Trauer-W.; eine sehr schöne harte Art mit elegant hängenden Zweigen ... Hochst. 1 ℳ | — 40 | 3 | * |
| 3. fusca, *Hrt.*, Braune W.; junges Holz schwarzbraun; auch Bindeweide | — 30 | 2 | * |
| P. 7. **Helix pyramidalis**, *C. Koch* (linearis, *Hrt.* = Josephinae, *Hrt.* = Eugenei, *Hrt.*), Pyramiden-Bach-W.; hübsch für Anlagen | — 30 | 2 | * |
| 4. **jaspidea**, *Hrt.*, Jaspisfarbige Reif-W.; junges Holz dunkelgrün mit starkem weissem Reife, im Winter schön | — 40 | 3 | * |
| 24. **pentandra**, *L.*; Blätter gross, glänzend wie Lorbeer, schön! | — 30 | 2½ | — |
| 93. Petzoldi, *Arb. Musc.*; **neu!** | — 50 | 4 | — |
| 15. prunifolia, *Hrt.*, Pflaumenblättrige W.; Holz bräunlich, buschig | — 30 | 2 | * |
| 16. purpurea, *L.*, Purpur-W.; Binde-W. | — 30 | 2 | * |
| T. 14. **purpurea pendula**, *C. Koch* (nigra pend., *Hrt.*), Trauerpurpur-W.; feinzweigig, schön | — 30 | 2 | * |
| — — Hochstämme ... ℳ 1,50 bis | 2 25 | 13—20 | — |
| 89. **rosmarinifolia**, *Jouan* (=Elaeagnos, *Scop.*), Aechte rosmarinblättrige W.; | — 30 | 2½ | — |
| — ... Hochst. | 2 — | — | — |
| 17. rubra, *Huds.*, Rothe W. | — 30 | 2 | * |
| 80. **sericea**, *Hrt.* (? = glauca, *L.*); niedrige graubelaubte schöne Zierweide | — 30 | 2½ | — |
| 18. **viminalis regalis**, *Hrt.*; Elbweide; starke Korbweide | — 30 | 2 | * |
| 19. — var. Reifenweide; — — | — 30 | 2 | * |
| 8. **vitellina**, *L.* (alba vitellina, *C. Koch*), Dotter-W.; gelbzweigig, sehr zierend, gute Bindeweide | — 30 | 2 | * |
| 27. — **Britzensis**, *Hrt. Britz*; s. Neuheiten. | | | |
| b) in 1—3jährigen bewurzelten Stecklingspflanzen. à Stück | — 25 | 1 | — |

25 Sorten à 3 St. 12 ℳ; 25 Sorten à 1 Stück 6 ℳ; 50 Sorten à 1 St. 12 ℳ.

28. acuminata, *Sm.* (= Smithiana, *Willd.* = viminalis-Caprea, *Wimm.*);
91. acutifolia, *Willd.* (? = caspica).
11. **alba argentea**, *Hrt.* (regalis)
32. Amanniana, *Willd.*?
12. amygdalina discolor, *Hrt.*
96. — pallida, *Hrt.*;
34. argentea-aurita, *Wimm.*
36. austriaca, *Hrt.* (purpurea-caprea hybr.)
82. **Bataviae**, *Hrt.*
37. bicolor, *Ehrh.*
39. caprea fol. glabris, *Hrt.*
1. **caspica**, *Hrt.* (pruinosa, *Wendl.*)
41. cinerea, *L.*
42. — acuminata, *Hrt.*
44. — viminalis, *Wimm.*
45. cotinifolia, *Sm.*
46. **daphnoides**, *Vill.*, Reif-W.
30. — Aglaja, *Hrt.*
5. — **pommeranica**, *Hrt.*, vielleicht die kräftigst wachsende Weide.
47. **dasyclados**, *Wimm.*
48. decipiens, *Hrt.*
49. discolor, *Hrt.*
50. **Doniana**, *Sm.*
6. **elegantissima**, *C. Koch* (babylonica femina, *Hrt.*)
51. Forbyana, *Sm.*
3. **fusca**, *Hrt.*
52. grandifolia, *Seringe* (= appendiculata, *Vill.*);
53. hastata, *Hrt.*
7. **Helix pyramidalis**, *C. Koch* (linearis, *Hrt.* = Jesephinae, *Hrt.* = Eugenei, *Hrt.*)
54. **heterophylla**, *Hrt.*
55. hippophaëfolia, *Thuyll.*
85. — undulata, *C. Koch* (undulata, *Ehrh.*)
56. holosericea, *Willd.* (viminalis-cinerea, *Wimm.*)
35. — angustifolia, *C. Koch* (aurita — viminalis, *Wimm.*)
57. Hoppeana *Willd* (triandra Hoppeana, *Hrt.*)
4. **jaspidea**, *Hrt.*
59. Lambertiana, *Sm.*
60. Lapponum, *Hrt.* nec *L.*
61. laurina, *Sm.* (Hybr. v. bicolor-Caprea);
62. Laweana, *Hrt.*
63. menthaefolia, *Host.*
64. Meyeriana, *Hrt.*
65. mirabilis, *Host.*
20. mollissima, *Ehrh.*
66. nigricans, *Sm.* (= spadicea, *Choix*);
67. parvifolia, *Hrt.*
24. **pentandra**, *L.*
68. Pontederana, *W. Koch.*
69. praecox, *Hoppe.*
70. — femina, *Hrt.*
15. **prunifolia**, *Hrt.*
16. purpurea, *L.*
14. — **pendula**, *C. Koch* (nigra pendula, *Hrt.*)
71. — **uralensis**, *C. Koch* (uralensis, *Hrt.*)
74. rigida, *Mühlb.*; hängend.
89. **rosmarinifolia**, *Jouan* (= Elaeagnos), *Scop*);
75. — *L.*, Linné's Rosmarin-W.
17. rubra, *Huds.*
77. Russelliana, *Sm.*; Russell's W.
78. Sacramento, *Hrt.*
79. salviaefolia, *Koch.*

80. **sericea**, *Hrt.* (? = glauca, *L.*)
81. Seringeana, *Gaud.*
83. stipularis, *Sm.*
86. viburnoides, *Schleich.*
67. viminalis; *L.*, Korb-W.
88. — — caprea, *Wimm.*
18. viminalis regalis, *Hrt.*, Elbweide.
19. — spec. Reifenweide.
8. **vitellina**, *L.*, Dotter-W.
26. — aurantiaca, *Hrt.*
25. — flava, *Hrt.*
9. — glauca (?), *Hrt. gall.*
10. — purpurea, *Hrt.*

Von **obigen Weiden zeichnen sich** besonders folgende **aus, als:**

**Zierweiden**: Nr. 3. 4. 6 7. 8. 11. 13. 14. 15. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 31. 45. 46. 47. 50. 60. 61. 62. 63. 66. 75. 78. 79. 80. 86. 89.

**Bindeweiden**: Nr. 1. 3. 5. 8. 10. 16. 18. 19. 20. 25. 26. 27. 28. 47. 49. 51. 56. 59. 71. 87.

| | p. St. M. | Pf. | 10 St. M. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Sambucus**, *L.*, **Hollunder** (Wilder Flieder). | | | | |
| 1. canadensis, *L.*, Kanadischer H.; V, IV, sehr starkwüchsig | — | 30 | 2 | * |
| 2. elegans, *Hrt.*, Zierender H.; V | — | 40 | 3 | — |
| 12. Fontenaysii, *Hrt.*; sehr kräftig wachsend mit grossen Blüthendolden | — | 60 | — | — |
| 4. nigra, *L.*, Gemeiner H. | — | 30 | 2 | * |
| 14. — **fl. pl.**, *Hrt.*; Gefülltblühend, hübsch | — | 50 | 4 | — |
| b. 5. — **fol. argenteo-marginatis**, Weissrandiger H.; hübsch, V, VI | — | 40 | 3 | * |
| b. 11. — — **luteis**, *Hrt.*, Gelbblättriger H.; mit leuchtend gelben Blättern | — | 40 | 3 | * |
| 15. — fr. albo, *Hrt.*; weissfrüchtig | — | 60 | 5 | — |
| 17. — **heterophylla**, *Hrt.* (cannabifolia), Hanfblättriger H.; hübsch | — | 40 | 3 | — |
| 6. — **laciniata**, Geschlitzter H.; sehr zierend V | — | 40 | 3 | * |
| 7. — linearis, *Hrt.*, Linienblättriger H.; eine eigenthümlich schöne Sorte, einzeln zu pflanzen | — | 40 | 3 | — |
| 13. — monstrosa, *Hrt.*; niedrige, sehr bizarre Form | — | 50 | — | — |
| b. 8. — pulverulenta, *Hrt.*; Weiss marmorirt, hübsch, VII | — | 50 | 4 | — |
| P. * 9. — **pyramidalis**, *Hrt.*; Pyramiden-H; Wuchs streng pyramidal, Blätter gekräuselt und sehr dunkelgrün, auffallend, wenig bekannt | — | 60 | 5 | — |
| 16. **Plantierensis**, *Sim.-Louis*; von kräftigster Vegetation, die in milden Wintern kaum unterbrochen wird | — | 50 | 4 | — |
| 3. **racemosa**, *L.*, Trauben-H,; blüht im Frühjahr, Früchte roth, sehr zierend, V | — | 40 | 3 | * |
| 10. rotundifolia, *Hrt.*, Rundblättriger H.; VII, VI | — | 40 | 3 | — |
| 19. semperflorens, *Hrt.*; Immerblühender H. | — | 75 | — | — |
| **Sophora**, *L.*, **Sophore**. | | | | |
| * 1. japonica, *L.*, Japanische S. | — | 60 | 5 | — |
| * 3. — albo var., *Hrt*, Weissbuntblättrige S.; constant | 1 | 50 | — | — |
| T. * 2. — pendula, *Hrt.*, Trauer-S. Hchst. M. 2 bis | 4 | — | — | — |
| **Sorbus**, *L.*, **Eberesche**. | | | | |
| a) **Echte Ebereschen** (Eusorbus). | | | | |
| 1. **americana**, *Willd.*, IV, V, mit korallenrothen Beeren M. 0,75 bis | 2 | — | — | * |
| 2. aucuparia, *L.*, Gemeine E.; IV, 2m. hoch | — | 50 | 4 | |
| 6. — Fifeana, *Hrt.*; mit schwefelgelben Früchten | — | 75 | 6 | — |
| 30. — fr. luteo, *Hrt.*, Gemeine gelbfrüchtige E.; | — | 75 | 6 | — |
| T. 3. — pendula, Trauer-E. M. 0,75 bis | 2 | 50 | 6—22 | — |
| T. b. 4. — — fol. var., Buntblättrige Trauer-E. M. 1 bis | 2 | 50 | — | — |
| 32. — saturejaefolia, *Hrt.*; gelbfrüchtig | — | 75 | 6 | — |
| 31. macrantha. *Hrt.*; grossblumig | — | 75 | 6 | — |
| 8. **micrantha**, *Dum.*; Fr. grossdoldig mit zahlreichen kleinen korallenrothen Beeren | — | 75 | — | — |
| b) **Mehlbirnen** (Aria). | | | | |
| 10. Aria (Crataeg.), *L.*, Gemeine Mehlb.; schön graugrün belaubt, IV, V, M. 0,60 bis | 2 | 25 | 5—20 | — |
| 14. — quercoïdes, *Hrt.*, Eichenblättrige Mehlb. | — | 75 | 6 | — |
| 15. — **tomentosa**, *Hrt.*; junge Blätter silberweiss | — | 75 | — | — |
| 16. graeca, *Lodd.*; mit grünen Früchten | — | 75 | — | — |
| 13. **hybrida**, (S. intermedia) *Pers.* = Crat. fennica, *Kalm*), Bastard-Eb.; von sehr schöner Belaubung und pyramidalem Wuchse, IV, 0,75 bis | 2 | 50 | 6—22 | — |

| | p. St. ℳ | p. St. ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Sorbus** *L.*, **Eberesche.** | | | | |
| 11. latifolia (Crat.), *Lam.* (Pirus latifolia, *Hrt.*), Breitblättrige Mehlb. ........ | — | 60 | 5 | — |
| 17. — atrovirens, *Bth. Cat.*; mit grossen auffallend dunkelgrünen Blättern | — | 75 | 6 | — |
| 12. — obtusata (Crat.) *Spach*, Stumpfblättrige Mehlb. ................ | — | 75 | 6 | — |
| c) **Aronien** (Apfelbeeren, Schwarzbirnen). | | | | |
| Sträucher, nicht hoch wachsend, mit einfachen, im Herbst sich roth färbenden Blättern. | | | | |
| 20. arbutifolia (Mespil) *L.* (Aronia pirifolia, *Pers.*, Amelanchier chinensis, *Hrt.*) | — | 50 | 4 | — |
| 22. heterophylla (Azarolus), *Borkh.* (Sorb. spuria, *Pers.*, Aronia sorbifolia, *Spach*); ................ ℳ 0,75 bis | 2 | — | — | — |
| 23. melanocarpa (Pirus), *Willd.* (Aronia arbutifolia, *Pers.*), Schwarzfrüchtige A. | — | 40 | 3½ | — |
| **Spiraea**, *L.*, **Spierstrauch** (Spiräe) ........ (20 Sorten à 1 St. 6 ℳ) | | | | |
| Die Farbe der Blüthen ist bei jeder einzelnen angegeben. (w. = weiss, wl. = weisslich, r. = roth, ros. = rosa). | | | | |
| a) **Im Frühjahr blühend.** | | | | |
| wl. 84. amurensis, *Max.*, Amur-Sp.; VI ................ | — | 40 | 3 | * |
| wl. 86. — **vera**, Neuer von Amur; aus der Gruppe der opulifolia ...... | — | 50 | 4 | — |
| w* 26. Cantoniensis, *Lour.* (Sp. Reevesii, *Lindl.*, Sp. Humanni, *Hrt.*); VII, VIII | — | 40 | 3 | * |
| w. 85. — fl. pl., *Hrt*; hübsch ................ | — | 50 | 4 | — |
| wl. 27. capitata, *Prsh* (?), Kopfblüthiger Sp. ................ | — | 40 | 3 | * |
| w. 6. **chamaedryfolia**, *L*; Gamanderblättriger Sp.; Laub hellgrün, VII, VI. ........ | — | 30 | 2½ | * |
| w. 7. **confusa**, *Rgl.*, Gemeiner Sp.; VI ................ | — | 25 | 1½ | * |
| w. 42. hypericifolia, *L.* (= sibirica, *Hrt.*), Johanniskrautblättriger Sp.; ........ | — | 30 | 2 | — |
| w. 15. — **thalictroides**, *Pall.*; die Blumen bedecken die Zweige der ganzen Länge nach, VII, VIII, sehr schön! ........ | — | 30 | 2 | * |
| w. 29. **laevigata**, *L.*, Glattblättriger Sp.; grossblättrig und dunkelgrün ........ | — | 50 | 3½ | — |
| w. 19. Nicoudierti, *Bosse*; VII, schön ................ | — | 30 | 2½ | * |
| wl. 20. opulifolia, *L.*, Schneeballblättriger Sp; V ................ | — | 25 | 1½ | * |
| wl. 21. — — **latea**, *Hrt.*; goldblättrig ................ | — | 40 | 3 | * |
| wl. 53. — nana, *Hrt.*; ................ | — | 50 | — | — |
| wl. 44. **sorbifolia**, *L.*, Ebereschenblättriger Sp. ................ | — | 40 | 3 | — |
| w. 28. **prunifolia pl.**, *S. u. Z.* Gefüllter pflaumenblättriger Sp.; VI, sehr schön | — | 40 | 3 | * |
| w* 32. **Thunbergi**, *S. u. Z.*; feinblättrige hübsche Art, wird vielfach getrieben | — | 40 | — | — |
| w. 24. **trilobata**, *L.* (Sp. aquilegiaefolia Van Houttei, *Hrt.*), Dreilappiger Sp.; sehr schöner Vorstrauch, VII, VIII ........ | — | 40 | 3 | * |
| b) **Im Sommer blühend.** | | | | |
| wl. 1. alba, *Dur.*, Weisser Sp.; VI, VII ................ | — | 30 | 2½ | * |
| wl. 2. **ariaefolia**, *Sm.*, Mehlbirnblättriger Sp.; V, Blüthen in grossen Rispen, ausserordentlich schön ................ | — | 50 | 4 | — |
| r. 33. bella coccinea, *Hrt*; Rother schöner Spierstr. ................ | — | 40 | 3 | — |
| ros. 3. Bethlehemensis rubra, *H.*; VII ................ | — | 25 | 1½ | * |
| r. 4. **Billardii**, *Hrt.*, Billard's Sp.; schön roth, VI ................ | — | 25 | 1½ | * |
| r. 47. californica, *Hrt.*, Kalifornischer Sp.; ähnlich tomentosa, VII ........ | — | 35 | 3 | — |
| r. 5. **callosa**, *Thunb.* (Fortunei *Planch.*) Prächtiger Sp.; VI, VII, junge Triebe roth, schön ................ | — | 25 | 1½ | * |
| w. 25. — **alba**, *Hrt.*; den ganzen Sommer hindurch blühend, sehr gut für niedrige Einfassungen ........ | — | 25 | 1½ | * |
| r. 49. — atrosanguinea, *Hrt.*; dunkelroth ................ | — | 50 | 4 | — |
| ros. 48. — macrophylla, *Hrt.*; viel grossblättriger als callosa ........ | — | 35 | 2½ | — |
| ros. 39. — **superba**, *Hrt.*; sehr grossdoldig, hellrosa, anhaltend blühend | — | 35 | 2½ | * |
| w.* 30. canescens, *Don.* (Sp. cuneifolia, *Wall* = nepalensis, argentea oder nivea, *Hrt.*); vom Himalaya ................ | — | 40 | 3 | — |
| r. 41. Douglasii, *Hook*, Douglas' Sp. ................ | — | 40 | — | — |

| | p. St. ℳ | p. St. ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Spiraea.** | | | | |
| r. 9. **Douglasii Sanssouciana**, *C. Koch* (Sp. Nobleana, *Hook.*); VII, VI, reichblühend | — | 35 | 3 | * |
| ros. 10. — pachystachys, *Hrt.*; mit grossen Dolden, VIII, VII | — | 30 | 2 | * |
| r. 11. eximia, *Hrt.*, Ausgezeichneter Sp.; VII | — | 35 | 3 | — |
| w. 31. expansa nivea alba, *Hrt.* (= nivea alba = nivea, *Hrt.*); | — | 40 | 3 | — |
| ros. 12. flexuosa, *Hrt.*; mit hin- und hergewundenen Zweigen | — | 35 | 3 | — |
| wl. 13. Fontenaysi alba; in grossen Rispen blühend, VI | — | 30 | 2½ | * |
| ros. 14. **Fortunei semperflorens**, *Hrt.*; sehr reichblühend, VII | — | 30 | 2½ | * |
| ros. 52. Foxii, *Hrt.*; ähnl. callosa superba, aber noch grossblumiger | — | 50 | 4 | — |
| w. 46. grossulariaefolia, *Hrt.*, Stachelbeerblättriger Sp.; ein ganz niedriger Strauch, zur Vorpflanzung geeignet | — | 35 | 3 | — |
| wl. 16. lanceolata, *Borkh.*, Lanzettblättriger Sp. | — | 35 | | — |
| wl. 17. latifolia, *Borkh.* (Sp. Bethlehemensis alba, *Hrt.*), in lockeren grossen Rispen blühend, VI, VII | — | 30 | 2½ | * |
| wl. 43. Lenneana, *Hrt.*, Lennés Sp.; ähnlich der vorigen | — | 35 | 2½ | — |
| wl. * 18. Lindleyana, *Wall.*, Lindley's Sp.; mit hellgrünen gefiederten Blättern, schön | — | 40 | 3 | — |
| ros. * 22. pruinosa, *A. M.*, Bereifter Sp.; mit graugrüner kräftiger Belaubung, VI, VII | — | 30 | 2½ | * |
| ros. 54. Regeliana, *Hrt.* ? = Fortunei semperflorens | — | 30 | 2½ | — |
| ros. 55. **syringaeflora**, *Hrt.*; Abart von Sp. callosa, niedrig bleibend und sehr reichblühend | — | 40 | 3½ | — |
| r. 45. tomentosa, *L.*, Filziger Sp.; Blätter graugrün, Blüthen schön roth, VII | — | 35 | 2½ | * |
| **Staphylaea**, *L.*, **Pimpernuss.** | | | | |
| 3. colchica, ? *Stev.*, Kolchische P. | — | 60 | — | — |
| 1. pinnata, *L.*, Gefiederte P.; VI, Zweige grün | — | 40 | 3 | * |
| 2. trifolia, *L.* (St. trifoliata, *H.*), Dreiblättrige P.; VI, VII | — | 40 | 3 | — |
| **Symphoricarpus**, *Juss.*, **Peterstrauch** (Schneebeere). | | | | |
| 1. montanus, *H. B. u. K.*, Gebirgs-Schneebeere; niedriger als Nr. 4 | — | 35 | 3 | — |
| 2. orbiculatus, *Mnch.* (S. vulgaris, *Mchx.*), Gemeiner Pet.; VI, VII, ein sehr guter Deckstrauch | — | 30 | 2 | * |
| b. 3. orbiculatus **fol. var.**, *Hrt.*; goldbunt gerandet; sehr zierlich, VII | — | 40 | 3 | * |
| 4. **racemosus**, *Mchx.*, Schneebeere (Wachsbeere), sehr zierend durch seine weissen Früchte; VI | — | 30 | 2 | * |
| **Syringa**, *L.* **Flieder** .... 12 Sorten à 1 St. 8 ℳ | | | | |
| 10. Emodi, *Wall.* Himalaya-F.; | — | 75 | — | — |
| 1. **Josikaea**, Jacq., Josika-F.; höchst auffallende Form mit grossen lederartigen dunklen Blättern und dunkelblauen Blüthen, spätblühend; V | — | 60 | 5 | — |
| 2. oblata, *Lindl.*, Rundblättriger Fl. aus China. Blüht am Frühesten | — | 75 | — | — |
| 3. persica, *L.*, Persischer F.; VII, VIII, helllila | — | 40 | 3½ | * |
| 4. — alba, *Hrt.*, Weisser pers. F. | — | 50 | 4 | — |
| 5. — laciniata, *Mill.*, Geschlitzter pers. F.; VIII, VII | — | 50 | 4 | — |
| 6. **Rothomagensis**, *Rnlt.* (S. chinensis, *Willd.*), Chinesischer F.; VI, lila | — | 40 | 3 | * |
| — stark, 1½ m. hoch | — | 60 | 5 | * |
| 7. — alba, *H.*; Weisser chin. F.; VI | — | 50 | 4 | * |
| 9. — Metensis, *Hrt.*; grossblumiger als Nr. 7. | — | 75 | — | — |
| 8. — **rubra**, *Lodd.* (S. Saugeana, *H.*), Rother chin. Fl.; von allen Fliedern der rötheste, schön! | — | 50 | 4 | * |
| 20. vulgaris, *L.*, Gemeiner F.; lila; V | — | 30 | 2½ | * |
| — sehr stark, 2 m. hoch | — | 60 | 5 | * |
| 21. — alba, Weisser gem. F.; V | — | 40 | 3½ | * |
| 49. — pyramidalis | — | 75 | 6 | — |
| 50. — Aline Mocqueris; dunkelroth, grosser Strauss | — | 75 | 6 | — |
| 24. — **amoena**, grossblumig, Knospen purp. | — | 75 | — | — |
| 25. — azurea pl.; gefüllt dunkelblau | — | 75 | 6 | — |
| 28. — Croix de Brahy; lilarosa, grossdoldig | — | 75 | 6 | — |
| 29. — **Dr. Lindley**, lilarosa, Knospe purpur-lila, sehr schön! | — | 75 | — | — |
| 30. — Dr. Nobbe; helllila, früh, sehr voll, Rispe kurz | — | 75 | — | — |
| 31. — **Eckenholm**; blau, Knospe dunkel, Rispe lang, der blauste! | — | 60 | 5 | — |
| 32. — Erzherzog Johann | — | 75 | — | — |
| 33. — Géant de batailles (Schlachtenriese), roth | — | 75 | — | — |
| 52. — **Gloire de Moulins**; Knospen lebhaft rosa, enormer Strauss | — | 75 | 6 | — |
| 34. — **Goliath**; neuere Sorte mit grosser Blüthendolde | — | 75 | — | — |
| 35. — hybrida; dunkellila, Knospen sehr dunkel | — | 75 | — | — |

| | p. St. ℳ | p. St. ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Syringa,** *L.*, **Flieder.** | | | | |
| 36. vulgaris Justii | — | 75 | 6 | — |
| 39. — **lilarosa**; grossdoldig | — | 50 | 4 | * |
| 37. — Lovaniensis, Löwener Fl.; blass rosa | — | 60 | 5 | * |
| 38. — Madame Kreuter; purpur, stammt vom Marly-Fl. ab | — | 75 | 6 | — |
| 59. — **Marie Legraye** (*V. Htte.*); enorm grosser weisser Strauss, nach der Beschreibung der prachtvollste aller Flieder. junge Hochst. | 2 | — | — | — |
| 60. — **Marliensis**, *Hrt.*, Marly-Fl.; purpur | — | 75 | — | — |
| 40. — — **pallida**, Blasser Marly-Fl.; fleischfarbig rosa | — | 75 | 6 | — |
| 41. — nigricans, Schwärzlicher Fl., neu | — | 75 | — | — |
| 54. — Princesse Marie; sehr hell lila | — | 75 | 6 | — |
| 43. — rubra; beim Aufblühen purpur | — | 50 | 4 | — |
| 57. — **rubra insignis**; purpur | — | 75 | 6 | — |
| 27. — **rubra major (Charles X)**; purpur | — | 60 | 4½ | * |
| 45. — **rubra Trianoniana**; dunkel purpur | — | 75 | 6 | — |
| 55. — **Schneelawine**; weiss, dichter Strauss | — | 75 | — | — |
| 48. — Triomphe d'Orléans; Knospe purpur rosa, innen lilarosa | — | 75 | 6 | — |
| 46. — **Valentiana**, Knospen lebh. roth | — | 60 | 5 | — |
| 47. — **Versaliensis**, Versailler Fl.; Knospen dunkelroth | — | 75 | 6 | — |
| **Hochstämme** (1—1,60m. Stammhöhe) von den Nr. 1. 6. 20 . . . ℳ 0,80 bis | 1 | 50 | 7—12 | * |
| do. 8. 9. 24. 25. 35. 47. 52. 55. 57 . . . ℳ 1 bis | 1 | 75 | 9—15 | * |
| **Tamarix,** *L.*, **Tamariske**; Laub nadelartig, sehr zierlich, zu Bouquets gut zu verwenden. | | | | |
| * 2. gallica, *Hrt.*; Laub graugrüner | — | 30 | 2½ | * |
| 6. japonica plumosa, *Hrt.* | — | 50 | — | — |
| * 1. tetrandra, *Pall.* (T. parviflora, *D. C.*); rosa blühend, schön V (die härteste) | — | 30 | 2½ | * |
| **Tecoma,** *Juss.*, **Tekoma** (Bignonie); | | | | |
| §* 1. radicans (Bignonia) *L.*, Wurzelnde T.; sehr schön blühend, für warme Wände | — | 60 | 5 | — |
| **Tilia**; *L.*, **Linde** (siehe auch Alleebäume) . . . 12 Sorten à 1 St. 12 ℳ | | | | |
| 1. alba, *Ait.* (T. americana pendula, *Hrt.*) Amerikanische Silber-L.; Zweige etwas hängend, Blätter unterseits grauweiss, II, III | 1 | 25 | — | — |
| T. 21. — **petiolaris**, *Hrt.* (= tomentosa pet., = alba pendula, *Hrt.*), Trauer-Silberlinde . . . ℳ 1,25 bis | 6 | — | 11—50 | — |
| 2. **americana**, *L.*, Amerikanische Linde; **ächt!** grossblättr., hellgrün, m. weisser Rinde. III, II . . . ℳ 1,25 bis | 3 | — | 11—25 | — |
| 3. **americana laxiflora**, *Loud.*, Lockerblüthige amerik. L.; ausserordentlich grossblättrig, III . . . ℳ 1,50 bis | 3 | 50 | 12—30 | — |
| 36. — **pyramidalis**, *Hrt.*; die schnellwüchsigste unter den amerikanischen Arten | 1 | 25 | 11 | — |
| 4. begoniaefolia, *Hrt.*, Begonienblättrige L.; pyramidal . . . ℳ 1 bis | 3 | 50 | 9—30 | — |
| 5. corallina, *Hrt.*, Rothzweigige L.; | 1 | — | — | — |
| 6. **euchlora**, *C. Koch* (T. dasystyla, *Loud.*). Krim-L. III, II. Wenn auch die Blätter dieser Linde nur mittelgross sind, so ist dieselbe dennoch die schönste ihres Geschlechts durch die dunkelgrüne Farbe ihrer sehr haltbaren Blätter und durch ihren kräftigen schlanken Wuchs ℳ 1 bis | 6 | — | 9—50 | * |
| 7. flavescens, *A. Br.?*, Gelbliche L. . . . ℳ 1 bis | 3 | 50 | — | — |
| 8. floribunda, *A. Br?*, Reichblühende L. | 1 | 25 | 11 | — |
| 9. gigantea, *Hrt.*, Riesige L. ähnlich macrophylla, sehr grossblättrig; 1,25 bis | 4 | — | 11 | — |
| 30. **hybrida superba**, *Hrt.*; grossblättrig, dunkel belaubt . . . ℳ 1,25 bis | 3 | — | 11—25 | — |
| 11. longifolia dentata, *Hrt.*, Gezähnte langblättrige L. . . . 1,25 bis | 3 | — | 11 | — |
| * 12. **macrophylla** *Hrt. b. B.*, (T. pubescens, *Ait.*), III, Amerikanische grossblättr. L.; sehr grossblättrig . . . ℳ 1,25 bis | 8 | — | 11 | — |
| 13. mississippensis, *Hrt.*; sehr grossblättrig | 1 | 25 | — | — |
| 14. mutiflora, *Vent.*, Vielblumige L. . . . ℳ 1 bis | 3 | — | — | — |
| 16. platyphyllos, *Scop.*, Gemeine grossblättrige L. oder Sommer L. 1½—2m. hoch | — | 75 | 6 | * |
| 17. — aurea, *Hrt.*, Goldzweigige L. | 1 | 25 | 11 | — |
| 25. — asplenifolia, *Hrt.*, Farrnblättrige L.; zierlich | 1 | 50 | — | — |
| 18. pubescens, *Hrt.* Weichhaarige L. | 1 | 25 | 11 | — |
| 19. **tomentosa**, *Mnch.* (T. alba, *W. et K.*, T. argentea, *D. C.*), Ungarische Silber-L.; weisser als »alba« IV . . . ℳ 1 bis | 12 | — | — | — |
| 22. ulmifolia, *Scop.*, Kleinblättrige L.; . . . 1½—2m. h. | — | 75 | 6 | * |

| | | pr St. M. | pr St. ₰ | 10 St. M. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Tilia.** | | | | |
| 29. | vulgaris, *Hayne* (= intermedia, *D. C.*), Gemeine oder Zwischen-L.; Aechte Holländische L.; Was in Deutschland als solche gewöhnlich verbreitet ist, ist weiter nichts als T. platy phyllos ........ M 0,75 bis | 6 | — | — | — |
| | **Ulmus** *L.*, **Rüster** (Ulme) ........ 12 Sorten à 1 St. 10 M | | | | |
| 28. | **americana**, *L.*, Aechte amerikanische R.; mit hellgrünem Laube, in den meisten Baumschulen falsch! Starkwüchsig ........ M 1 bis | 4 | 50 | — | — |
| 1. | antarctica, *Hrt.*, Zierliche R.; IV ........ | 1 | — | 9 | — |
| b. 2. | — **aurea**, *A. M.*; goldfarbig, sehr effectvoll ........ M 1 bis | 1 | 50 | 9 | — |
| 63. | **betulaefolia nigrescens**, *Hrt.*; siehe Neuheiten. | | | | |
| 3. | campestris, *L.*, Feld-R.; II ........ 2m. hoch | — | 50 | 4 | * |
| 39. | — **Berardi** *Hrt.*; diese Art zählt wohl mit ihrem feinen scharf gezähnten Laube zu den schönsten ihrer Gattung ........ | 1 | — | 9 | — |
| 4. | — cucullata, *Hrt.*, Kappenförmige F.-R.; Blätter eigenthümlich kraus ........ | 1 | — | — | — |
| b. 5. | — fol. arg. marg., *Hrt.*, Weissrandige F.-R.; sehr schön im Halbschatten ........ | 1 | — | 8 | — |
| b. 6. | — fol. arg. var., *Hrt.*, Weissbunte F.-R.; Blätter marmorirt ........ | 1 | — | 9 | — |
| 61. | — **fol. rubris**, *Hrt.*; ähnlich purpurea, aber kleinblättriger; **neu!** | 1 | 25 | 10 | * |
| 52. | — microphylla, *Hrt.*, Kleinblättrige Feld-R.; sehr hübsche buschige Pflanze für Lauben und hohe Hecken ........ | — | 50 | 4 | — |
| b. 53. | — **myrthifolia purpurea**, siehe Neuheiten. | | | | |
| 50. | — **umbraculifera** siehe Neuheiten. | | | | |
| b. 41. | — **punctata**, *Hrt.*; stark weiss marmorirt ........ M 1 bis | 1 | 50 | 8 | — |
| P. 42. | — pyramidalis, *Hrt.*; Pyramiden Feld-R.; ........ M 1 bis | 2 | — | 9 | — |
| * 30. | chinensis, *Pers.* (= parvifolia, Jacqu = camp. chinensis, *Loud.*); feine scharf gezähnte freudig grüne Belaubung ........ | 1 | — | — | — |
| 7. | Cornubiensis, *Loud.*, R von Cornwallis ........ | 1 | — | — | — |
| 64. | **corylifolia purpurea**, *Hrt.*; siehe Neuheiten. | | | | |
| 38. | **effusa**, *Willd.* (U. laevis, *Pall*), Bast.-R.; II. ........ 2m. h. | — | 50 | 4 | * |
| P. 13. | **fastigiata Dampieri**, *Hrt.* Dampier's Pyramiden-R.; sehr schön pyramidal ........ | 1 | — | 9 | — |
| b. 55. | — — **Wredei**, siehe vorn unter den Neuheiten | | | | |
| 31. | fulva *Mchx.*; langblättrig, gross u. hell belaubt; **ächt!** ........ | 1 | — | 8 | — |
| * 20. | gigantea (montana gigantea), Riesige R.; sehr grossblättrig IV ........ M 1 bis | 3 | — | 9 | — |
| 21. | glabra Scampstoniensis, *Loud.*, Glatte Scampston-R. ........ " 1 bis | 2 | 50 | 9 | — |
| * 22. | — sibirica, *Hrt.*, Glatte sibirische R.; hellgrün ........ | 1 | — | — | — |
| T. 23. | **horizontalis**, *Hrt.*, Wagerechte Trauer-R.; schirmartig hängend. M 1 bis | 3 | 50 | — | — |
| 65. | latifolia nigricans, *Hrt.*; s. Neuheiten! | | | | |
| 54. | **macrophylla**, *Chaillou et Tréfoux*; von den grossblättrigen die starkwüchsigste, **Neu!** ........ M 1 bis | 2 | — | 9 | — |
| T. 8. | **microphylla pendula**, *Hrt.*, Kleinblättrige Trauer-R. ........ M 1 bis | 3 | 50 | — | — |
| 44. | modiolina, *Hrt.* (Tortillard der Franzosen); in Frankreich vorzugsweise als Alleebaum verwandt ........ M 1 bis | 2 | 50 | 8 | — |
| 12. | montana, *Bauh.* (= scabra, *Mill.* = corylifolia, *Hrt.* = americana, *Hrt.* = fulva, *Hrt.*), Grossblättrige oder schottische R.; ........ | — | 60 | 5 | — |
| 14. | montana crispa, *Loud.*, Schottische krause R.; eigenthümlich, V .. M 1 bis | 2 | 50 | 8 | — |
| P. 15. | — **fastigiata**, *Loud.* (U. **exoniensis**, *Hrt.*) Schottische Pyramiden-R., 1—2½m. hoch M 1 bis | 2 | 50 | 8—20 | * |
| P. 43. | — fastigiata glabra, *Hrt.*, Glatte Pyramiden-R.; ........ M 1 bis | 2 | — | 9 | — |
| 45. | — monstrosa, *Hrt.*; mit breiten Zweigen ........ | 1 | — | 9 | — |
| 16. | — nana, *Hrt.*, Zwerg-R.; ........ | 1 | 25 | — | — |
| 47. | — **nigra**, *Hrt.*; Blätter gross und sehr dunkelgrün ........ M 1 bis | 2 | — | 9 | — |
| T. 19. | — **pendula**, *Hrt.*; Aechte T.-R.; Zweige senkrecht hängend M 1,25 bis | 6 | — | 11—50 | * |
| 48. | — serpentina, *Hrt.*; Zweige spiralförmig gewunden, theils herabhängend | 1 | — | 9 | — |
| b. 57. | — tricolor, *Hrt.*; Dreifarbige ........ | 1 | — | 9 | — |
| 9. | **monumentalis**, *Rz.*, Kugelförmige Feld-R.; sehr schön! ........ M 1 bis | 2 | — | 9 | — |
| 24. | **Pittersii**, *Hrt.*, Pitters' R.; m. grossen rundlichen Blättern, II, III, starkwüchsig ........ M 1 bis | 3 | — | 8 | — |
| 25. | purpurea, *Hrt.*, Purpur-R., Blätter bräunlich II ........ M 1 bis | 3 | 50 | 8 | — |
| 10. | rugosa, *Hrt.*, Korkige Hänge-R. ........ M 1 bis | 3 | — | 8 | — |
| 69. | **sarniensis**, *Loud.* (= Wheatleyi, *Hrt.*); rundblättrige etwas pyramidale Abart von campestris, dunkelgrün belaubt ........ | 1 | — | 9 | — |
| 11. | suberosa alata, *Hrt.*, Geflügelte Kork-R.; Rinde sehr korkig, III. . M 1 bis | 3 | — | — | — |

| | pr. St. ℳ ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| **Ulmus** *L.*, **Rüster.** | | | |
| 70. tiliaefolia, *Hrt. Berol.*; Laub hell mit metallischem Reflex; | 1 — | 9 | — |
| 26. triserrata, *Hrt.*, hübsch grossblättrig ... ℳ 1 bis | 3 — | 8 | — |
| 27. **vegeta**, *Loud.*, Starkwüchsige R.; (Huntingdon-R.); grossblättrig, II, **ausserordentlich starkwüchsig** ... ℳ 1 bis | 5 — | 8 | * |
| 29. viminalis, *Loud.*, Weidenblättrige R. ... ℳ 1 bis | 2 50 | 8 | — |
| b. 51. **viminalis marginata**, *Hrt.*; reichbelaubt mit kleinen gelbbunten zierlichen Blättern. **Neu!** | 1 — | 9 | — |
| **Viburnum**, *L.*, **Schneeball** (Schlinge), | | | |
| 10. bullatum, *Hrt.* Blasiger S.; niedrig | — 75 | — | — |
| 1. dentatum, *L.*, Gezähnter S.; Laub glänzend grün, Beeren schwarz, VI | — 60 | 5 | — |
| * 2. edule, *Prsh.* Essbarer? S.; VI, ähnlich Nr. 4. | — 50 | 4 | — |
| 3. **Lantana**, *L.*, Wolliger Schneeb.; V, Blätter gross, graugrün | — 40 | 3½ | * |
| * 4. Opulus, *L.*, Gemeiner S. (Wilder S.) Blumen u. rothe Früchte zierend, V. | — 30 | 2 | * |
| * 5. — **roseum**, *L.* (V. Op. sterile, *Hrt.*) **Gefüllter S.** | — 40 | 3½ | * |
| — — **1—2m. hohe Stämme** ℳ 1 bis | 1 75 | 9—15 | * |
| 6. Oxycoccos, *Prsh.*, Moosbeerartiger S.; V., Beeren roth | — 60 | — | — |
| 16. pirifolium, *Prsh.*? Birnblättrige S. | — 50 | 4 | — |
| * 13. plicatum, *Miqu.* (= tomentosum, *Thnb.*); 1jähr. Veredl. | — 75 | — | — |
| 7. **prunifolium**, *L.*, Pflaumenblättriger S.; schön belaubt, VI | — 60 | — | — |
| * 8. **pygmaeum**, *Bth. C.*, Zwerg-S.; von gedrängtem Wuchs, III | — 50 | — | — |
| **Vinca**, *L.*, **Sinngrün** (Immergrün). | | | |
| 4. major fol. albo marg.; grossblättrig, weissgerandet | — 25 | 2 | * |
| 2. minor fl. albo; kleinblättrig, weissblühend | — 25 | 2 | * |
| 1. — fl. azureo; himmelblau | — 25 | 2 | — |
| 5. — fl. azureo pl.; gefüllt blau | — 50 | — | — |
| 3. — fl. purpureo pl.; purpur, gefüllt | — 35 | 3 | — |
| **Virgilia** s. Cladrastis. | | | |
| ***Vitex Agnus castus**, *L.*, Gemeiner **Keuschbaum** | — 60 | 5 | — |
| § **Vitis**, *L.*, **Wein** (Rebe); fast alle folgenden Sorten halten an einer Wand unsere Winter gut aus u. eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Landhäusern, Lauben etc. (Siehe f rner die amerikanischen Weine unter Obst.) | | | |
| 277. amurensis, *Maack.*, Amur Wein | — 75 | — | — |
| * 503. elegans, *Koch*, zierlicher bunter W. | — 60 | — | — |
| * 509. **hederacea** (Ampelopsis), *Hrt.*, **Aechter Klimmer**; braucht nicht angebunden zu werden, sondern klimmt wie der Epheu | — 60 | 5 | — |
| * 525. — minor, *Hrt.*; | — 60 | — | — |
| 279. **hirsuta** (Ampelopsis), *Donn.*, Rauher Jungfern-Wein; sehr schön dunkelgrün, grossblättrig ... ℳ 0,40 bis | — 75 | 3—7 | * |
| 520. humulifolia, *Hrt.*; ähnli h Regeliana, in allen Dimensionen kleiner | — 60 | — | — |
| * 522. indivisa, *Willd.* (= cordata, *C. Koch*); ungelappt, dünnblättrig | — 50 | 4 | — |
| * 280. **Labrusca**, *L.*, Fuchswein der nördl. Vereinigten Staaten; unterseits stark filzig; hart u. starkwüchsig | — 60 | 5 | — |
| * 276. **odoratissima**, *Donn.*, Wohlriechender W.; trägt keine Trauben | — 75 | 6 | * |
| * 49. palmata, *Vahl*, Handförmiger W; | — 75 | 6 | — |
| 500. **quinquefolia** (Ampelopsis) *Mchx.*, **Wilder Wein** (Jungfernwein); extra starke, 3 Mtr. lange Pflanzen mit 6—8 Ranken | — 75 | 6 | * |
| — ... starke über 2m. hoch | — 50 | 4 | * |
| — ... schwächere ca. 1m. hoch | — 30 | 2½ | * |
| 524. — serrata, *Hrt.*; scharf gezähnt | — 75 | — | — |
| 519. Regeliana *Hrt.*; Blätter m. bräunlichem Anflug, junges Holz behaart | — 60 | 5 | — |
| * 523. **riparia**, *Mchx.*, Uferwein; ähnlich odoratissima | — 60 | 5 | — |
| * 275. rotundifolia, *Mchx.* (V. vulpina Torr.) Büffel-W., Fuchswein der südlichen Staaten von N.-Amerika | — 60 | 5 | — |
| 278. rupestris, *Hrt.*; ähnlich Nr. 275, mehr gezackt | — 60 | — | — |
| **Weigela**, *Thunb.*, (**Diervilla** *Mill.*), Weigelie; ... 10 Sorten à 1 St. 5 ℳ sehr schön blühende Sträucher von 1—2m. Höhe, manche Sorten oft 2mal blühend. | | | |
| 6. amabilis, *Carr.* (coraeënsis, *Thunb.*), Liebliche W.; rosa, (Wuchs kräftig | — 40 | 3½ | * |
| * 7. — **alba**, *Hrt.*; im Verblühen blassrosa, sonst weiss | — 50 | 4 | — |
| * 29. Augusta, *Hrt.*; | — 60 | — | — |
| 8. **Desboisii**, *Hrt.*; rosa, kräftig, reichblühend | — 50 | 4 | — |

| | pr. St. ℳ | pr. St. ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Weigela.** | | | | |
| 30. Elisabeth *Hrt.*, ........................................ 1jähr. Pflanzen | — | 75 | — | — |
| 32. hortensis **gigantiflora**, *Hrt.*; sehr grossblumig ........................ | — | 75 | — | — |
| 38. — **gratissima**, *Hrt.*; hell rosa, reichblühend, ........ 1jähr. Pflanzen | — | 75 | — | — |
| 23. — **nivea**, *Hrt.*; rein weiss ........................................ 1jähr. | — | 75 | — | — |
| 24. — rubra fol. aureo marg., *Hrt.*, ........................................ 1jähr. | — | 60 | — | — |
| 41. hybrida J. Wittwer; violettes carminrosa, in Trauben von 10—20 Blumen 1jähr. | — | 75 | — | — |
| 36. — **Lavallei**, *Hrt.*; dunkelpurpur ........................................ | — | 75 | — | — |
| 42. — Pêcheur fils; violettes weinroth ........................ 1jähr. | — | 75 | — | — |
| 14. intermedia, *Hrt.*; rosa kräftig ........................................ | — | 50 | 4 | — |
| 33. Isoline, *V. Htte*; weiss in rosa übergehend ........................ | — | 60 | — | — |
| 15. Madame Couturier, *Hrt.*, gelblich weiss in rosa übergehend ........ | — | 50 | 4 | * |
| 31. — **Lemoine**, *Hrt.*; hellrosa, dunkler werdend ........................ | — | 60 | 5 | — |
| 16. Monsieur Dauvesse, *Hrt.*; fleischfarben rosa ........................ | — | 50 | 4 | * |
| 18. rosea, *Lindl.*, Rosenfarbige W.; rosa, gedrungener Wuchs ........ | — | 40 | 3½ | * |
| 28. — multiflora, *Hrt.*; ........................................ | — | 60 | 5 | — |
| b. 39. Sieboldi fol. arg. marg.; schwach gelblich panaschirt ........ | — | 60 | — | — |
| 19. **Stelzneri**, *Hrt.*; dunkelroth, remontirt gewöhnlich ........ | — | 50 | 4 | — |
| 20. **Van Houttei**, *Hrt.*; rosa kräftig ........................................ | — | 50 | 4 | * |
| 34. venosa, *Hrt.*; dunkelrosa mit weiss gestreift ........................ | — | 60 | 5 | — |
| 21. **Verschaffelti**, *Hrt.*; rosa, kräft. ........................................ | — | 50 | 4 | * |
| 12. versicolor, *S. et Z.* (= japonica, *Thnb.*); rosa in dunkel übergehend ........ | — | 50 | 4 | — |
| § **Wistaria**, *Nutt.*, **Wistarie (Glycine).** | | | | |
| 1. magnifica, *H. gall.*; mit hellblauen Blüthen ........................ ℳ 1 bis | 1 | 50 | 8—13 | — |
| 2. **chinensis**, *Sims.*, Chinesische W.; eine prachtvolle Schlingpflanze mit langen blauen Blüthentrauben im Frühjahr, erfriert an geschützten Stellen nicht ........................ ℳ 1,25 bis | 2 | — | — | — |
| 6. — **fl. pl.**, *Hrt.*; **Neuheit!** ........................ 1jährige Veredlungen | 1 | — | — | — |
| **Xylosteum** s. Lonicera Xylosteum. | | | | |
| △ **Yucca**, *L.*, Palmenlilie. | | | | |
| 1. recurvifolia, Salisb. (= **recurvata**, *Hrt.*); hält unter trockener Bedeckung unsere Winter aus; ........................ 40—60cm. hohe Pflanzen ℳ 1 bis | 1 | 50 | 9—14 | — |

# B. Nadelhölzer (Coniferae).

*Meine Coniferen sind sämmtlich mehrmals verpflanzt und werden mit Ballen versendet, was ein sicheres Anwachsen befördert.*

| | pr. St. ℳ | pr. St. ₰ | 10 St. ℳ | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Abies**, *L.*, **Tanne, Fichte**; *Abietaceae.* | | | | |
| a) Tanne (Edel- oder Weisstanne), Picea, *Don.* | | | | |
| 2. balsamea (Pic.), *Loud.*, Balsam-T. 0,60—1,50 m. hoch ........................ ℳ 1,50 bis | 2 | 50 | 13—20 | — |
| 10. Fraseri (Pinus) *Pursh.*. Fraser's Edel-T.; 1,20—1,80m. hoch ........ ℳ 4 bis | 8 | — | — | — |
| 4. nobilis, *Lindl.*, Amerikan. Edel-T.; 80—90 cm. hoch ........ ℳ 10 bis | 12 | — | — | — |
| 5. **Nordmanniana** (Pin.), *Stev.*, Nordmann's Edel-T.; eine ausgezeichnete harte Art aus dem Kaukasus, die an Schönheit keiner Conifere nachsteht ........................ 30—60 cm. hoch, 2 bis | 4 | 50 | 18—42 | * |
| — Prachtpflanzen 0,75—2m. hoch ........................ ℳ 6 bis | 20 | — | — | — |
| 6. pectinata (Picea) *Loud.*, Europäische Edel-T. .. 0,30—0,75m. h. ℳ 0,75 bis | 2 | — | — | — |
| 11. — pyramidalis. *Hrt.*; 30—40cm. h. ........................ | 1 | 75 | — | — |
| 7. Pinsapo, Boiss., Spanische Edel-T.; ........................ 20—25cm. h. | 1 | 75 | — | — |
| b) **Fichte, Abies**, *Don.* | | | | |
| 23. alba, *Mchx.* (Pinus laxa, *Ehrh.*), Weiss-F.; 30—45 cm. hoch ........ | — | 40 | 2½ | * |
| — 0,50—1,20m. hoch ........................ ℳ 0,50 bis | 1 | 50 | 4—18 | * |
| 31. coerulea, *Forb.*; Bläuliche F., 30—75cm. h. ........................ ℳ 0,50 bis | 1 | — | 4—9 | — |

| | pr. St. | | 10 St. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| | M | ₰ | M | |
| **Abies.** | | | | |
| 29. **Engelmanni**, *Parr.*; hart und sehr schön; 70 cm. hoch .......... | 18 | — | — | — |
| 22. **excelsa** (Pin.), *Lam.* (Pinus Abies, *L.*), Gemeine F., Rothtanne; die schönste der einheimischen Arten, 0,45 m.—0,55 m. hoch | — | 30 | 2 | * |
| — 0,60—0,75 m. h. .......... | — | 60 | 5 | * |
| — 0,80—0,90 m. h. .......... | 1 | — | 8 | * |
| — 1—1,20 m. h. .......... M 1,25 bis | 1 | 50 | 11—13 | * |
| — 1,30—2,50 m. h. .......... M 1,50 bis | 3 | — | 13—25 | * |
| 28. — pendula, *Hrt.* (exc. inverta, *Hrt.*;) hängend; 30—60cm. h. M 1,50 bis | 2 | 50 | — | — |
| 38. — pygmaea, *Hrt.*; zwergartig; 30 cm. h. .......... | 2 | — | — | — |
| 37. pyramidalis, *Hrt.*; pyramidal, 30—40 cm. h. .......... | 1 | 75 | — | — |
| 24. **nigra** *Desf.* (A Mariana, *Mill.*), Schwarz-T.; dunkel belaubt, niedriger als „excelsa", setzt jung schon Fruchtzapfen an, 60—90 cm. h. M 0,75 bis | 1 | 50 | 7—13 | — |
| — do. 1—1,50 m. h. .......... M 1,75— | 2 | 50 | — | — |
| 25. **orientalis** (Pin.), *L.*, Orientalische F.; Zweige dünn, dicht gestellt, sehr hübsch, 30—45 cm. h. .......... M 1 bis | 1 | 50 | 9—13 | * |
| do. 50—80 cm. hoch .......... M 1,75 bis | 2 | 50 | 15 | — |
| 21. rubra, *Poir.*, Rothe F.; 30—75 cm. h. .......... M 0,50 bis | 1 | 25 | 4—11 | * |
| 26. Sitchensis (Pin.), *Bong.* (A. Menziesii, *Loud.*), Sitcha F.; aus Nordwest-Amerika, 0,60—1,80 m. hoch .......... M 2,50 bis | 9 | — | — | — |
| c) **Hemlockstanne**, Tsuja, *Endl.* | | | | |
| 40. canadensis (Pin.), *L.*, Kanadische *H.*, 1,20—1,80 m. hoch .......... M 4 bis | 8 | — | 36—50 | — |
| **Biota**, *Don*, **Morgenländischer Lebensbaum**; Cupressaceae. | | | | |
| 4. compacta, *Hrt.* (Th. orientalis nana, *Hrt.*); grasgrün, von gedrungenem Wuchse, 25—45 cm. h. .......... M 0,60 bis | 1 | — | 5—9 | — |
| 9. filiformis, *Hrt.*; höchst eigenthümlich! 45—60 cm. hoch .......... M 1 bis | 2 | — | — | — |
| **Chamaecyparis** s. Cupressus. | | | | |
| **Cupressus**, *L.*, **Cypresse**; Cupressaceae. | | | | |
| 1. Lawsoniana, *Murr.* (Chamaecyp. Boursieri, *Carr.*) 30 cm. h. .......... | — | 75 | 6 | — |
| 3. — erecta, *Hrt.* (= stricta); aufrecht 40—60 cm. h. .......... M 1,25 bis | 2 | — | — | — |
| 9. nutkaënsis glauca, *Hrt.* Blaugrüne Nutka-Cypr. 30—45 cm. h. M 1,25 bis | 2 | — | 11—18 | — |
| 11. pisifera (Chamaecyp.), *S. u. Z.*, Erbsenfrüchtige C.; schön u. hart 30 cm. bis 1,50 m. hoch .......... M 1 bis | 9 | — | 8—18 | — |
| 12. plumosa (Retinospora), Veitch; 25 cm. h. .......... | 1 | — | — | — |
| 18. — aurea, *Hrt.* 0,15—0,50 m. hoch .......... M 1,25 bis | 4 | — | — | — |
| **Ephedra**, *L.*, **Meerträubel**; Gnefaceae. | | | | |
| 1. distachya, *L.*, Zweiähriges M.; strauchartig. 0,30—0,60 m. h. M 1 bis | 1 | 75 | — | — |
| **Gingko**, *L.*, **Gingko** (Salisburie); Taxaceae. | | | | |
| 1. biloba, *L.*, Zweilappiger G. 0,30—0,45 m. h. .......... M 0,75 bis | 1 | — | — | — |
| **Juniperus**, *L.*, **Wachholder, Sadebaum**; Cupressaceae. | | | | |
| 11. chinensis, *L.*, Chinesischer Sadeb. 0,30—0,90 m. h. .......... M 0,75 bis | 2 | 50 | — | — |
| 13. — mascula, *Hrt.*; 0,30—0,90 m. h. .......... „ 0,75 bis | 2 | 50 | — | — |
| 2. **communis suecica**, *Mill.*, Schwedischer W.; pyramidal. Schöne Pyramiden, 0,60 m.—1,50 m. hoch .......... M 1 bis | 3 | 50 | 9—30 | — |
| 4. excelsa, *Hrt.*; blaugrün 30—45 cm. h. .......... | 1 | — | — | — |
| 23. prostrata, Pers; kriechend; 30—45 cm. h. .......... M 1,25 bis | 2 | — | — | — |
| 5. **Sabina**, *L.*, Gemeiner Sadeb. 30—90 cm. breite schöne Pflanzen M 1 bis | 3 | 50 | 8—30 | — |
| 3. — tamariscifolia, *Hrt.* (= horizontalis, Mnch.); feiner und blaugrüner als Sabina; 30—60 cm. breit .......... M 1 bis | 2 | — | 8—16 | — |
| 15. Schottii, *Hrt.*; 30 cm. h. .......... | 1 | — | — | — |
| 6. **virginiana**, *L*, Virginischer Sadeb. (Rothe Ceder). 30 cm. h. .......... | — | 40 | 3½ | * |
| — do. 60—90 cm. h. .......... M 0,75 bis | 1 | — | 7—9 | * |
| — do. schöne Pyramiden. 0,90—1,80 m. .......... M 1,25 bis | 4 | — | 11—30 | — |
| 9. — **glauca**, *Hrt.*; hübsch blaugrün; 30—60 cm. h. „ 1 „ | 2 | — | — | — |
| **Larix**, *L.*, **Lärche**; Abietaceae. | | | | |
| Bäume mit abfallenden Nadeln und kleinen aufrechten Zapfen. | | | | |
| 1. davurica, *Hrt.*, Daurische L.; niedrig bleibend. 90 cm.—1,50 m. h. M 1 bis | 2 | 50 | — | — |
| 2. **europaea**, *D. C.* (L. decidua, *Mill.*), Gemeine L.; schöne 1—3 m. hohe Pflanzen .......... M 0,75 bis | 3 | — | 6—25 | * |
| 5. microcarpa, Wob., Kleinfrüchtige amerikanische L. 1½—3 m. hoch M 1,50 bis | 3 | 50 | 18—30 | — |

| | pr. St. M. ₰ | 10 St. M. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|
| **Pinus**, *L.*, **Kiefer** (Föhre), Abietaceae. | | | |
| 1. austriaca, *Höss.*, Oesterreichische K. (Schwarzföhre) 30—60 cm. h. M. 0,50 bis | 1 — | [illegible] | * |
| 2. Cembra, *L.*, Zürbel-K. (Arve); sehr kraus und schön, 30 bis 60 cm. hoch M. 0,75 bis | 1 50 | 7—13 | — |
| 15. maritima calabrica, *C. Koch*; langnadelig, Nadeln gedrängt stehend 30—60 cm. hoch | — 75 | 6 | — |
| 17. — Monspeliensis, *C. Koch* (= Monspeliensis, Salzm.); Nadeln feiner u. mehr wagerecht; 30—50 cm. h. | 1 — | — | — |
| 16. — Pallasiana; freudig grün, mit grösseren Zapfen als die Hauptart; 30—60 cm. h. M. 0,60 bis | 1 — | 5—9 | — |
| 4. montana, *Mill.* (Pin. Mugus, *Scop.*), Knieholz-K.; 0,30—1,20 m. hoch 75 ₰ bis | 3 — | 6—25 | * |
| 5. Pinaster, *Sol.*, Europäische Terpentin-K. 0,90—1,50 m. hoch M. 1,50 | 3 50 | — | — |
| 6. **Strobus**, *L.*, Weymouth-K.; hoher Baum mit langen, dünnen, blaugrünen Nadeln und glatter Rinde. 30—50 cm. h. | — 50 | 4 | — |
| — 60—90 cm. h. | — 75 | 6 | * |
| — do. 1—2 m. h. M. 1 bis | 2 50 | 9—22 | * |
| 3. excelsa, *Ham.* (= P. Strobus excelsa, *Hrt.*); sehr schön blaugrün und feinnadelig 30 cm. h. | [illegible] | | — |
| 7. sylvestris, *L.*, Gemeine K. 1—1,80 m. hoch | [illegible] | | — |
| **Retinospora**, s. Cupressus und Thuya. | | | |
| **Taxus**, *L.*, **Eibe** (Taxus); Taxaceae. | | | |
| 1. adpressa, *Knight*; 45—50 cm. h. | 1 50 | — | — |
| 2. baccata, *L.*, Gemeine E.; 30—45 cm. h. | — 75 | 6 | * |
| — 50—75 cm. h. M. 1 bis | 2 — | 9—18 | * |
| — Schöne Pyramiden 0,75—1,20 m. h. M. 2,50 bis | 6 — | | — |
| — ganz starke 1,50—2,10 m. h. M. 15 bis | 20 — | | |
| b. 3. — elegantissima, *Hrt.*, Gelbbunte E.; 15—60 cm. h. | 2 50 | 9—22 | — |
| 4. — — erecta, *Hrt.*, Aufrechte E.; 30—45 cm. h. | 1 50 | — | — |
| 9. Dovastoni, *Loud.*; hängend 30—90 cm. h. M. 1,50 bis | 2 50 | — | — |
| **Thujopsis** dolabrata (Thuya), *L.*; 25 cm. h. | 1 — | — | — |
| — — fol. var.; weissbunt; 30 cm. h. | 1 50 | — | — |
| **Thuya**, *L.*; **Lebensbaum**, (Abendländischer Lebensbaum); Cupressaceae. | | | |
| 1. dubia (*Retin.*), *Carr.* (Th. ericoides, *Hrt.*); 15 cm. h. | — 60 | — | — |
| 2. Ellwangeriana (Retin.) *Carr.* (Th. Tom Pouce, *Hrt.*); 30—60 cm. h. M. 1 bis | 2 — | — | — |
| 3. **gigantea**, *Carr.* (Heyderia decurrens, *C. Koch*) Riesiger L.; eine schöne, harte Art, die im Winter ihre Farbe behält 30—45 cm. h. 1 M. bis | 1 25 | 8—11 | — |
| — 0,60—1 m. M. 1,50 | 3 — | — | — |
| 6. Menziesii, Dougl. (= Lobbii; *Hrt.* = gigantea; *Hook.*); 30—60 cm. h. M. 0,75 | 1 50 | — | — |
| 7. **occidentalis**, *L.*, Abendländischer L.; 0,60 m. h. | — 60 | 5 | * |
| — 0,75—1,20 m. h. | 1 50 | 8—18 | * |
| 17. — argentea, *Hrt.* 0,30—0,60 m. | 1 25 | — | — |
| 18. — Boothii, *Hrt.*; 0,30 — 0,45 m. h. | 1 50 | — | — |
| 14. — [illegible], *Hrt.*; 0,30 m. h. | 1 25 | — | — |
| 15. — **cristata**, *Hrt.*; kammförmig, sehr hübsch, 30—45 cm. h. M. 1 bis | 1 50 | — | — |
| 4. — **Hoveyi**, *Hrt.*; Zweige breit und gedrängt, 0,30—0,90 m. h. | 4 — | — | — |
| 9. — Vervaeneana; Belaubung gelblich grün 30—75 cm. h. M. 1 bis | 2 — | 9 | — |
| 10. — **Wareana**, *Hrt.*; der schönste und härteste aller Lebensbäume von gedrungenem Wuchse 30—45 cm. hoch M. 0,75 bis | [illegible] | 6—8 | * |
| — do. 60—90 cm. h. M. 1,25 | 2 50 | 11—22 | * |
| — do. ganz starke von 1—1,20 m. hoch M. 3,50 | 5 — | 30—45 | — |
| 11. plicata, *Donn.*; 30—90 cm. h. M. 1 bis | 3 — | — | — |
| **Wellingtonia**, *Lindl.*, **Wellingtonie**; Cupressaceae. | | | |
| 1. gigantea, *Lindl.* (Sequoia gigantea, *Lindl.*) Riesige W.; 30 cm. h. (i. Topf) | 2 — | 18 | — |

# Gehölze für Parkanlagen,

## nach meiner Wahl.

| | M. |
|---|---|
| 100 Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten 0,50—1,50m. h. | 6—12 |
| 100 Gewöhnlichere Vorsträucher in 10—15 Sorten mit Namen, 0,60—1,50m. h. | 15—20 |
| 100 Feinere Vorsträucher in 15—20 Sorten mit Namen | 25—40 |
| 100 Gewöhnliche Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3m. hoch | 30 |
| 100 Besonders starke oder feine Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3m. hoch | 40—55 |
| 100 Schönblühende Ziersträucher in allen Grössen (zur Anlage kleiner Gärten) in etwa 15—20 Sorten mit Namen, je nach der Güte | 25—55 |
| 100 Schönblühende und schönblättrige Ziersträucher in 100 Sorten | 45 |
| 100 Schönblühende Ziersträucher in 50 Sorten | 40 |
| 50 " " " 25 " | 20 |
| 100 Schmuckbäume (Solitärbäume) in 50 Sorten, kräftige Hoch-, Halbstämme u. Pyramiden M. 80 bis | 120 |
| 50 " in 25 Sorten und kräftigen Exemplaren 40 bis | 60 |
| 100 Gewöhnliche und harte Coniferen zu Gruppen | 75 |

**Starke Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks können zu Hunderttausenden geliefert werden. Bei Abnahme von grösseren Posten treten Preisermässigungen ein.**

# Alleebäume.

**Unter 25 Stück werden zum Hundertpreise nicht abgegeben.**

**Der Stammumfang ist 1 Meter über der Erde gemessen.**

**8 Centimeter** Umfang ungefähr = 1 Zoll stark, 12cm. = 1¼",
16cm. = 2" u. s. w.

| | | Stammumfang Centimeter | pr. 1 St. M. ₰ | pr. 100 St. M. |
|---|---|---|---|---|
| **Ahorn**, Amerikan. Silber- | **Acer** dasycarpum | 7—9 | 1 10 | 90 |
| | | 10—12 | 1 75 | 150 |
| | | 13—15 | 2 50 | 220 |
| ganz starke | — | 16—20 | 3—5 | — |
| — Eschenblättriger, **Kalifornischer** | Negundo californicum | 7—9 | 1 — | 75 |
| | — — | 10—12 | 1 50 | 120 |
| | — — | 13—14 | 2 — | — |
| *Sehr schöner, hellgrün belaubter und ausserordentlich starkwüchsiger Baum.* | | | | |
| — Weissbunter | — fol. argenteo var. | — | 2—3 | — |
| — Spitzblättriger | — platanoides | 10—12 | 1 75 | — |
| — **Schwedler's Blut-** | — Schwedleri | 7—9 | 1 50 | 130 |
| — — | | 10—12 | 2 50 | 220 |
| — Weisser | — Pseudoplatanus | 7—9 | 1 — | 85 |
| — — | — | 10—12 | 1 50 | 130 |
| — — | — — | 13—20 | 3—4½ | — |
| — — Purpurblättriger | — — fol. purpureis | 10—12 | 2 25 | 200 |
| — — | — — | 13—25 | 3—6 | — |
| — — Rothfrüchtiger | — erythrocarpum | — | 2 | — |
| — — Weissbuntblättriger | — Leopoldi, bicolor, tricolor | 8—12 | 2—2½ | 200 |
| **Akazie**, Gemeine | **Robinia** Pseudacacia | 7—10 | 1 20 | — |
| — Kugel- | — — inermis | 8—11 | 2 — | 180 |
| — Rothblühende | — hispida | 7—10 | 2 50 | — |
| — Immerblühende | — Psd. semperflorens | 8—11 | 2 50 | — |
| **Apfel**, Beeren- | **Pirus** baccata, diverse Sorten | 8—12 | 1½—2½ | — |
| **Birke**, Gemeine Weiss- | **Betula** alba | 7—9 | — 75 | 60 |
| — Grossbl. Papier-B. | — papyracea grandis | 8—12 | 2 50 | — |
| — Geschlitztblättrige | — alba laciniata | 7—9 | 2 — | 180 |
| — — stärkere 3—4 Meter hoch | | — | 2 75 | — |
| — Purpurblättrige | — — purpurea | — | 3 — | 270 |
| **Buche, Weiss-** (Hainbuche) | **Carpinus** Betulus | 10—15 | 2—2½ | 200 |
| — **Blut-** | **Fagus** sylv. atropurpurea | — | 4—5 | — |
| **Eberesche**, Gemeine | **Sorbus** aucuparia | 9—14 | 1¼—2½ | — |
| — Bastard- u. Mehlbirne | — hybrida u. Aria | 12—17 | 1¾—3 | — |
| **Eiche**, Sommer- oder Stiel- | **Quercus** Robur (pedunculata | 7—9 | 1 25 | 100 |
| | | 10—12 | 1 75 | 150 |
| | | 13—15 | 2 50 | 225 |
| — | — — | 16—22 | 3—4½ | 350 |

| | | Stamm-umfang Centimetr. | pr. 1 St. M | pr. 1 St. Pf | pr. 100 St. M |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eiche** Gold- | **Quercus** Robur Concordia | 8—10 | 3 | — | — |
| — Grossblumige | — macranthera; sehr grblättr. | 8—10 | 2 | 50 | — |
| — Kammblättrige | — Robur pectinata | 8—10 | 2 | 50 | |
| — Scharlach- | **Quercus** coccinea | 12—15 | 3—4½ | | |
| **Erle**, **Roth**- und **Weiss-E.** | **Alnus** glutinosa u. incana | 10—12 | 1 | — | 80 |
| **Esche**, Gemeine | **Fraxinus** excelsior | 7—9 | — | 80 | 70 |
| — Amerikanische weisse grblättr. | — alba (pubescens) | | | | |
| — — | — — | 10—12 | 1 | 25 | 110 |
| — — | — — | 13—15 | 2 | — | 175 |
| — — | — — | 16—24 | 2—3 | | 250 |
| — Kugel- | — potemoniifolia | 8—10 | 2 | — | 180 |
| Sehr schön für nördliches Klima. | | | | | |
| — Pyramiden- | — excelsior spectabilis | 8—10 | 2 | — | |
| **Dorn**, **Dunkelroth** gefüllt | **Crataegus** Oxyacantha fl. kermesino pl. (Paul's new Scarlet) | 6—8 | 1 | 25 | 100 |
| — — | stark | 8—11 | 1½—2 | | 150 |
| Als Alleebaum allein oder abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überraschender Schönheit. | | | | | |
| **Flieder**, Blauer | Syringa vulgaris | — | ¾—1¼ | | 70-120 |
| — Chinesischer | — Rothomagensis | | | | |
| — diverse veredelte Sorten | | — | 1—1½ | | 90-150 |
| **Gleditschie** | **Gleditschia** triacanthos | 7—9 | 1 | — | 80 |
| — | — — | 10—12 | 1 | 75 | 150 |
| **Kastanie**, Gemeine, | **Aesculus** Hippocastanum | 10—12 | 1 | 75 | 150 |
| — — | — — | 13—15 | 2 | 50 | 220 |
| — — | — — | 16—30 | 3—10 | | 300 |
| — Gelbe und Gefüllte | — lutea u. Hippoc. fl. pl. | — | 2—3 | | — |
| — Rothblühende | — rubicunda (carnea) | 10—17 | 2½—5 | | 250 |
| **Kirsche**, **Trauben-** | **Prunus** Padus | 6—9 | 1 | — | — |
| — Gefülltblühende | — Cerasus u. Avium fl. pl. | — | 1 | 75 | — |
| **Lärche**, Europäische | **Larix** europaea | 8—12 | 2 | 50 | 220 |
| **Linde**, Grossblättr. Holländische | **Tilia** platyphyllos | 8—10 | 1 | 75 | 150 |
| — — — | — — | 10—12 | 2—3 | | 200 |
| — — — | — — | 12—14 | 3—4 | | 300 |
| — — — | — — stark | 15—17 | 5—7 | | 550 |
| — — — | — — sehr stark | 18—30 | 7½—15 | | 7-1200 |
| — Kleinblättrige | — ulmifolia | 15—30 | 4—13 | | — |
| — Krim- | — euchlora; sehr schöne Art | 10—12 | 3—4 | | 350 |
| — — | — — | 13—16 | 5—7½ | | — |
| — macrophylla, laxiflora, americana ächt, begoniaefolia, alba | | — | 3½—9 | | — |
| **Pappel**, Silber- (ächt) | **Populus** alba nivea | 8—10 | — | 75 | 50 |
| — Lorbeerblättrige | — laurifolia | | | | |
| — — Berliner | — hybrida Berolinensis. | | | | |
| — dieselben Sorten | — — | 11—13 | 1 | — | 75 |
| — — — | | 14—30 | 1½—3 | | — |
| — Kanadische | — canadensis | 9—12 | 1 | — | 70 |
| — Eugen's | — Eugenei | 8—12 | 1 | 25 | 110 |
| — Simon's Balsam- | — Simoni | | | | |
| — Pyramiden- und Schwarz- | — fastigiata u. nigra | 8—11 | — | 80 | 60 |
| — — | — — | 15—18 | 1 | 50 | 130 |
| **Pflaume** gefüllt roth | **Prunus** triloba | — | 1 | 75 | 150 |
| **Platane** | **Platanus** orientalis | 10—12 | 4 | 50 | — |
| — | | 13—14 | 5 | 50 | |
| **Rüster**, Grossblättrige | **Ulmus** montana (scabra) | 7—9 | 1 | — | 80 |
| — — | — — | 10—12 | 1 | 75 | 150 |
| — — | — — | 13—15 | 2 | 75 | 250 |
| — — ganz stark | — — | 16—25 | 3—6 | | 3—450 |
| — Flatter- | — effusa | 7—9 | 1 | — | 75 |
| — — | — — | 10—12 | 1 | 75 | 140 |
| — Feld- | — campestris | 12—20 | 1½—4 | | — |
| — **Kugel-** | — — umbraculifera; s. vorn d. Abbildung | 10—14 | 7 | — | 500 |
| *Diese liefere ich mit 2—3jähriger Krone.* | | | | | |
| — diverse | veredelte Sorten | — | 2—5 | | — |
| **Wallnuss, Schwarze amerikan.** | **Juglans nigra** | 10—12 | 2 | — | 180 |
| — — — | — — | 13—20 | 3—6 | | 300 |

*Ein prachtvoller winterharter Alleebaum, wunderschön belaubt.*

## Trauerbäume.

| | 1 St. M. | 1 St. Pf. | 10 St. M. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Betula** tristis, Hange-**Birke** ........ Hochst. M. 2 bis | 2 | 50 | 18—22 | — |
| — laciniata, Geschlitztblättr. B.; ........ schöne Hochst. M. 2 bis | 3 | — | 18—26 | * |
| — pendula elegans Youngii; niedrig ........ | — | 75 | 7 — | — |
| **Caragana** arborescens pundula, Gewöhnl. Trauer-Karagane; über 2 m. hohe sehr schöne Hochst. M. 1,75 bis | 2 | 50 | 18—22 | * |
| — — schwächere ........ M. 1,25 bis | 1 | 50 | 11—13 | * |
| — Chamlagu, Chinesische Tr.-K.; Hchst. ........ | 1 | 50 | — | — |
| — pygmaea arenaria (gracilis); Feinzweigige Tr.-K.; ........ Hochst. 1,25 bis | 1 | 50 | 11—13 | — |
| **Carpinus** Betulus pendula, Trauer-**Hainbuche**; niedr. veredelt ........ M. 1 bis | 2 | — | — | — |
| **Corylus** Avellana pendula, Trauer-**Hasel**; ........ Halbstämme M. 1,50 bis | 2 | — | — | — |
| **Crataegus** Oxycantha pendula (Reginae), Trauer-**Weissdorn**; starke Hchst. M. 1,75 bis | 2 | 50 | — | — |
| — Fontanesiana u. salicifolia; mit schirmförmiger Krone ........ Hchst. | 1 | 50 | 13 | — |
| **Cytisus** purpureus; ........ Hlbst. M. 1,50 bis | 2 | — | — | — |
| **Evonymus** nana Zwerg-**Spindelbaum** ........ 1,25 bis | 1 | 75 | 9—16 | — |
| — Maackii; schön belaubt ........ Hlbst. | 1 | 50 | 13 | — |
| **Fraxinus** excelsior pendula, **Trauer-Esche** ........ 1,50 bis | 2 | — | 13—18 | * |
| — — — ganz stark ........ 2,50 bis | 3 | — | 22—26 | * |
| — lentiscifolia pendula, Feinblättrige sehr schöne Trauer-E. ........ | 2 | 50 | 22 | — |
| **Ligustrum** vulgare pendulum; ........ Hchst. | 1 | 50 | — | — |
| **Pirus** floribunda, Rothblühender Pracht-Apfel ........ 1,50 bis | 2 | — | 13—17 | — |
| — prunifolia pendula ........ 1,50 bis | 2 | — | 13—17 | — |
| **Populus** grandidentata pendula, Trauer-**Pappel** ........ } 1,25 bis | 2 | 25 | 11—20 | — |
| — tremula pendula, Trauer-Espe ........ } | | | | |
| — tremuloides pendula, Amerikanische Trauer-Espe ........ M. 1,25 bis | 2 | 25 | 11—20 | — |
| **Prunus** Avium pendula, Trauer-Herz-**Kirsche**; Hchst. ........ | 1 | 75 | 15 | — |
| — fruticosa pendula, Hängende Zwergweichsel; Hchst. ........ | 1 | 75 | 15 | — |
| — Cerasus semperflorens, Allerheiligenkirsche; Hchst. ........ | 1 | 75 | 15 | — |
| — virginiana pendula, Hängende virginische **Traubenkirsche**; Hchst. ........ | 1 | 50 | — | — |
| **Quercus** Robus pendula Dauvessei / — — — nova } Trauer-**Eiche**; schöne Hchst. ........ M. 3 bis | 5 | — | 25—45 | * |
| **Robinia** Pseudacacia pendula, Trauer-**Akazie** ........ | 2 | — | — | — |
| **Rosa** scandens, Trauer-**Rose**; diverse Sorten, Hchst. ........ M. 2,50 bis | 4 | — | — | — |
| **Salix** purpurea pendula (nigra pendula) } Trauer-**Weide** ........ M. 1,50 bis | 2 | 25 | 13—20 | — |
| — caprea pendula ........ } | | | | |
| — elegantissima (babylonica); Hchst. ........ | 1 | — | 9 | — |
| **Sophora** japonica pendula ........ M. 2,50 bis | 4 | — | — | — |
| **Sorbus** aucuparia — Trauer-**Eberesche** ........ „ 1.50 „ | 3 | — | 13—25 | — |
| — — — fol. var. ........ „ 1,50 „ | 2 | 50 | — | — |
| **Tilia** alba petiolaris, Trauer-Silber-**Linde**; schöne Stämme ........ „ 4,— „ | 6 | — | 35—50 | — |
| **Ulmus** montana pendula, Trauer-**Rüster**: sehr schöne Stämme ........ „ 2,50 „ | 6 | — | 25—50 | * |
| — microphylla pendula ........ „ 3,— „ | 3 | 50 | — | — |

## Schlingsträucher.

| | 1 St. M. | 1 St. Pf. | 10 St. M. | hundertweise vorräthig. |
|---|---|---|---|---|
| **Actinidia** polygama ........ | 1 | 25 | 11 | — |
| **Akebia** quinata ........ | — | 75 | 6½ | — |
| **Aristolochia** Sipho ........ M. 1,25 bis | 2 | — | 11—18 | * |
| **Celastrus** scandens, **Baummörder**; stark ........ | 1 | — | 8 | — |
| **Clematis** Vitalba, Weisse **Waldrebe** ........ M. 0,50 bis | — | 75 | 4—6 | * |
| — Viticella, Blaue — ........ 0,50 bis | — | 75 | 4—6 | * |
| — grossblumige im Rummel ........ | — | 75 | 6 | — |
| Die einzelnen Sorten siehe im Sortiment der Ziergehölze. | | | | |
| **Hedera, Epheu**, siehe das Sortiment ........ 0,75 bis | 1 | — | 6—9 | — |
| **Lonicera Caprifolium**, mehrere Sorten ........ 0,60 bis | 1 | — | 5 | * |
| **Periploca** graeca, Griechische **Schlinge** ........ 0,75 bis | 1 | — | 6—8 | — |
| **Rosa** (siehe die Kletterrosen im Sortiment) ........ 0,50 bis | 1 | — | 4½—7 | * |
| **Rubus** parvifolius, Rothfrücht. **Brombeere** ........ 0,50 bis | — | 75 | 4—6 | — |
| — fruticosus fl. albo pl., Gefüllte weisse ........ | — | 50 | 4 | — |
| **Tecoma** radicans (**Bignonia**) ........ | — | 60 | 5 | — |
| **Vitis** quinquefolia, **Wilder Wein** extra stark, 3 Meter lang, 6—8 Ranken ........ | — | 75 | 6 | * |
| — — stark über 2 m. hoch ........ | — | 50 | 4 | * |
| — — schwächere ca. 1 m. h. ........ | — | 30 | 2½ | * |
| — hirsuta, Grossblättr. wilder Wein ........ 0,40 bis | — | 75 | 3—7 | * |
| — hederacea, Aechter Klimmer ........ | — | 60 | 5 | — |
| — odoratissima, Clinton u. andere amerikanische Sorten ........ | — | 75 | 6 | * |
| **Wistaria** chinensis, **Glycine** ........ 1,25 bis | 2 | — | — | — |

# Gehölze zu Hecken und Lauben.

*Sämmtliche hier aufgeführte Sträucher sind mehrjährig, verpflanzt und sehr gut bewurzelt.*

| | | Höhe in Metern. | pr. 100 St. ℳ | ₰ | 1000 St. ℳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abies excelsa | **Rothtanne** p. 10000 St. 500 ℳ | 0,45—0,60 | 7 | — | 60 |
| — — mit Ballen | | 0,60—0,75 | 35 | — | 320 |
| Berberis Aquifolium | **Mahonia**, zu immergrünen niedrigen Zierhecken | 0,40—0,50 | 9 | — | 80 |
| — vulgaris | Berberitze, gemeine | 0,45—0,60 | 6 | — | — |
| Buxus suffruticosa zu niedrigen Einfassungen | p. laufendes Meter | — | — | 75 | — |
| — — — | pr. 100 | — | 65 | — | — |
| Caragana arborescens | Karagane | 0,80—0,90 | 5 | — | 40 |
| Carpinus Betulus | **Weissbuche** (Hainbuche) | 0,30—0,50 | 4 | — | 35 |
| — — | — — | 0,60—1,20 | 10 | — | — |
| Cornus mascula | Kornelkirsche | 0,40—0,60 | 9 | — | 75 |
| Corylus Avellana | Haselnuss | 0,50—0,75 | 10 | — | 90 |
| Crataegus Oxyacantha (Mespilus monogyna) | **Weissdorn** sehr stark | 4jährig | 3 | — | 27 |
| — | pr. 10,000 St. ℳ 160. starke | 3 „ | 2 | — | 18 |
| — | pr. 10,000 St. ℳ 120. verpflanzt | 2 „ | 1 | 50 | 13 |
| — | pr. 10,000 St. ℳ 45 zum Verpflanzen | 1 „ | — | 80 | 5 |
| Cydonia japonica | **Quitte**, japanische | 0,90—1,— | 40 | — | 350 |
| — — | — — | 0,25—0,30 | 15 | — | 120 |
| — vulgaris | — gewöhnliche | 0,60—0,90 | 15 | — | 120 |
| Gleditschia triacanthos | **Gleditschie**, für hohe Hecken mehr zu empfehlen, als Akazien, da sie nicht durch Fröste leiden | 0,90—1,20 | 3 | 50 | 30 |
| Ligustrum vulgare | **Liguster** | 0,40—0,50 | 4 | 50 | 40 |
| — — | „ ganz stark | 0,60—1,— | 13 | — | 120 |
| Lonicera tatarica | Heckenkirsche | 0,30—0,60 | 4 | — | 35 |
| Robinia Pseudacacia | **Akazie** 1jähr. I. Qual. | 0,30—0,60 | 1 | — | 7 |
| — — | pr. 10,000 St. ℳ 60 | | | | |
| — — | 1jährige II. Qual. | 0,15—0,40 | — | 50 | 21 |
| — — | pr. 10,000 St. ℳ 20 | | | | |
| Spiraea, diverse Sorten | (zu Zierhecken) | 0,50—0,60 | 4 | — | 35 |
| Symphoricarpos racemosus | Schneebeere | 0,30—0,60 | 4 | — | 35 |
| Syringa vulgaris | **Flieder**, gemeiner blauer | 0,60—0,70 | 5 | — | 40 |
| — Rothomagensis | — chinesischer | 0,50—0,60 | 6 | — | 50 |
| Thuya occidentalis | Lebensbaum | 0,45—0,60 | 25 | — | — |
| Ulmus campestris und effusa | Rüster (zu Lauben) | 1,50—2,50 | 30 | — | — |
| — — | — ganz starke buschige | 2,00—3,00 | 50 | — | — |

## Obstwildlinge zum Veredeln.

I. *Qualität sogleich veredlungsfähig (Copulirstärke).*
II. „ *im nächsten Sommer veredlungsfähig.*
III. „ *zum Verpflanzen.*

| №. | | | Preis pro 100 ℳ | ₰ | 1000 ℳ | 10,000 ℳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Apfelwildlinge**, (Vorrath über 300,000) verpflanzte | I. Qual. | 3 | 50 | 30 | 280 |
| 2 | — | II. „ | 2 | 50 | 20 | 180 |
| 3 | — | III. „ | 1 | — | 6 | 50 |
| 4 | **Birnwildlinge** | I. „ | 5 | — | — | — |
| 5 | — | II. „ | 3 | — | 27 | 240 |
| 6 | — | III. „ | 1 | 20 | 9 | 80 |
| 7 | **Kirschen**, Süss- | I. „ | 4 | 50 | 40 | — |
| 8 | — — | II. „ | 2 | 50 | 20 | — |
| 9 | — — | III. „ | 1 | 20 | 10 | — |
| 10 | — Sauer- | I. „ | 4 | — | 35 | — |
| 11 | — — | II. „ | 2 | — | 18 | — |
| 12 | — Weichsel- (Mahaleb | II. „ | 2 | 50 | 22 | — |
| 13 | — — | III. „ | 1 | 20 | 10 | — |
| 14 | **Pflaumen**, Damascener u. St. Julien | II. „ | 5 | — | 45 | — |
| 15 | — Mirobalanen (Kirschpfl.) | I. „ | 3 | 50 | 30 | 230 |

## Obstwildlinge zum Veredeln.

| Nr. | | | | Preis pro 100 M. | ₰ | 1000 M. | 10,000 M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **Pflaumen,** Mirobalanen (Kirschpfl.) | II. | Qual. | 2 | 50 | 20 | 180 |
| — | — sehr gute Unterlage für Aprikosen und auch für Pflaumen | | | | | | |
| 17 | — Zwetschen (Prun. domestica) | I. | „ | 3 | 50 | 32 | — |
| 18 | — — | II. | „ | 2 | — | 17 | — |
| 19 | — — | III. | „ | 1 | — | 7 | — |
| 20 | — Schlehen (Prun. spinosa) | I. | „ | 3 | 50 | 30 | — |
| 21 | — — | II. | „ | 2 | — | 18 | — |
| 22 | — — | III. | „ | 1 | — | 7 | — |
| 23 | **Johannisapfel** oder **Paradies-** | I. | „ | 6 | — | 54 | — |
| 24 | **Splittapfel** od. **Doucin** | I. | „ | 6 | — | 54 | — |
| 25 | „ letztere beide Sorten | II. | „ | 4 | — | 36 | — |
| 26 | **Quitten** | I. | „ | 3 | 50 | 30 | 280 |
| 27 | „ | II. | „ | 2 | 50 | 22 | 200 |
| 28 | **Haselnüsse,** Piemontesische, runde | I. | „ | 8 | — | — | — |
| 29 | „ Sizilianische, langfrüchtige | I. | „ | 10 | — | — | — |
| 30 | **Ribes aureum,** (Unterlage für Stachelbeer- u. Johannisbeer-Hochstämme | | | | | | |
| — | — Stämme 1 Meter und darüber hoch | | | 6 | — | 54 | — |

# Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

## zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

Da ich meine Saatschulen bedeutend vergrössert habe, so bin ich im Stande, grössere Quantitäten und zu billigerem Preise zu liefern als bisher. Der hiesige Sandboden eignet sich ganz besonders zur Anzucht von Sämlingen, denn er befördert eine reiche Bewurzelung.

*Zum Hundertpreise werden nicht unter 25 Stück, zum Tausendpreise nicht unter 500 abgegeben.*

*Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verbeten ist.*

## a) Laubhölzer.

| | | Alter in Jahren | Preis pro 100 M. | ₰ | 1000 M. | 10,000 M. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acer** campestre, Feld-Ahorn | | 1 | 1 | — | 8 | — |
| — — | verpflanzt | 3 | 2 | 20 | 20 | — |
| — circinatum | | 3 | 15 | — | — | — |
| — Ginnala | | 1 | 8 | — | — | — |
| — — | | 2 | 12 | — | — | — |
| — Negundo, Eschenblättriger Ah. | | 1 | 1 | — | 8 | — |
| — — | verpfl. | 2 | 1 | 80 | 15 | — |
| — — | verpfl. | 3 | 2 | 50 | 22 | — |
| — — **californicum; wunderbar schnellwüchsiger Allee-baum** | | 1 | 2 | 50 | 22 | — |
| — — — Prachtpflanzen 0,60—1m. h. | verpfl. | 2 | 4 | 50 | 40 | 380 |
| — nigrum (saccharinum), Zucker-Ah. | verpfl. | 2 | 6 | — | — | — |
| — platanoides, Spitz-Ah. | | 1 | 1 | — | 8 | 70 |
| — — | verpfl. | 2 | 2 | — | 18 | — |
| — — | verpfl. | 3 | 3 | — | 26 | — |
| — Pseudoplatanus, weisser Ah. | | 1 | 1 | — | 6 | 55 |
| — — | verpfl. | 2 | 2 | — | 15 | 135 |
| — — | verpfl. | 3 | 3 | — | 24 | — |
| — — fol. purpureis | | 1 | 5 | — | — | — |
| — — — | | 2 | 7 | 50 | — | — |
| — rubrum, Virginischer rother Ah. | | 1 | 8 | — | — | — |
| — tataricum, Tartarischer Ah. | | 1 | 4 | 50 | — | — |
| — — | verpfl. | 3 | 10 | — | — | — |
| — tauricum, Taurischer Feld-Ah. | | 1 | 5 | — | 45 | — |

| | Alter in Jahren | Preis pro 100 M ₰ | Preis pro 1000 M | Preis pro 10,000 M |
|---|---|---|---|---|
| **Aesculus** Hippocastanum, Ross-**Kastanie** | 1 | 1 50 | 10 | — |
| — — verpfl. | 2 | 2 — | 16 | — |
| — lutea (Pavia flava) | 3 | 15 — | — | — |
| — Pavia (Pavia rubra) | 3 | 16 — | — | — |
| **Ailanthus** glandulosa, **Götterbaum** | 1 | 1 — | 6 | 50 |
| — — verpfl. stark | 2 | 2 — | 18 | 160 |
| — — | 3 | 3 — | 26 | — |
| **Akebia** quinata Ableger | 1 | 24 — | — | — |
| **Alnus** glutinosa, Roth-**Erle** verpfl. | 2 | 1 80 | 15 | — |
| — — ca. 1m. h. | 3 | 3 — | 26 | — |
| — incana, Weiss-E. (Nordische E.) | 2 | 2 — | — | — |
| **Amelanchier** rotundifolia (ovalis) | 1 | 2 50 | 22 | — |
| **Amorpha** elata | 1 | 2 50 | — | — |
| — fruticosa | 2 | 1 50 | 12 | — |
| — — verpfl. | 3 | 2 50 | 22 | — |
| — macrophylla | 1 | 2 — | — | — |
| — pumila | 1 | 2 50 | — | — |
| **Amygdalus** communis, Bittere **Mandel** | 1 | 3 — | — | — |
| **Azalea pontica** verpfl. | 3 | 20 — | — | — |
| **Berberis** Aquifolium, **Mahonie** | 1 | 1 80 | 15 | — |
| — — verpfl. | 2 | 3 — | 27 | — |
| — — verpfl. | 3 | 5 — | 45 | — |
| — macrophylla Säml. | 1 | 3 50 | — | — |
| — vulgaris, Gemeine **Berberitze** | 1 | 1 — | 8 | — |
| — — verpfl | 2 | 1 80 | — | — |
| — — atropurpurea, ächt | 1 | 1 50 | 18 | 120 |
| — — — verpfl. | 2 | 3 — | 26 | — |
| — — — verpfl. | 3 | 4 50 | 40 | — |
| **Betula** alba, Gemeine **Birke** | 1 | — 80 | 8 | — |
| — — verpfl. | 2 | 1 20 | 10 | 80 |
| — — 1 m. hoch stark | 3 | 2 20 | 20 | 170 |
| — fruticosa, Strauchartige B. | 2—3 | 3 50 | — | — |
| — papyracea (macrophylla), Papier-B. | 2—3 | 4 — | — | — |
| — pubescens | 2—3 | 3 50 | 30 | — |
| — tristis Säml. | 3 | 3 50 | — | — |
| **Broussonetia** papyrifera verpfl. | 3 | 4 — | — | — |
| **Buddleja** Lindleyana | 3 | 8 — | — | — |
| **Buxus** sempervirens (arborescens) Stecklingspfl. | 4 | 10 — | — | — |
| **Calycanthus** floridus, **Gewürzstrauch** | 1 | 4 — | — | — |
| **Caragana** arborescens, **Erbsenbaum** | 1 | 1 20 | 9 | 70 |
| — — | 2 | 2 — | 15 | — |
| — — stark | 3 | 3 — | 27 | 250 |
| — frutescens | 3 | 4 50 | 40 | — |
| — glomerata | 1 | 8 — | — | — |
| — pygmaea gracilis | 1 | 8 — | — | — |
| — Redowskii | 1 | 2 — | 15 | — |
| — — | 3 | 4 50 | — | — |
| **Carpinus** Betulus **Weissbuche (Hainbuche)** | 1 | — 80 | 8 | 27 |
| — — verpfl. | 2 | 1 50 | 12 | 110 |
| — — stark | 4 | 4 — | 35 | — |
| **Carya** alba, **Hickory** | 1 | 5 — | — | — |
| — — verpfl. | 2 | 10 — | — | — |
| — porcina | 1 | 6 — | — | — |
| **Castanea** vesca | 1 | 4 — | — | — |
| **Catalpa**, Kämpferi, **Trompetenbaum** | 2—3 | 6 — | — | — |
| — springaefolia | 1 | 1 50 | 12 | — |
| — — verpfl. | 2 | 3 — | 25 | — |
| — — verpfl. | 3 | 4 50 | — | — |
| **Ceanothus** americanus, **Säckelblume** | 1 | 2 — | 16 | — |
| — — stark verpfl. | 3 | 4 50 | — | — |
| — Gloire de Versailles u. Bertini Säml. | 1 | 15 — | — | — |
| **Celastrus** scandens, **Baummörder** | 1 | 4 — | — | — |
| **Celtis** australis, **Zürgelstrauch** verpfl. | 2 | 4 — | — | — |
| **Cephalantus** occidentalis | 1 | 3 — | — | — |
| **Cercis** Siliquastrum, **Judaslinde** | 2 | 6 — | — | — |
| **Clematis** fusca, Braune **Waldrebe** wohlriechend | 1 | 6 — | — | — |

| | Alter. | Preis pro 100 | | 1000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | M. | Pf. | M. | M. |
| **Clematis.** | | | | | |
| — Hendersoni | 2—3 | 5 | — | — | — |
| — integrifolia, mit dunkelblauen Blüthen | 2—3 | 3 | — | 25 | — |
| — intermedia | 4 | 8 | — | — | — |
| — Vitalba, Gemeine weisse | 1 | 1 | 50 | 12 | — |
| — — | 2—3 | 3 | 50 | — | — |
| **Colutea** arborescens, **Blasenstrauch** | 1 | 1 | 20 | 10 | — |
| — — verpfl. | 2—3 | 3 | — | 26 | — |
| **Cornus** alba, Weisser **Hartriegel** | 1 | 1 | 20 | 10 | — |
| — — verpfl. | 2 | 2 | 20 | 20 | — |
| — — verpfl. | 3 | 3 | — | 27 | 250 |
| — Amomum (C coerulea) | 2 | 2 | 50 | 22 | — |
| — — | 3 | 3 | 50 | 30 | — |
| — mascula, **Kornelkirsche** | 1 | 3 | — | 27 | — |
| — — — verpfl. | 2 | 4 | 50 | — | — |
| — — — verpfl. | 3 | 6 | — | — | — |
| — sanguinea, Gemeiner H. | 1 | 1 | 50 | — | — |
| — — | 3 | 3 | 50 | — | — |
| **Corylus** Avellana, Gewöhnl. Hasel verpfl | 2 | 3 | — | — | — |
| — Colurna, Byzantinische Baumhasel | 1 | 12 | — | — | — |
| — — | 3 | 20 | — | — | — |
| — rostrata | 1 | 6 | — | — | — |
| **Cotinus** Coccygea (Rhus Cotinus), **Perückenstrauch** | 1 | 2 | 50 | 22 | — |
| — — verpfl. | 2—3 | 4 | 50 | — | — |
| **Crataegus** coccinea, Scharlach-**Dorn** | 1 | 3 | — | — | — |
| — — | 2—3 | 4 | 50 | — | — |
| — Crus galli, Hahnsporndorn | 1 | 3 | — | — | — |
| — — — | 2—3 | 5 | — | — | — |
| — Oxyacantha, **Weissdorn.** siehe Heckenpflanzen. | | | | | |
| — — fastigiata Säml. | 1—2 | 2 | 50 | — | — |
| — — fl. carneo (fl. roseo) Säml. | 2—3 | 5 | — | — | — |
| — fl. rubro | 2—3 | 6 | — | — | — |
| — prunifolia, Pflaumenblättriger D. | 2—3 | 6 | — | — | — |
| — sanguinea, Blutdorn | 2—3 | 6 | — | — | — |
| **Cydonia** japonica, Japanische **Quitte** | 1 | 5 | — | 45 | — |
| — — | 3 | 10 | — | — | — |
| — vulgaris, Gemeine Apfel-Q. Steckl. | 1 | 4 | — | 36 | — |
| **Cytisus** elongatus, Langruthiger **Gaisklee** | 1 | 3 | — | 25 | — |
| — — | 2—3 | 4 | 50 | — | — |
| — hirsutus, Behaarter Gaisklee | 1 | 2 | 50 | — | — |
| — purpureus | 1 | 5 | — | — | — |
| **Desmodium** Dilleni | 3 | 6 | — | — | — |
| — racemosum (penduliflorum) | 1 | 10 | — | — | — |
| **Deutzia** crenata fl. pl. Steckl. | 1 | 4 | — | 36 | — |
| — Fortunei pl. rein weiss gefüllt — | 2 | 5 | — | 45 | — |
| — — — — | 3 | 8 | — | 72 | — |
| — gracilis — | 1 | 3 | — | 26 | — |
| **Diervilla** canadensis | 1 | 3 | — | — | — |
| — splendens | 2—3 | 5 | — | — | — |
| **Elaeagnus** angustifolia, Wilder **Oelbaum** | 1 | 3 | — | — | — |
| — — | 3 | 6 | — | — | — |
| — orientalis Steckl. | 1 | 8 | — | — | — |
| **Evonymus** europaea, **Spindelbaum** (Pfaffenhütchen) | 1 | 1 | — | 8 | 70 |
| — — | 2 | 2 | — | 18 | — |
| — — | 3 | 3 | — | 27 | — |
| **Fagus** ferruginea, Amerikanische **Rothbuche** | 1 | 5 | — | — | — |
| **Forsythia** Fortunei Steckl. | 1 | 3 | — | 26 | — |
| — — — | 2—3 | 5 | — | — | — |
| **Fraxinus** alba, Amerikan. weisse **Esche** | 1 | 4 | — | 36 | — |
| — — | 2—3 | 7 | — | — | — |
| — americana | 2—3 | 5 | — | — | — |
| — excelsior, Gemeine E. | 1 | 1 | — | 5 | 45 |
| — — — — verpfl. | 2 | 1 | 50 | 12 | 100 |
| — — — 60cm. h. verpfl. | 3 | 2 | 50 | 20 | 180 |
| — lentiscifolia (parvifolia) | 2 | 3 | 50 | 30 | — |

| | | Alter. | Preis pro 100 M. | Pf. | 1000 M. | 10,000 M. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fraxinus**. Ornus, Manna-E. | | 1 | 1 | 50 | 12 | — |
| — — | verpfl. | 2 | 2 | 50 | 20 | — |
| — — | | 3 | 3 | 50 | 30 | — |
| — sambucifolia (nigra) | verpfl. | 3 | 5 | — | — | — |
| — viridis, Grüne Esche | — | 3 | 5 | — | — | — |
| **Genista** tinctoria, Färbe-**Ginster** | — | 3 | 3 | 50 | — | — |
| **Gleditschia** triacanthos, Dreistachelige **Gleditschie** | | 1 | 1 | — | 9 | — |
| — | ca. 1m. hoch verpfl. | 3 | 3 | — | 26 | — |
| **Hippophaë** rhamnoides, **Sanddorn** | | 1 | 2 | 50 | 22 | 200 |
| — | | 2 | 3 | 50 | 30 | — |
| — | | 3 | 5 | — | 45 | — |
| **Hypericum** elatum, **Hartheu** | | 2 | 3 | — | — | — |
| — hircinum | | 2 | 3 | — | — | — |
| **Indigofera** Dosüa | verpfl. | 1 | 4 | — | — | — |
| **Juglans** nigra, Schwarze **Wallnuss** | | 1 | 4 | — | — | — |
| — — | | 2 | 6 | — | — | — |
| — — | | 3 | 8 | — | — | — |
| **Kerria** japonica (Corchorus) fl. pl. | Steckl. | 3 | 6 | — | — | — |
| **Koelreuteria** paniculata | | 1 | 3 | — | 27 | — |
| — | verpfl. | 3 | 6 | — | — | — |
| **Laburnum** vulgare, Gemeiner **Goldregen** | | 1 | 1 | — | 8 | 60 |
| **Ligustrum** amurense, **Liguster** vom Amur | Steckl. | 1 | 4 | — | 36 | — |
| — — | | 3 | 10 | — | — | — |
| — species nova | | 2—3 | 5 | — | — | — |
| — vulgare, Gemeine L. | Steckl. | 1 | 1 | 50 | 13 | — |
| — — | | 2 | 2 | 50 | 22 | — |
| — — — | verpfl. | 3—4 | 5 | — | — | — |
| — — — fol. var., buntblättrig | Steckl. | 1 | 4 | — | — | — |
| — — — — | | 3 | 8 | — | — | — |
| — — foliosum | | 1 | [illegible] | | — | — |
| — — italicum | — | 1 | 3 | 50 | 30 | — |
| — — — | | 3 | 6 | — | — | — |
| — — pyramidale (compactum) | | 2—3 | 6 | — | — | — |
| **Liriodendron** Tulipifera, **Tulpenbaum** | | 1 | 5 | — | 45 | — |
| **Lonicera** (Caprifolium) Douglasii, **Gaisblatt** | Ableger | 1 | 7 | — | — | — |
| — — flava | | 1 | 7 | — | — | — |
| — — fuchsioides; rothblühend | — | 1 | 6 | — | — | — |
| — hispida, Raube **Heckenkirsche** | | 1 | 3 | — | — | — |
| — — | | 2—3 | 4 | 50 | 40 | — |
| — Ledebouri | Steckl. | 2—3 | 4 | 50 | — | — |
| — microphylla (Sieversii) | | 2 | 5 | — | — | — |
| — orientalis | | 2 | 6 | — | — | — |
| — Ruprechti | | 3 | 6 | — | — | — |
| — tatarica, Tartarische H. | | 2 | 2 | 50 | 22 | — |
| — — | verpfl. | 3 | 3 | 50 | 30 | — |
| — fl. albo, weiss blühend | | 1 | 3 | — | — | — |
| — — fructu luteo, gelbfrüchtig | Steckl. | 3 | 6 | — | — | — |
| — Xylosteum, Gemeine H. | | 2 | 4 | 50 | — | — |
| — — Philomelae | | 2 | 7 | — | — | — |
| **Maclura** aurantiaca, Osagenorange | | 1 | 3 | — | — | — |
| **Morus** alba, Weisse **Maulbeere** | | 2 | 2 | — | — | — |
| — nigra, Schwarze M. | | 2 | 3 | — | — | — |
| **Philadelphus** cordatus; Herzblättriger **Jasmin** | | 1 | 2 | 50 | — | — |
| — coronarius, Gemeiner J. | | 1 | 2 | 50 | — | — |
| — — fl. pl.; gefüllt | Steckl. | 1 | 6 | — | — | — |
| — — nanus, Zwerg-J. | | 3 | 7 | — | — | — |
| — dianthiflorus pl., Nelkenblüthiger gefüllter J. | | 1 | 8 | — | — | — |
| — floribundus (pubescens), Reichblühender J. | — | 3 | 5 | — | — | — |
| — grandiflorus, Grossblumiger J. | — | 1 | 3 | — | — | — |
| — — | — | 2 | 4 | 50 | — | — |
| — — | — | 3 | 6 | — | — | — |
| — Keteleeri fl. pl., gefüllt | — | 2—3 | 6 | — | — | — |
| — latifolius; breitblättrig | — | 2 | 5 | — | — | — |
| — — | — | 3 | 7 | — | — | — |
| — nivalis spectabilis pl., gefüllt | — | 2 | 7 | — | — | — |
| — primulaeflorus pl. | — | 1 | 10 | — | — | — |

| | Alter. | Preis pro 100 M. | Pf. | 1000 M. | 10,000 M. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Philadelphus** salicifolius, weidenblättrig ... Steckl. | 1 | 3 | — | — | — |
| — Yokohamae | 3 | 7 | — | — | — |
| **Pirus** baccata, Beeren-**Apfel** | 1 | 2 | 50 | 20 | — |
| — floribunda | 1 | 5 | — | — | — |
| — Kaïdo | 1 | 3 | — | 27 | — |
| **Platanus** orientalis, **Platane** ... starke Steckl. | 1 | 5 | — | 45 | — |
| **Populus** alba nivea, Silber-**Pappel**, ächt ... 0,60—0,90 m. h. | 2 | 4 | 50 | 40 | — |
| — — — 1—1,80 m. h | 3 | 6 | — | 50 | — |
| — canadensis ... — | 1 | 4 | — | — | — |
| — fastigiata, Pyramiden-P. ... — | 1 | 4 | — | — | — |
| — — ... — | 2—3 | 6 | — | — | — |
| — hybrida Berolinensis, Berliner Lorbeer-P. ... — | 3 | 8 | — | — | — |
| — laurifolia, Lorbeer-P. | 1 | 3 | — | — | — |
| — — | 3 | 6 | — | — | — |
| — nigra, Schwarz-P. ... — | 3 | 6 | — | — | — |
| — — betulaefolia ... — | 3 | 8 | — | — | — |
| **Potentilla** fruticosa, **Fünffingerstrauch** ... — | 1 | 2 | — | — | — |
| **Prunus** cerasifera (**Myrobalana**); Kirschpflaume, siehe Obstwildlinge. | | | | | |
| — japonica (**sinensis**) alba pl. | 2 | 8 | — | 70 | — |
| — — — — stark | 3 | 18 | — | — | — |
| — — — rosea pl. | 2 | 10 | — | 90 | — |
| — — — — stark | 3 | 20 | — | — | — |
| — Mahaleb, Weichsel; siehe Obstwildlinge. | | | | | |
| — — Padus, **Traubenkirsche** (Faulbaum) | 2 | 3 | 50 | 32 | — |
| — — ... verpfl. | 3 | 5 | — | 45 | — |
| — serotina, mit lorbeerartigen Blättern, sehr schön! | 2 | 4 | 50 | 40 | — |
| — — ... verpfl. | 3 | 6 | — | 54 | — |
| — spinosa, Schlehe; s. unter Obstwildlinge | | | | | |
| — virginiana, Virginische Traubenk. | 1 | 2 | 50 | 22 | — |
| **Ptelea** trifoliata, **Lederbaum** | 2 | 2 | — | 18 | — |
| — ... verpfl. | 3 | 3 | 50 | 30 | — |
| **Pterocarya** caucasica, **Flügelnuss** | 1 | 6 | — | 54 | 500 |
| — — ... verpfl. | 4 | 16 | — | — | — |
| **Quercus** ambigua, Amerikanische **Eiche** | 2—3 | 16 | — | — | — |
| — Cerris, Türkische E. | 2 | 4 | — | 36 | — |
| — — | 3 | 6 | — | — | — |
| — coccinea, Scharlach-E. | 2 | 5 | — | 45 | 400 |
| — — | 3 | 7 | 50 | 65 | — |
| — lyrata, Leierblättrige E. | 1 | 10 | — | — | — |
| — macrocarpa, Grossfrüchtige E. ... verpfl. | 2 | 10 | — | 90 | — |
| — — | 3 | 15 | — | — | — |
| — palustris, Sumpf-E. | 1 | 3 | — | 26 | — |
| — — | 2 | 5 | — | — | — |
| — Phellos, Weidenblättrige E | 2 | 8 | — | — | — |
| — rubra, Rothe E. ... verpfl. | 2 | 6 | — | 54 | — |
| — — ... — | 3 | 8 | — | 72 | — |
| — Robur, Gemeine Stiel-E. (Sommer-E.) | 1 | 1 | — | 6 | 50 |
| — — ... verpfl. | 2 | 2 | — | 15 | 140 |
| — — ... 1—1¼ m. h. verpfl. | 3 | 3 | 50 | 30 | 280 |
| — — fastigiata (pyramidalis), Pyramiden-E. | 2 | 8 | — | 72 | — |
| — — — ... verpfl. | 3 | 12 | — | — | — |
| — sessiliflora, Stein- oder Winter-E. | 2 | 1 | 80 | 15 | — |
| — tinctoria, Färber-E. | 1 | 8 | — | — | — |
| — — ... verpfl. | 2 | 12 | — | — | — |
| — tomentosa (bicolor), Zweifarbige E. | 1 | 8 | — | — | — |
| — — ... verpfl. | 2 | 12 | — | — | — |
| **Rhamnus** cathartica, **Kreuzdorn** | 1 | 1 | 50 | 12 | — |
| — Frangula, **Faulbaum** ... verpfl. | 3 | 3 | — | — | — |
| **Ribes** aureum, Gelbblühende **Johannisbeere** ... Säml. | 1 | 1 | 50 | 12 | — |
| — — ... Steckl. | 1 | 2 | 50 | 22 | — |
| — — | 2 | 4 | — | 35 | — |
| — alpinum ... Steckl. | 1 | 4 | — | — | — |
| — floridum (americanum) ... — | 3 | 5 | — | 45 | — |
| — Gordonianum ... — | 1 | 6 | — | — | — |
| — nigrum, Ahlbeere ... — | 2 | 5 | — | 45 | — |

| | | Alter. | 100 ℳ | 100 ₰ | 1000 ℳ | 10,000 ℳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ribes** nigrum | Steckl. | 3 | 6 | — | 54 | — |
| — — fol. argenteo var.; weissbuntblättrig | — | 2—3 | 7 | — | — | — |
| — — aureo var.; goldbuntblättrig | — | 2—3 | 7 | — | — | — |
| — — heterophyllum; geschlitztblättrig | — | 2—3 | 7 | — | — | — |
| — rubrum, Rothe u. weisse grossfrüchtige Johannisbeeren | — | 2 | 5 | — | — | — |
| — sanguineum, Rothblühende J. | — | 2 | 8 | — | — | — |
| **Robinia** Pseudacacia, **Akazie**; siehe Heckenpflanzen. | | | | | | |
| — — semperflorens | Säml. | 1 | 8 | — | — | — |
| **Rosa** canina, Hunds-**Rose** | | 1 | 1 | — | 7 | 60 |
| — — | verpfl. | 2 | 2 | — | 18 | — |
| — — | veredlungsfähig — | 3 | 3 | 50 | — | — |
| — rubrifolia, Rothblättrige R. | | 1 | 5 | — | — | — |
| **Salix** alba argentea (regalis), Silber-**Weide** | Steckl. | 2 | 6 | — | — | — |
| — caspica (pruinosa) Kaspische Weide | — | 1 | 2 | — | 18 | — |
| — — | — | 2 | 3 | — | 27 | — |
| — dasycladus | — | 3 | 5 | — | — | — |
| — elegantissima, Japanische Trauerw. | — | 1 | 3 | — | — | — |
| — fusca, Schwarzbraune W. | — | 3 | 5 | — | — | — |
| — Helix pyramidalis, Pyramiden-Bach-W. | — | 1—3 | 3 | — | — | — |
| — jaspidea | — | 1 | 3 | — | — | — |
| — pentandra, Lorbeerblättrige W. | — | 2 | 5 | — | — | — |
| — pommeranica; sehr starkwüchsig | — | 1 | 2 | 50 | — | — |
| — prunifolia | — | 1 | 2 | — | — | — |
| — purpurea | — | 3 | 5 | — | — | — |
| — — pendula (nigra pend.) | — | 3 | 6 | — | — | — |
| — — uralensis | — | 1—2 | 3 | — | — | — |
| — viminalis, Korb-W. | — | 2 | 5 | — | — | — |
| — — regalis, Elbweide | — | 2 | 5 | — | — | — |
| — vitellina, Dotter-W. | — | 1 | 2 | — | — | — |
| — — | — | 3 | 5 | — | 45 | — |
| — — **Britzensis**, Rothe Dotter-W. (s. Neuheiten) | — | 1 | 10 | — | 80 | — |
| — — | — | 3 | 20 | — | 160 | — |
| **Sambucus** nigra, Gewöhnlicher **Hollunder** | — | 3 | 7 | — | — | — |
| — — fl. pl.; Gefüllter H. | Steckl. | 2—3 | 12 | — | — | — |
| — — fol. argenteo marg.; weissrandig | — | 2—3 | 9 | — | — | — |
| — — fr. albo; Weissfrüchtiger H. | — | 2—3 | 12 | — | — | — |
| — — linearis; schmalblättrig | — | 3 | 12 | — | — | — |
| — — pulverulenta (nana tricolor), weissbunt | — | 2—3 | 12 | — | — | — |
| — racemosa, Trauben-H.; rothbeerig | | 1 | 2 | — | 18 | — |
| — — | | 3 | 5 | — | — | — |
| **Sophora** japonica | verpfl. | 2 | 4 | — | — | — |
| **Sorbus** aucuparia, Gemeine **Eberesche** | | 1 | 1 | 80 | 15 | — |
| — — | | 2 | 3 | — | — | — |
| — hybrida (intermedia od. fennica), Schwedische Axelbeere | | 2—3 | 8 | — | — | — |
| **Spiraea** Bethlehemensis rubra | Steckl. | 2 | 3 | — | 27 | — |
| — Billardii | Steckl. | 3 | 4 | 50 | 40 | — |
| — callosa (Fortunei) | | 1 | 1 | 50 | — | — |
| — — | verpfl. | 2 | 2 | 50 | 22 | — |
| — — | — | 3 | 3 | 50 | 30 | — |
| — — alba; weiss | — | 2 | 5 | — | — | — |
| — — — starke Einfassungspflanzen | | 3 | 8 | — | 72 | — |
| — — macrophyllo; grossblättrig | | 3 | 8 | — | — | — |
| — — superba; hellrosa | | 3 | 8 | — | — | — |
| — Cantoniensis pl. (Reevesii) | | 1 | 6 | — | — | — |
| — chamaedryfolia | | 3 | 7 | — | — | — |
| — coccinea | | 3 | 8 | — | — | — |
| — confusa | | 1 | 2 | — | 18 | — |
| — — | | 2 | 3 | — | — | — |
| — Douglasii Sanssouciana (Nobleana) | | 1 | 7 | — | — | — |
| — — — | | 3 | 7 | — | — | — |
| — — pachystachys | | 2—3 | 4 | 50 | — | — |
| — exmia, roth | | 2 | 4 | — | — | — |
| — Fontenaysialba | | 3 | 5 | — | — | — |
| — Fortunei semperflorens | | 2—3 | 5 | — | — | — |
| — grossulariaefolia, niedrig | | 2—3 | 9 | — | — | — |
| — hypericifolia thalictroides | | 1 | 4 | — | — | — |

| | Alter. | 100 ℳ | 100 ₰ | 1000 ℳ | 10,000 ℳ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spiraea** latifolia (Bethlehemensis alba) | 2—3 | 5 | — | — | — |
| — Lenneana | 3 | 6 | — | — | — |
| — Nicoudiertii | 1 | 2 | — | 18 | — |
| — opulifolia | 2 | 2 | 50 | 22 | — |
| — — | 3 | 3 | 50 | 32 | — |
| — — lutea ... Steckl. | 1 | 6 | — | — | — |
| — — — ... — | 3 | 5 | — | 45 | — |
| — pruinosa ... — | 1 | 6 | — | — | — |
| — prunifolia pl. ... — | 2 | 8 | — | — | — |
| — syringaeflora | | | | | |
| — trilobata Van Houttei (aquilegiaefolia) ... Steckl. | 1 | 4 | — | — | — |
| **Staphylaea** pinnata, **Pimpernuss** | 1 | 3 | — | — | — |
| — — | 2 | 4 | 50 | — | — |
| — — | 3 | 6 | — | — | — |
| **Symphoricarpus** orbiculatus (vulgaris) ... Steckl. | 1 | 4 | — | — | — |
| — — fol. aureo var.; goldbunt ... — | 1 | 4 | — | — | — |
| — — — ... — | 3 | 8 | — | — | — |
| — racemosus, **Schneebeere** ... — | 1 | 3 | — | — | — |
| — — ... — | 3 | 4 | 50 | — | — |
| **Syringa** persica, Persischer **Flieder** | 2 | 7 | — | — | — |
| — Rothomagensis (chinensis) ... Steckl. | 1 | 4 | — | 36 | — |
| — — ... — | 2 | 6 | — | 54 | — |
| — — ... — | 3 | 8 | — | — | — |
| — — alba ... — | 2 | 8 | — | — | — |
| — — rubra (Saugeana) ... — | 1 | 4 | — | — | — |
| — — — ... — | 2 | 6 | — | 54 | — |
| — — — ... — | 3 | 8 | — | — | — |
| — vulgaris, Gemeiner Flieder | 1 | 1 | — | 8 | — |
| — — — ... verpfl. | 2 | 2 | — | 18 | — |
| — — — ... — | 3 | 3 | 50 | 30 | — |
| — — alba, Weisser Fl. ... — | 3 | 8 | — | — | — |
| — lilarosa ... — | 3 | 8 | — | — | — |
| — Lovaniensis ... — | 3 | 8 | — | — | — |
| — — Valentiana ... — | 2 | 10 | — | — | — |
| **Tamarix** gallica ... 1 m. h. Steckl. | 2—3 | 4 | — | 36 | — |
| — tetrandra (parviflora) ... 1 m. h. — | 1 | 2 | — | — | — |
| — — | 2—3 | 4 | — | 36 | — |
| **Tilia** platyphyllos, Grossblättr. Holländ. **Linde** | 1 | 2 | — | 18 | — |
| — — — — — | 2 | 3 | 50 | 32 | 300 |
| ... verpfl. | 3 | 5 | — | — | — |
| — ulmifolia, Kleinblättr. Steinlinde | 1 | 1 | 20 | 10 | 90 |
| — — — — | 2 | 2 | — | 18 | 160 |
| — — — ... verpfl. | 3 | 4 | — | 36 | — |
| **Ulex** europaea, **Stechginster** | 1 | 3 | — | 25 | — |
| **Ulmus** campestris, Feld-**Rüster** | 1 | — | 80 | 4 | 36 |
| — — — | 2 | 1 | 50 | 10 | — |
| — effusa (laevis) Flatter-R. | 1 | — | 80 | 4 | — |
| | 2 | 1 | 50 | 12 | — |
| | 3 | 2 | 50 | 22 | — |
| — montana (scabra, americana) | 1 | 1 | 20 | 9 | 70 |
| — — — — | 2 | 2 | — | 18 | — |
| — — — — | 3 | 3 | — | — | — |
| **Viburnum** Opulus, Wilder **Schneeball** | 1 | 1 | 50 | 13 | — |
| — — — ... verpfl. | 2 | 2 | 50 | 22 | — |
| — — — ... — | 3 | 4 | — | 35 | — |
| — — roseum, **Gefüllter** Schneeb.; | 1 | 4 | — | 36 | — |
| — — — ... stark | 2 | 6 | — | 54 | — |
| — edule | 2—3 | 6 | — | — | — |
| — Lantana | 1 | 3 | — | — | — |
| — — ... verpfl. | 2 | 5 | — | — | — |
| **Vitis** quinquefolia, wilder **Wein** ... Steckl. | 2—3 | 5 | — | 46 | 420 |
| — hirsuta, Grossblättr. wilder W ... — | 2 | 5 | — | 46 | — |
| — — | 4 | 10 | — | 90 | — |
| — riparia | 3 | 12 | — | — | — |
| — indivisa (cordata) | 3 | 12 | — | — | — |
| **Weigela** rosea | 2 | 10 | — | — | — |
| **Wistaria** frutescens, **Glycine** | 1 | 6 | — | — | — |

## b) Nadelhölzer.

| | | Alter. | Preis pro 100 M. | ₰ | 1000 M. | 10,000 M. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abies** alba, Weisse **Fichte** | | 2 | 2 | 50 | 20 | |
| — balsamea, Balsam-Tanne | | 1 | 2 | 50 | — | — |
| — Douglasii | | 1 | 6 | | 54 | — |
| — excelsa, **Rothtanne** | | 1 | — | 80 | 4 | — |
| — — | | 2 | 1 | — | 8 | — |
| — — | 20—30 cm. h. verpfl. | 3 | 2 | 50 | 22 | 200 |
| — — | 30—60 cm. h. — | 4 | 4 | — | 36 | 340 |
| — Fraseri, Fraser's Tanne | verpfl. | 1 | 5 | — | 45 | — |
| — nigra (Mariana), Schwarze Fichte | — | 1 | 2 | — | — | — |
| — — | — | 2 | 3 | — | 26 | — |
| — Nordmanniana, Kaukasische Edeltanne | | 1 | 4 | — | — | — |
| — — — | — | 3 | 8 | — | 72 | — |
| — pectinata Weisstanne | | 1 | — | 80 | 5 | — |
| — — — | verpfl. | 3 | 3 | — | 26 | — |
| — sibirica (Pichta) | — | 3 | 9 | — | — | — |
| — Sitchensis (Menziesii) | — | 1 | 3 | — | — | — |
| **Biota** pyramidalis | — | 1 | 2 | 50 | — | — |
| **Cupressus** Lawsoni (Chamaecyparis Boursieri) | verpfl. | 1 | 3 | — | — | — |
| — — | | 2 | 5 | | — | — |
| — — erecta | — | 2 | 8 | | | — |
| — — glauca | — | 1 | 6 | — | — | — |
| — — — | — | 2 | 10 | — | — | — |
| — pisifera | — | 2 | 12 | — | — | — |
| **Gingko** biloba (Salisburia) | — | 1 | 4 | — | — | — |
| **Juniperus** communis **Wachholder** | verpfl. | 3 | 6 | — | 50 | — |
| — virginiana (Rothe Ceder) | — | 1 | 2 | — | — | — |
| — — | | 2 | 3 | 50 | 32 | — |
| **Larix** europaea, gemeine **Lärche** | | 1 | 1 | — | — | — |
| — sibirica | — | 1 | 1 | 50 | — | — |
| **Pinus** austriaca, Schwarz-**Kiefer** (Föhre) | verpfl. | 2 | 1 | 50 | — | — |
| — — | — | 3 | 3 | — | | — |
| — rigida | verpfl. | 1 | 2 | | | — |
| — Schrenkiana | — | 1 | 2 | — | 18 | — |
| — Strobus, Weymouths-K | — | 1 | 2 | | | |
| — sylvestris, gemeine K | verpfl. | 4 | 2 | 50 | 22 | — |
| **Taxus** baccata elegantissima, goldbunt | Stckl. | 2 | 20 | — | | — |
| **Thuya** occidentalis, **Lebensbaum** | | 2 | 3 | — | 26 | — |

## Spargelpflanzen.

| | | p. 100 M. | ₰ | 1000 M. | 10,000 M. |
|---|---|---|---|---|---|
| Riesen-Spargel (Vorrath über 500,000) | I. Qual. (3jähr.) | 1 | 50 | 14 | 130 |
| — — | II. » (2jähr.) | 1 | 25 | 11 | 110 |
| — — | III. » (1jähr.) | 1 | — | 8 | 60 |
| Connover's Colossal (Vorrath über 100,000) sehr starke Stiele | I. » (3jähr.) | 3 | — | — | — |
| — — | II. » (2jähr.) | 2 | — | 18 | — |
| — — | III. » (1jähr.) | 1 | 50 | 12 | 110 |
| Früher von Argenteuil | II. » (2jähr.) | 2 | — | 18 | — |

## Diverse Pflanzen und Zwiebeln.

| | 1 St. M. | ₰ | 10 St. M. | 100 M. |
|---|---|---|---|---|
| **Bocconia cordata**; sehr hübsche grossblättrige Einzelpflanze auf Rasen, mit grossen weissen Blüthenrispen. Eine völlig harte Staude | — | 50 | 4 | — |
| **Convallaria majalis fol. var.**; Maiblume m. gestreiften Blättern | — | 30 | 2½ | — |
| — — — fl. pl. gefüllt | — | 30 | 2½ | — |
| **Hyacinthus candicans**, Neuheit ersten Ranges! Die im August erscheinenden Blumenstiele erreichen eine Höhe von mehr als 1 Meter und sind mit 30—50 schneeweissen Glocken garnirt. Die Zwiebel braucht erst im Frühjahr gelegt zu werden in guten Gartenboden | — | 50 | 4 | 30 |
| **Iris foetida fol. var.**; mit weiss gestreiften Blättern | — | 30 | — | — |
| **Phlox decussata** »**Boule de feu**«; eine herrlich roth blühende Staude | — | 50 | 4 | — |
| **Rhabarber** (Rheum); die zubereiteten Blattstiele geben ein vorzügliches dem Apfelmuss ähnliches Compot. Starke Pflanzen | — | 40 | 3½ | |
| — — diesjährige Samenpflanzen | — | 25 | 2 | |

| | 1 St. M. ₰ | 10 St. M. | 100 M. |
|---|---|---|---|
| **Spiraea palmata elegans**; **Neuheit!** | — 75 | 6 | — |
| — **Ulmaria fl. pl.**; gefüllt weiss | — 50 | — | |
| **Paeonia herbacea**, Krautartige Päonie in schönem Rummel | — 40 | 3 | |
| — 1 Sortiment von 10 Sorten | | 4 | — |
| **Paeonia tenuifolia pl.**; Gefüllte feinblättrige dunkelroth blühende Paeonie; eine Staude, die einzeln auf Rasenplätzen in der Nähe des Weges, oder am Rande niedriger Strauchpartieen jedem Besucher des Gartens sogleich angenehm in die Augen fällt | — 75 | 6 | — |

**Polygonum Sieboldii**, höchst wichtige Staude zum Befestigen von Eisenbahndämmen, Flugsand etc. 100 St. 4 M.; 1000 St. 35 M.; 10,000 St. 300 M.

## Pflanzen zum Treiben.

| | | 100 M. | 1000 M. |
|---|---|---|---|
| **Maiblumenkeime**, stärkste blühbare, versende ich von Mitte October bis Ende November jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Boden kultivirten Keime ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse | netto | 4 | 36 |
| **Deutzia gracilis**, | I. Qual. | 20 | — |
| — — | II. " | 10 | — |
| — **crenata fl. pl.** | I. " | 30 | — |
| — — — | II. " | 18 | — |
| **Prunus japonica** (sinensis) **alba pl.** veredelt | I. " | 35 | — |
| — — — — — wurzelächt | I. " | 25 | 230 |
| — — **rosea pl.** wurzelächt | I. " | 28 | — |
| — — beide Sorten wurzelächt | II. " | 15 | — |
| **Spiraea callosa alba** | I. " | 15 | 130 |
| — — — | II. " | 9 | 80 |
| — **japonica** (Hoteia) | I. " | 18 | — |
| — — — | II. " | 12 | — |
| — **prunifolia pl.** | I. " | 30 | — |
| **Syringa persica** | I. " | 40 | — |
| — **Rothomagensis** (sinensis) | I. " | 40 | — |
| — — **rubra** (Sangeana) | I. " | 44 | — |
| — obige 3 Sorten. | II. " | 30 | — |
| — **vulgaris Charles X.**; | 2jährige Veredlungen. | 45 | — |
| — — — | 1jährige " | 30 | — |

## Monatsrosen in Töpfen, (Vorrath 8000 St.)

pr. 100 St. 30 M.; p. 1000 St. 270 M.

**Cremoisi supérieur**; leuchtend carmoisin.
Nemesis; schwärzlich purpur.
Louis Philippe; dunkel purpur.
Purpurea; purpur.

## Diverse Artikel.

**Späth'sche Propfpfannen**, äusserst praktisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses; pr. Stück 6 M.
**Verzinkten Eisendraht** für Schnurbäumchen u. Spaliere p. K. 1 M., 10 K. 8 M. (1 Kilo hiervon giebt ca. 50 Meter).
**Drahtspanner**; pr. Stück 50 ₰, 25 Stück 10 M.
**Schlüssel** zu den Drahtspannern pr. Stück 60 ₰
**Gartenmesser** (Hippen) bester Construction, die Klingen von feinstem Stahl pr. Stück M. 2–2,50.
**Oculir- und Veredlungs-Messer**, ebenfalls bester Qualität, mit einer Klinge; pr. Stück M. 1,25–1,75
**Verzinkten Etikettdraht** pr. Kilo M. 3
**Holz-Etiketten** zum Anbinden, gestrichen und mit Draht versehen p. 100 St. 1,25 M. pr. 1000 Stück M. 10
**Baumwachs**, warmflüssiges, in hiesiger Baumschule benutzte Composition p. K. M. 2
**Raffiabast**, Japanischer pr. Kilo M. 3 —

**Späth'sche Propfpfanne.**

Das Verzeichniss über

# Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus, Lilien etc.

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von **Mitte August bis Ende October statt.**

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten, meine Blumenzwiebelfelder (welche ca. 1¼ Hektar umfassen) in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt; während derselben versende ich auch abgeschnittene Hyacinthenblumen, die **nach Körben** billig berechnet werden, und bitte Aufträge darauf mir gefälligst recht zeitig zukommen zu lassen.

Für die Besucher meiner zu **Neu-Britz** belegenen, jetzt über 100 Hektar umfassenden **Baumschule** bemerke ich, dass die Chaussee dahin von Berlin durch **Rixdorf** bis zum **Buschkruge** führt, von wo dieselbe nur 15 Minuten entfernt ist. Man kann leicht von **Berlin** per Droschke dahin gelangen, oder die Pferdebahn — Linie Dönhoffsplatz — Hallesches Thor — Rixdorf — benutzen, von wo man noch einen Weg von ca. 30 Minuten hat; auch die Verbindungsbahn hält in Rixdorf an. Ferner läuft eine Pferdebahnlinie vom Spittelmarkt — Köpnicker-Strasse bis Treptow, von wo man bis zur Baumschule etwa 40 Minuten zurückzulegen hat. Die in der Baumschule wohnenden Obergärtner werden bereitwilligst den Besuchern jede gewünschte Auskunft ertheilen.

**BERLIN**, im October 1880.

***L. Späth.***

---

**NB. Rosen zum Treiben waren bei Schluss des Katalogs bereits sämmtlich bestellt!**

---

## Inhalts-Verzeichniss.






















X A.OTTO BELOW. BERLIN



Situationsplan.
Berlin.
Spree.
Stralow.
Bhf. Treptow
Berlin-
Görlitzer Weg.
Cöpenicker - Eisenbahn.
Chaussée.
Treptow.
Roll-Krug.
Rixdorf.
Verbindungs-Eisenbahn.
Chaussée.
Station.
nach Britz.
Rudower Chaussée.
Chaussée zur Baumschule.
Weg.
Ablage
Buschkrug
Neu-Britz
Britz.
(Dorf.)
L. Späth's Baumschule.

# Situationsplan.

Berlin.
Spree
Stralow.
Bhf. Treptow
Berlin-
Chaussée
Treptow
Roll-Krug.
Rixdorf.
Verbindungs-Eisenbahn.
Göpenicker Weg.
Görlitzer – Eisenbahn.
Chaussée.
Chaussée.
Station.
nach
Rudower
Chaussée.
Britz.
Chaussée zur Baumschule.
Weg.
Ablage
Britz.
(Dorf.)